

Faune de Madagascar

92

Charles L. Bellamy

Publiée sous les auspices
du gouvernement de la
République malgache
Lahatsoratra navaoka
ao amban'ny fiahian'ny
Governemanta ny
Repoblika Malagasy

Insecta Coleoptera Buprestidae

de Madagascar
et des îles voisines
Catalogue annoté

**Insecta
Coleoptera
Buprestidae**
of Madagascar
and Adjacent Islands
An Annotated Catalogue



IRD
CIRAD
MNHN

Insecta Coleoptera Buprestidae
de Madagascar et des îles voisines
Catalogue annoté

Insecta Coleoptera Buprestidae
of Madagascar and Adjacent Islands
An Annotated Catalogue

Charles L. BELLAMY

Insecta Coleoptera Buprestidae
de Madagascar et des îles voisines
Catalogue annoté

Insecta Coleoptera Buprestidae
of Madagascar and Adjacent Islands
An Annotated Catalogue

IRD Editions

Institut de recherche pour le développement

Cirad

Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement

Publications scientifiques du Museum

Muséum national d'Histoire naturelle, Paris

Collection Faune de Madagascar 92

Paris et Montpellier, 2006

Rédacteur en chef / Chief editor :
Henri-Pierre Aberlenc (Cirad)

Préparation éditoriale / Editorial preparation :
Martine Lemaire (Cirad)

Coordination fabrication / Coordination fabrication :
Catherine Plasse (IRD)

Maquette intérieure / Internal layout :
Pierre Lopez (IRD)

Maquette de couverture / Cover layout :
Michelle Saint-Léger (IRD)

Mise en page :
Imprimerie Jouve

Traduction en malgache / Translation into Malagasy :
Prof. Olga Ravoahangimalala Ramilijaona.

Photo de couverture / Cover illustration
Polybothris (Amphibeta) navicularis (Laporte de Castelnau et Gory, 1836), face ventrale :
photo Henri-Pierre Aberlenc (Cirad).

Gravures noir et blanc / Black and white photos
In Grandidier (1890). Photos Jean Legrand (MNHN).

Planches en couleurs / Colour plates :
Aquarelles / Watercolours : André Olwage.
Photos et mise en forme / Photos and design : Henri-Pierre Aberlenc (Cirad)

La loi du 1^{er} juillet 1992 (code de la propriété intellectuelle, première partie) n'autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article L. 122-5, d'une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans le but d'exemple ou d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite » (alinéa 1^{er} de l'article L. 122-4).
Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon passible des peines prévues au titre III de la loi précitée.

© IRD, Cirad, Publications scientifiques du Museum, 2006
ISSN : 0428-0709
ISBN : IRD 2-7099-1596-0, Cirad 2-87614-625-8, Muséum 2-85653-595-X

Adresse de l'auteur :

Charles L. Bellamy

Plant Pest Diagnostic Branch, California Department of Food & Agriculture,
3294 Meadowview Road, Sacramento, California, 95832, USA

cbellamy@cdfa.ca.gov

Publications : <http://www.cdfa.ca.gov/phpps/ppd/Entomology/Coleoptera/Buprestidae/Publications/bellamypubs.html>

Webmaster : *The World of Jewel Beetles*

<http://www.cdfa.ca.gov/phpps/ppd/Entomology/Coleoptera/Buprestidae/index.html>

FAUNE DE MADAGASCAR

NY BIBY ETO MADAGASIKARA

Comité de lecture

Rédacteur en chef

Henri-Pierre Aberlenc.

Membres honoraires

† Renaud Paulian (fondateur, *in memoriam*), Pierre Viette et Roger-Paul Dechambre.

Madagascar

Marcel Razanamparany (professeur, président de la section des sciences fondamentales de l'Académie nationale des arts, des lettres et des sciences), Sylvère Rakotofiringa (directeur de l'appui à la recherche et à la pédagogie à l'université d'Antananarivo), Olga Ravoahangimalala Ramilijaona (chercheur et professeur à la faculté des sciences d'Antananarivo).

France

Cirad : Henri-Pierre Aberlenc, Gérard Delvare et Bruno Michel.

IRD : Jacques Brunhes, Didier Fontenille et Philippe Le Gall.

Muséum national d'Histoire naturelle, Paris : Jean Legrand, Joël Minet et Annemarie Ohler.

International

Steven M. Goodman (Field Museum, Chicago et WWF) et David C. Lees (The Natural History Museum, Londres).

Responsables des éditions

Thomas Mourier (IRD), Martine Séguier-Guis (Cirad) et Philippe Bouchet (MNHN).

Les auteurs doivent adresser toute la correspondance éditoriale au rédacteur en chef :

Henri-Pierre Aberlenc, Cirad-Amis, TA 40/L, Campus international de Baillarguet (CSIRO), 34398 Montpellier Cedex 5, France

henri-pierre.aberlenc@cirad.fr

Tél. : +33 (0)4 67 59 31 23, Fax : +33 (0)4 67 59 31 10

<http://www.mnhn.fr/publication>

Pour l'achat des volumes de la Faune : voir la liste des revendeurs en page 264

Table des matières / Contents

11	Préface / Preface
13	Remerciements / Acknowledgements
15	Résumés / Summaries
17	Introduction
17	MATÉRIEL ET MÉTHODES / MATERIALS AND METHODS
17	Sigles / Abbreviations
18	Abréviations / Abbreviations used in the text
19	CLASSIFICATION
19	Distribution
21	Noms infrasubspécifiques / Infrasubspecific names
23	Taxa nouveaux, combinaisons et synonymies nouvelles, taxa supprimés / New taxa, combination, synonymy and excluded taxa
23	TAXA NOUVEAUX / NEW TAXA
23	Tribu / Tribe Thomassetiini Bellamy, 1987
23	Genre / Genus <i>Madassetia</i> , gen. nov.
24	<i>Madassetia bicolor</i> , sp. nov.
25	<i>Madassetia unicolor</i> , sp. nov.
26	Tribu / Tribe Coraeibini Bedel, 1921
26	Genre / Genus <i>Compsoglypha</i> Fairmaire, 1904
26	<i>Compsoglypha nigrocaerulea</i> , sp. nov.
27	Genre / Genus <i>Gracilocala</i> , gen. nov.
28	<i>Gracilocala bicolor</i> , sp. nov.
29	Genre / Genus <i>Ivalouwayneia</i> , gen. nov.
30	<i>Ivalouwayneia ruficapiticauda</i> , sp. nov.
31	Les genres <i>Discoderes</i> Chevrolat, 1838 et <i>Phlocteis</i> Kerremans, 1893 à Madagascar / The genera <i>Discoderes</i> Chevrolat, 1838 and <i>Phlocteis</i> Kerremans, 1893 in Madagascar
31	Genre / Genus <i>Malagascoderes</i> , gen. nov.
32	<i>Malagascoderes goudotii</i> (Thomson, 1878), comb. nov.
32	<i>Malagascoderes scriptus</i> (Théry, 1937), comb. nov.
32	Genre / Genus <i>Madaphlocteis</i> , gen. nov.

- 33 *Madaphlocteis ambanjana* (Obenberger, 1944), comb. nov.
- 33 *Madaphlocteis ampliata* (Fairmaire, 1905), comb. nov.
- 33 *Madaphlocteis iridipennis* (Obenberger, 1944), comb. nov.
- 33 *Madaphlocteis mucorea* (Fairmaire, 1902), comb. nov.
- 33 *Madaphlocteis ochraceopicta* (Fairmaire, 1888), comb. nov.
- 33 *Madaphlocteis perrieri* (Fairmaire, 1900), comb. nov.
- 33 *Madaphlocteis polychroa* (Fairmaire, 1904), comb. nov.
- 34 *Madaphlocteis purpureosignata* (Hoschek, 1931), comb. nov.
- 34 *Madaphlocteis simplicifrons* (Fairmaire, 1901), comb. nov.
- 34 Genre / Genus *Paranastella* Obenberger, 1931
- 34 *Paranastella* Obenberger, 1931: clé des espèces / a key to the species
- 35 *Paranastella strandi* Obenberger, 1931
- 35 *Paranastella villiersi* Descarpentries, 1984
- 35 *Paranastella viridis*, sp. nov.
- 36 COMBINAISON NOUVELLE / NEW COMBINATION
 - 36 *Paracastalia gebhardti* (Hoschek, 1931), comb. nov.
- 37 SYNONYMIE NOUVELLE / NEW SYNONYMY
 - 37 *Meliboëus miliaris* (Gory et Laporte de Castelnau, 1839)
- 37 TAXA SUPPRIMÉS / EXCLUDED TAXA
 - 37 *Anadora hova* Kerremans, 1899
 - 38 *Nisibia boopis* Fairmaire, 1903

39 Famille des Buprestidae / Family Buprestidae

- 39 SOUS-FAMILLE / SUBFAMILY **JULODINAE** LACORDAIRE, 1857
 - 39 Tribu / Tribe **Julodini** Lacordaire, 1857
 - 39 Genre / Genus *Amblysterna* Saunders, 1871
- 40 SOUS-FAMILLE / SUBFAMILY **POLYCESTINAE** LACORDAIRE, 1857
 - 40 Tribu / Tribe **Haplostethini** LeConte, 1861
 - 40 Genre / Genus *Mastogenius* Solier, 1849
 - 41 Genre / Genus *Ankareus* Kerremans, 1894
 - 43 Tribu / Tribe **Acmaeoderini** Kerremans, 1893
 - 43 Genre / Genus *Acmaeodera* Eschscholtz, 1829
 - 46 Tribu / Tribe **Paratrachyini** Cobos, 1980
 - 46 Genre / Genus *Sponsor* Gory et Laporte de Castelnau, 1839
 - 64 Tribu / Tribe **Polycestini** Lacordaire, 1857
 - 64 Genre / Genus *Paracastalia* Kerremans, 1902
 - 64 Genre / Genus *Parapolycesta* Cobos, 1981
 - 64 Genre / Genus *Madecastalia* Descarpentries, 1976
 - 65 Genre / Genus *Pseudopolycesta* Cobos, 1981
 - 65 Genre / Genus *Aldabrica* Cobos, 1981
 - 65 Genre / Genus *Micropolycesta* Cobos, 1981
 - 66 Genre / Genus *Castaliella* Cobos, 1981
 - 66 Genre / Genus *Polycestaxia* Cobos, 1981
 - 66 Genre / Genus *Madecacesta* Descarpentries, 1976

- 67 SOUS-FAMILLE / SUBFAMILY **GALBELLINAE** REITTER, 1911
67 Genre / Genus *Galbella* Westwood, 1848
- 69 SOUS-FAMILLE / SUBFAMILY **CHRYSOCHROINAE** LAPORTE DE CASTELNAU, 1835
- 69 Tribu / Tribe **Vadonaxiini** Descarpentries, 1970
69 Genre / Genus *Vadonaxia* Descarpentries, 1970
- 70 Tribu / Tribe **Chalcophorini** Lacordaire, 1857
70 Genre / Genus *Iridotaenia* Deyrolle, 1864
70 Genre / Genus *Madecassia* Kerremans, 1903
71 Genre / Genus *Chalcophoropsis* Saunders, 1871
- 73 Tribu / Tribe **Dicercini** Gistel, 1848
73 Genre / Genus *Lampetis* Dejean, 1833
79 Genre / Genus *Apateum* Spinola, 1837
87 Genre / Genus *Polybothris* Spinola, 1837
152 Genre / Genus *Sororcula* Holyński, 1993
152 Genre / Genus *Icarina* Alluaud, 1896
- 153 Tribu / Tribe **Sphenopterini** Lacordaire, 1857
153 Genre / Genus *Sphenoptera* Dejean, 1833
- 154 SOUS-FAMILLE / SUBFAMILY **BUPRESTINAE** LEACH, 1815
- 155 Tribu / Tribe **Phrixiini** Cobos, 1975
155 Genre / Genus *Paraphrixia* Saunders, 1871
- 155 Tribu / Tribe **Thomassetiini** Bellamy, 1987
155 Genre / Genus *Madassetia*, gen. nov.
- 156 Tribu / Tribe **Anthaxiini** Gory et Laporte de Castelnau, 1839
156 Genre / Genus *Anthaxia* Eschscholtz, 1829
- 160 Tribu / Tribe **Chrysobothrini** Gory et Laporte de Castelnau, 1838
160 Genre / Genus *Chrysobothris* Eschscholtz, 1829
- 162 Tribu / Tribe **Actenodini** Kerremans, 1890
162 Genre / Genus *Actenodes* Dejean, 1833
166 Genre / Genus *Belionota* Eschscholtz, 1829
- 167 SOUS-FAMILLE / SUBFAMILY **AGRILINAE** LAPORTE DE CASTELNAU, 1835
- 168 Tribu / Tribe **Coraebini** Bedel, 1921
168 Genre / Genus *Brachydora* Obenberger, 1923
169 Genre / Genus *Compsoglyphia* Fairmaire, 1904
169 Genre / Genus *Suarezia* Théry, 1912
170 Genre / Genus *Gigantocoraebus* Obenberger, 1942
170 Genre / Genus *Paradora* Kerremans, 1900
171 Genre / Genus *Paranastella* Obenberger, 1931
172 Genre / Genus *Entomogaster* Saunders, 1871
175 Genre / Genus *Eumorphocerus* Théry, 1930
176 Genre / Genus *Coraebastus* Fairmaire, 1896
176 Genre / Genus *Evimantius* Deyrolle, 1864
177 Genre / Genus *Pseudocoraebus* Théry, 1905
177 Genre / Genus *Chloricala* Kerremans, 1893
178 Genre / Genus *Gracilocala*, gen. nov.
178 Genre / Genus *Jaroslavia* Obenberger, 1942

179	Genre / Genus <i>Ivalouwayneia</i> , gen. nov.
179	Genre / Genus <i>Seranambia</i> Descarpentries, 1974
179	Genre / Genus <i>Phlocteis</i> Kerremans, 1893
180	Genre / Genus <i>Discoderopsis</i> Théry, 1899
180	Genre / Genus <i>Sambirania</i> Obenberger, 1942
182	Genre / Genus <i>Mandritsaria</i> Obenberger, 1942
183	Genre / Genus <i>Midongya</i> Obenberger, 1942
183	Genre / Genus <i>Angatra</i> Descarpentries, 1969
183	Genre / Genus <i>Antanambia</i> Descarpentries, 1975
184	Genre / Genus <i>Falliellus</i> Bellamy, 2001
184	Genre / Genus <i>Peyrierasina</i> Descarpentries, 1975
184	Genre / Genus <i>Maroantsetra</i> Théry, 1937
184	Genre / Genus <i>Seyrigia</i> Théry, 1937
185	Genre / Genus <i>Dejongiella</i> Bellamy, 2003
185	Genre / Genus <i>Neefia</i> Bellamy, 2003
186	Genre / Genus <i>Neefioides</i> Bellamy, 2003
186	Genre / Genus <i>Malogascoderes</i> , gen. nov.
187	Genre / Genus <i>Madaphlocteis</i> , gen. nov.
188	Genre / Genus <i>Coraeus</i> Gory et Laporte de Castelnau, 1839
189	Genre / Genus <i>Meliboeus</i> Deyrolle, 1864
190	Tribu / Tribe Agrilini Laporte de Castelnau, 1835
190	Genre / Genus <i>Sambus</i> Deyrolle, 1864
191	Genre / Genus <i>Pseudagrilus</i> Laporte de Castelnau, 1835
191	Genre / Genus <i>Agrius</i> Curtis, 1825
199	Genre / Genus <i>Sjoestedtius</i> Théry, 1931
199	Tribu / Tribe Aphanisticini Jacquelin du Val, 1863
200	Genre / Genus <i>Aphanisticus</i> Latreille, 1829
208	Genre / Genus <i>Heromorphus</i> Obenberger, 1916
209	Genre / Genus <i>Paracylindromorphus</i> Théry, 1930
209	Tribu / Tribe Trachini Gory et Laporte de Castelnau, 1839
209	Genre / Genus <i>Trachys</i> Fabricius, 1801
214	Genre / Genus <i>Habroloma</i> C. G. Thomson, 1864
225	Bibliographie / Bibliography
245	Index des genres et des taxa supragénériques / Index of genus, tribe and subfamily-group names
249	Index des espèces / Index of species-group names
264	Points de vente / Outlets
264	Déjà parus / Published volumes

Préface / Preface

Préface

Nous avons le plaisir de présenter au public un volume dont la parution ouvre une nouvelle étape dans l'histoire déjà longue de la *Faune de Madagascar*. Il nous plaît d'y voir un bel exemple de collaboration scientifique transatlantique. En effet, comme nous l'avions annoncé (« Manifeste pour la *Faune de Madagascar* » : 9-12 in Huchet : *Insecta Coleoptera Chironidae, Faune de Madagascar*, 90 : 92 p.) : « si maintenir le caractère francophone de la collection nous tient à cœur, c'est sans crispation ni sectarisme : les manuscrits anglais (y) trouveront leur place ». C'est chose faite, les manuscrits en français restant par ailleurs largement majoritaires parmi les prochains volumes.

Pour être plus précis, ce fascicule est partiellement bilingue, avec dominante de l'anglais :

— « Préface / Preface » ; « Remerciements / Acknowledgements » ; « Résumés / Summaries » sont entièrement bilingues ;

— « Introduction » ; « Taxa nouveaux, combinaisons et synonymies nouvelles, taxa supprimés / New taxa, combination, synonymy and excluded taxa » sont (à l'exception des titres bilingues) entièrement en anglais, y compris bien entendu pour la ponctuation ;

— par contre, la partie « Famille des Buprestidae / Family Buprestidae » est (à l'exception des titres bilingues) entièrement en français, y compris pour la ponctuation, car la plupart des localités, des noms cités et des références le sont et les traduire en anglais aurait inutilement compliqué les choses. Cette partie est d'ailleurs parfaitement compréhensible pour un non-francophone.

L'auteur, spécialiste des Buprestidae de renommée internationale, nous donne un outil de travail de premier ordre, qui devrait toucher un large public et être une référence incontournable pendant de longues années. La confiance qu'il nous a témoignée honore la *Faune de Madagascar*. Nous avons particulièrement soigné l'illustration.

Puissions-nous avoir apporté notre modeste pierre à la connaissance de la biodiversité prodigieuse de Madagascar et avoir témoigné de la beauté et de la créativité du vivant !

Comment ne pas citer cette page magnifique d'Ernst Jünger (*Voyage atlantique*, 1952) :

« La Systématique reste la reine de la Zoologie. À elle est réservé de saisir la volonté par où la création s'exprime en chaque être particulier, de deviner la mission dont elle l'a revêtu. Les caractères, l'estampille, les runes magiques sur les masques — ce sont là les clefs de la force vitale, toujours la même. Le cortège des images, des originaux, des hiéroglyphes, des pensées de la création, met en confiance mieux qu'aucun autre spectacle de ce monde et manifeste l'exubérante puissance génératrice qui se trouve cachée dans ses trésors invisibles. Car si tous

ces êtres ne sont que petite monnaie, qu'ombres fugitives, qui ne cessent d'être brutalement renvoyées à la poussière, chacun d'eux, néanmoins, porte une figure et des armes de souverain. Et cela explique la griserie, l'étourdissement, l'impression de recevoir un don inouï qui envahit tout vrai botaniste ou zoologiste en pénétrant dans ces chambres d'images ».

Des millions d'années d'évolution ont fait venir à l'existence ces êtres et il en faudrait beaucoup moins pour qu'ils disparaissent à jamais. Si cet ouvrage, qui témoigne avec rigueur de la richesse d'un patrimoine fragile, pouvait contribuer à la préservation de la nature à Madagascar, nous aurions le sentiment de n'avoir pas œuvré en vain.

Preface

With great pleasure we present this new volume, which represents a new step in the already long history of the *Faune de Madagascar*. This is a good example of transatlantic collaboration. Indeed, as stated ("Manifeste pour la *Faune de Madagascar*": 9-12 in Huchet: *Insecta Coleoptera Chironidae, Faune de Madagascar*, 90: 92 p.) "even though it has been important to us to maintain the francophone character of this collection, English manuscripts also find their place". Nonetheless manuscripts in French are in a large majority in the coming volumes.

This volume is predominantly in English:

— Preface, Acknowledgements, and Summaries are in both French and English while the Introduction, New taxa, combination, synonymy and excluded taxa are (with the exception of the titles) only in English;

— However the section on the Family Buprestidae is entirely in French, because of the complexity of French names for localities and cited names and references. This section remains however completely understandable to non-French speakers.

The author and specialist of the Buprestidae is of international renown and provides a first class review which should be useful to a wide audience and a standard reference for many years. It is an honor for the *Faune de Madagascar* to publish this work, and we have paid particular attention to the production of the illustrations.

We hope we have made a small contribution to the understanding of the extensive and vibrant biodiversity of Madagascar.

Millions of years of evolution have led to the existence of these organisms and it would take much less time for them to disappear for ever. If this book, which bears rigorous witness to the richness of our fragile heritage, could contribute to the conservation on Madagascan wildlife, we will at least feel we have not worked in vain.

Henri-Pierre ABERLENC
Rédacteur en chef / Chief editor
Faune de Madagascar

Remerciements / Acknowledgements

Remerciements

Nous voudrions remercier les personnes suivantes pour leur aide et leurs encouragements : le regretté André Descarpentries, pour avoir partagé son enthousiasme pour la faune des Buprestides de Madagascar ; Thierry Deuve, Jean Legrand, Olivier Montreuil, Jean-Jacques Menier et Mademoiselle Isabelle Bruneau de Miré, du MNHN, pour les photos, le prêt de nombreux spécimens et pour l'accès aux collections (1995, 1996, 1998, 2004, 2005) ; Gianfranco Curletti, du MCC ; Svata Bílý, du NMPC, pour les nombreux prêts et services rendus et pour son hospitalité ; Mme le Pr Olga Ravoahangimalala Ramilijaona pour sa traduction ; André Olwage pour ses belles aquarelles ; Jean-François Vayssières pour le prêt de plusieurs spécimens (pl. 3, fig. 22-23 ; pl. 5, fig. 34, 37-38 ; pl. 6, fig. 40-41, 42-43) ; Olivier Simonot pour le don de plusieurs *Polybothris* (pl. 4, fig. 30-31 ; pl. 5, fig. 35-36) ; Alain Drumont de l'ISNB pour le prêt d'un couple de *Chalcophoropsis quadrioveolata* (pl. 3, fig. 25-26) ; Andy Sheppard pour le texte anglais.

Acknowledgements

We would like to thank the following for their assistance and encouragement: the late André Descarpentries, for sharing some of his enthusiasm for the Madagascan buprestid fauna; Jean-Jean Menier, Thierry Deuve, Jean Legrand, Olivier Montreuil, Miss Isabelle Bruneau de Miré, MNHN, for the loan of various specimens and for access to the collections (1995, 1996, 1998, 2004, 2005); Gianfranco Curletti, MCC; Svata Bílý, NMPC, for many favors and loans over the years and for his hospitality during my visits to his office and home; Mrs Olga Ravoahangimalala Ramilijaona for her translation; André Olwage for his beautiful water-color drawings; Jean-François Vayssières who lent us samples (pl. 3, figs 22-23 ; pl. 5, figs 34, 37-38 ; pl. 6, figs 40-41, 42-43); Olivier Simonot who gave several *Polybothris* (pl. 4, figs 30-31 ; pl. 5, figs 35-36); Alain Drumont, ISNB, who loaned a couple of *Chalcophoropsis quadrioveolata* (pl. 3, figs 25-26) ; Andy Sheppard, who assisted with the English.

Résumés / Summaries

Résumé

Ce catalogue annoté des Coléoptères Buprestidae de Madagascar, des îles Aldabra, des Comores, des Mascareignes et des Seychelles cite 74 genres valides, 18 genres mis en synonymie, 16 sous-genres inédits, 747 espèces valides, 224 espèces mises en synonymie et 20 sous-espèces, répartis en 6 sous-familles, 15 tribus et 19 sous-tribus.

Les nouveaux taxa décrits dans ce volume sont : *Thomassetiini*, *Madassetia*, gen. nov., *M. bicolor* (espèce type), *M. unicolor*; *Coraeibini*, *Compsoglyphia nigrocaerulea*, sp. nov., *Gracilocala*, gen. nov., *G. bicolor*, sp. nov. (espèce type); *Ivalouwayneia*, gen. nov., *I. ruficapiticauda*, sp. nov. (espèce type); *Paranastella viridis*, sp. nov.; *Malagascoderes*, gen. nov. est décrit pour *Discoderes goudotii* Thomson, 1878 (espèce type) et *D. scriptus* Théry, 1937, tous comb. nov.; *Madaphlocteis*, gen. nov. est décrit pour *Discoderes ochraceopicta* Fairmaire, 1888 (espèce type), *D. ampliata* Fairmaire, 1905, *D. mucorea* Fairmaire, 1902, *D. perrieri* Fairmaire, 1900, *D. polychroa* Fairmaire, 1904, *D. simplicifrons* Fairmaire, 1901, *Phlocteis ambanjana* Obenberger, 1944, *P. iridipennis* Obenberger, 1944 et *Paradora purpureosignata* Hoscheck, 1931, tous comb. nov. *Neopolycesta gebhardtii* Hoscheck, 1931 est transféré vers *Paracastalia*, comb. nov. et *Meliboëus hovanus* Théry, 1937 est mis en synonymie avec *Meliboëus miliaris* (Gory et Laporte de Castelnau, 1839), syn. nov.

La localisation du type et la distribution géographique publiée sont mentionnées. Toutes les descriptions originales valides et leurs références bibliographiques sont citées.

Summary

An annotated catalogue of the Buprestidae (Coleoptera) of Madagascar, Aldabra, the Comoros, Mascarenes and Seychelles Islands is presented for 74 genera, 18 genus-group synonyms, 16 non-nominate subgenera, 747 valid species, 20 subspecies and an additional 224 available species names in synonymy, placed in six subfamilies, 15 tribes and 19 subtribes.

New taxa from Madagascar described herein are: *Thomassetiini*, *Madassetia*, gen. nov., *M. bicolor* (type species), *M. unicolor*; *Coraeibini*, *Compsoglyphia nigrocaerulea*, sp. nov., *Gracilocala*, gen. nov., *G. bicolor*, sp. nov. (type species); *Ivalouwayneia*, gen. nov., *I. ruficapiticauda*, sp. nov. (type species); *Paranastella viridis*, sp. nov.; *Malagascoderes*, gen. nov. is described for *Discoderes goudotii* Thomson, 1878 (type species) and *D. scriptus* Théry, 1937, both comb. nov.; *Madaphlocteis*, gen. nov. is described for *Discoderes ochraceopicta* Fairmaire, 1888 (type species), *D. ampliata* Fairmaire, 1905, *D. mucorea* Fairmaire, 1902, *D. perrieri* Fairmaire, 1900, *D. polychroa* Fairmaire, 1904,

D. simplicifrons Fairmaire, 1901, *Phlocteis ambanjana* Obenberger, 1944, *P. iridipennis* Obenberger, 1944, and *Paradora purpureosignata* Hoscheck, 1931, all comb. nov. *Neopolycesta gebhardti* Hoscheck, 1931 is transferred to *Paracastalia*, comb. nov. and *Meliboeus hovanus* Théry, 1937 is synonymized with *Meliboeus miliaris* (Gory et Laporte de Castelnau, 1839), syn. nov.

The type locality from the original description or subsequently published distributional data is given. All pertinent original description and subsequent reference literature is listed.

Famintinana

Ity katalogy mirakitra ny Coléoptères Buprestidae eto Madagasikara sy ireo nosy Aldabra, Comores, Mascareignes ary seychelles dia mitanisa 74 "genres" voamarina, 18 "genres" misy hitovizana amin'ny hafa, 16 "sous-genres" mbola tsy natao fandinihana, 747 "espèces" voamarina, 224 "espèces" misy hitovizana amin'ny hafa ary 20 "sous-espèces". Ireo dia voantsijara ao anaty zana-pianakaviana 6, foko 15 ary 19 zana-poko.

Ny karazany vaovao nodinihana ao anatin'ity raki-tsoratra ity : Thomassetiini, *Madassetia*, gen. nov., *M. bicolor* (type species), *M. unicolor*, Coraebini, *Compsoglypha nigrocaerulea*, sp. nov., *Gracilocala*, gen. nov., *G. bicolor*, sp. nov. (type species), *Ivalouwayneia*, gen. nov., *I. ruficapiticauda*, sp. nov. (type species), *Paranastella viridis*, sp. nov., *Malagascoredes*, gen. nov., dia voadinika avy amin'i *Discoderes goudotii*, Thomson, 1878 (type species) sy *D. scriptus* Théry, 1937, comb. nov.; *Madaphlocteis*, gen. nov. dia voadinika avy amin'i *Discoderes ochraceopicta* Fairmaire, 1888 (type species), *D. ampliata* Fairmaire, 1905, *D. mucorea* Fairmaire, 1902, *D. perrieri* Fairmaire, 1900, *D. polychroa* Fairmaire, 1904, *D. simplifrons* Fairmaire, 1901, *Phlocteis ambanjana* Obenberger, 1944, *P. iridipennis* Obenberger, 1944 ary *Paradora purpureosignata* Hoscheck, 1931, comb. nov., *Neopolycesta gebhardti* Hoscheck, 1931 dia nafindra ho *Paracastalia*, comb. nov. ary *Meliboeus hovanus* Théry, 1937 dia mitovy amin'i *Meliboeus miliaris* (Gory et Laporte de Castelnau, 1839), syn. nov.

Ny nahitana ny karazany sy ny fitsinjarana ara-jeografia efa navoaka ara-tsoratra dia voalaza. Ny fandinihana rehetra hatrany am-boalohany voamarina sy ireo mari-pamantarana bibliografika misy azireo dia voatanisa.

(translation by Mrs Olga Ravoahangimalala Ramilijaona)

Mots-clés

Coleoptera, Buprestidae, Madagascar, Aldabra, Comores, Mascareignes, catalogue, biodiversité, systématique, bibliographie, distribution géographique, zoogéographie.

Keywords

Coleoptera, Buprestidae, Madagascar, Aldabra, Comoro, Mascarine islands, catalogue, biodiversity, systematics, bibliography, geographical distribution, zoogeography.

Teny fototra

Coleoptera, Buprestidae, Madagasikara, Aldabra, Comores, Mascareignes, katalogy, biby sy zava-maniry isan-karazany, fisokajiana, bibliografia, fizarana ara-jeografia, fizaran'ny biby ara-jeografia.

Introduction

Few places on earth excite natural historians more than the island of Madagascar. From the diversity of its habitats to the uniqueness of many elements of its flora and fauna, this island is one of the richest, yet most compact examples of biodiversity on the earth. Fears of deforestation and erosion still exist, but attention by many interested parties in the last decade have helped set aside many national parks and tracts of habitat, parts of which still remain in nearly pristine condition.

This work is the first concise account of the jewel beetles (Coleoptera: Buprestidae) from Madagascar since the earlier catalogues of Alluaud (1900b), Théry (1905) and Marie et Lesne (1917). The fauna of the adjacent Comoro islands was reviewed by Descarpentries (1978) and that of the Mascarene islands was from an earlier work by Lesne (1918), with a recent checklist of Coleoptera by Gomy (2000). Many of the buprestid taxa from these islands were listed in the fascicles of the *Coleopterorum Catalogus* by Obenberger (1926a, 1930, 1934a, 1934b, 1936a, 1937a), but significant additions have been made since the completion of that work.

In a sense, this is only a preliminary work as many new Madagascan species await description (Bellamy, 2001a). However, with the current attention to field work in the newly protected areas of Madagascar and the extent of the destruction outside those areas, an accounting of what has already been recorded will be helpful to those trying to identify the extant fauna.

Due to the close relationship of the adjacent island fauna, I have added the species from the Aldabra, Comoros, Mascarenes and Seychelles islands or islands groups. This work thus comprises a complete account of the Malagasy Region province for buprestids already known to science with several new taxa added.

MATÉRIEL ET MÉTHODES / MATERIALS AND METHODS

Sigles / Abbreviations

- CLBC: C.L. Bellamy research collection, Sacramento, California, USA;
BMNH: The Natural History Museum (ex British Museum, Natural History), London, United Kingdom;

HMUG: Hunterian Museum, University of Glasgow, Scotland;
 ISNB: Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, Bruxelles, Belgium;
 MCTJ: Miyashita collection, Tokyo, Japan;
 MCC: Museo Civico di Storia Naturale, Carmagnola, Italy;
 MNHN: Muséum national d'Histoire naturelle, Paris, France;
 MRAC: Musée royal de l'Afrique centrale, Tervuren, Belgium;
 MRSN: Museo Regionale Scienze Naturali, Turin, Italia;
 MZHF: Finnish Museum of Natural History, Helsinki, Finland;
 NHMB: Naturhistorisches Museum, Basel, Switzerland;
 NMPC: Narodni Museum, Prague, Czech Republic;
 RHCP: R. Holyński, collection, Milanówek, Poland;
 RMNH: Nationaal Natuurhistorische Museum, Leiden, The Netherlands;
 SAMC: South African Museum, Cape Town, South Africa;
 TNSC: T. Neef de Sainval collection, Bruxelles, Belgium;
 UZIU: Zoological Museum, Uppsala University, Sweden;
 ZINAS: Zoological Institute, Academy of Sciences, St. Petersburg, Russia;
 ZMHB: Museum für Naturkunde der Humboldt Universität zu Berlin, Germany.

Abbreviations / Abbreviations used in the text

ab. — aberration (nom infrasubspécifique invalide / unavailable
 infrasubspecific name)
 comb. nov. — nouvelle combinaison / new combination
 gen. — genre / genera, genus
 gen. nov. — genre nouveau / new genus
in litt. — *in litteris* (taxon manuscrit, non publié / manuscript name,
 unpublished, unavailable)
nom. nov. — *nomen novum* (nom nouveau / new name)
nom. nud. — *nomen nudum* (nom sans description, non disponible / name without
 description, unavailable)
nom. praeocc. — nom déjà utilisé / preoccupied name
nom. superfl. — nom superflu / superfluous name, unnecessary replacement name
s. g. indef. — sous-genre non défini / undefined subgenus
sp. nov. — espèce nouvelle / new species
 spp. — espèces / species

stat. rev.	— statut révisé / status revised
subsp.	— sous-espèce / subspecies
s. str.	— <i>sensu stricto</i>
syn. nov.	— nouvelle synonymie / new synonymy
var.	— variété / variety

CLASSIFICATION


The classification scheme employed herein has evolved from a global level catalogue for Buprestoidea (Bellamy, in prep.). A summary of the current higher classification is available (Bellamy, 2003b). The scheme follows the recent works that have commented on, at least in part, the relationships and sequence of taxa in the family or in specific subfamilies or tribes (e.g. Bellamy, 1985 — Hołyński, 1993a — Kolibáč, 2001 — Kubáň *et al.*, 2001 — Volkovitsh, 2001 — Volkovitsh *et al.*, 2001). These works have contributed to the synthesized organization presented herein.

Distribution

The localities listed under Distribution for each species are those available from the literature, both historical and recent. A number of species are known only from the original description details, with many of the older taxa recorded with no detail finer than "Madagascar". Many of the type localities published for taxa described by Obenberger are perhaps not valid place names, but were likely the only data presented to Dr. Obenberger with the specimens. Many of his taxa were described from specimens sent to him by Czech collectors and other European colleagues and while we may not be able to resolve the exact locality and orthography of the type localities now, perhaps eventually all will become clear.

The traditional locality names from the original descriptions and subsequent distributional localities have been included and the modern French / Malagasy equivalents have been added with the kind assistance of Dr P. Viette (Viette, 1991).

An comprehensive overview of Madagascar and the surrounding islands as well as the phytogeographic divisions of Madagascar was presented by Perrier de la Bâthie (1921) and repeated by Descarpentries (1950).



Carte administrative de Madagascar / Administrative map of Madagascar.

Noms infrasubspécifiques / Infrasubspecific names

In the most recent edition of the International Code of Zoological Nomenclature (ICZN, 1999), Articles 45.5 and 45.6 discuss infrasubspecific names and criteria for the determination of such in subsequent usage and application. More specifically Art. 45.6.4 states that a name originally proposed as "variety" or "variété / variety" "is subspecific unless the author expressly gave it infrasubspecific rank, or the content of the work unambiguously reveals that the name was proposed for an infrasubspecific entity, in which case it is infrasubspecific." In the taxonomy of Madagascan jewel beetles there are a number of names originally proposed as variaties, all of which were proposed by either Obenberger, or Théry. To decide about the particular names from these two buprestid authorities, I chose to follow the opinion of Holm et Gussmann (1992) who surmised that since both Obenberger, and Théry, in their respective numerous contributions on buprestids of the world, clearly used the ranks of 'species', 'subspecies' and 'variety', each then had a working philosophy that allows us to see that their respective use of 'variety' is clearly infrasubspecific. Obenberger, went further in naming many hundreds of aberrations in various genera, but that rank is clearly infrasubspecific and all such names are unavailable.

However, since it could be argued that these suspected philosophies of Obenberger and Théry may have evolved over the course of their working lives, a 'variety' published in the early part of a career may have connoted something entirely different than the use of that term years later. Therefore, this situation remains ambiguous, and thus in this catalogue, I have listed all variety names as synonyms, which allows them to be recognized at the subspecies rank in the future. All aberrations are treated as unavailable names.



Taxa nouveaux, combinaisons et synonymies nouvelles, taxa supprimés / New taxa, combination, synonymy and excluded taxa

TAXA NOUVEAUX / NEW TAXA

As discussed above, there are many new buprestid taxa awaiting discussion, most having been recovered from the nests of *Cerceris* wasps (Bellamy, 2001a); this catalogue provides the opportunity to propose several of those new taxa now. One new genus and two new species placed in the tribe Thomassetiini Bellamy, 1987 are described. Most of the new taxa awaiting description, and the remainder of those described herein, are from the tribe Coraebini Bedel, 1921. One new species of *Compsoglypha* Fairmaire, 1904, one new species of *Paranastella* Obenberger, 1931, and two new monotypic genera are described. Eleven species previously described and/or subsequently placed in *Discoderes* Chevrolat, 1838 or *Phlocteis* Kerremans, 1893 are transferred to two new genera.

Tribu / Tribe **Thomassetiini** Bellamy, 1987

Genre / Genus **Madassetia**, gen. nov.

Espèce type du genre / Genus type species

Madassetia bicolor, sp. nov. (nouvelle dénomination / new designation).

Description

Small, length less than 10.0 mm, elongate, subcylindrical, transversely convex above and below; surface strongly punctuate, elytra striatopunctate; vestiture reduced dorsally, more dense and long ventrally; head with frontovertex slightly projecting between eyes; eyes moderate, well-separated, converging dorsally; frontoclypeus angulately narrowing between widely separated antennal cavities; clypeal distal margin emarginate; antennae with expanded, rounded serrate antennomeres from antennomere 4; pronotum with width subequal to length, widest at posterior margin; anterior margin nearly evenly transverse;

posterior margin sinuate on either side; lateral margins feebly arcuate; lateroposterior angles subacute; disc transversely convex, one pair of small depressions on either side of midpoint; one small, deep fovea anterior to scutellum, with short, narrow longitudinal depression anterior to fovea; scutellum small, ovoid; elytral much wider opposite humeri than pronotum; transversely convex; longitudinally costate; lateral margins serrate in posterior half; apices separately bidentate; epipleuron moderately developed, extending to opposite metacoxa; thoracic ventrites: with anterior margin of prosternum evenly transverse; prosternal process slightly narrowed between procoxae, expanding posteriorly; abdominal ventrites: each progressively shorter, 1-4, 5 about same length as 2 + 3, apically truncate; femora feebly fusiform, tibiae long, slender; tarsomeres 1-4 each with ventral pulvillus; 5 with claws swollen basally.

Derivatio nominis

The masculine genus group name is a combination of the prefix "*Mada*" from Madagascar and the suffix "*ssetia*" from *Thomassetia* to indicate a putative relationship.

Commentaire / Comments

This new genus is provisionally placed in *Thomassetiini* due to the overall similarity to such African genera as *Jakovleviola* Obenberger, 1924, *Thomassetia* Théry, 1928, *Augrabies* Bellamy, 1987 and *Roswitha* Bellamy, 1997. There are also similarities to the large, widely distributed *Philanthaxia* Deyrolle, 1864.

Madassetia bicolor, sp. nov.

(Pl. 1, fig. 1-3)

Description de l'holotype mâle / Description of male holotype

Length 8.6 mm, width 3.2 mm; elongate ovoid, subcylindrical, transversely convex above and below; coloration: majority of vertex, frons, lateral 1/4 of pronotum, median area on either side of metasternum and abdominal ventrites iridescent green with faint cupreous reflections from rim of each coarse puncture; remainder of vertex, median 1/2 of pronotum and elytra faintly iridescent burgundy with elytral costae darker; remainder of underside, antennae and legs blue-green; surface strongly punctate, elytra striatopunctate; dorsal vestiture reduced to absent, each large puncture on frontovertex with one small, semi-erect seta; vestiture more dense and long ventrally; head with frontovertex slightly projecting between eyes; eyes moderate, well-separated, converging dorsally; frontoclypeus angulately narrowing between widely separated antennal cavities; clypeal distal margin emarginate; antennae with expanded, rounded serrate antennomeres from antennomere 4; pronotum with width subequal to length, widest at posterior margin; anterior margin nearly evenly transverse; posterior margin sinuate on either side; lateral margins feebly arcuate; lateroposterior angles subacute; disc transversely convex, one pair of small depressions on either side of midpoint; scutellum small, ovoid; elytral much wider opposite humeri than pronotum; transversely convex; longitudinally costate; lateral margins serrate in posterior half; apices separately bidentate; epipleuron moderately developed, extending to opposite metacoxa; thoracic ventrites: with anterior margin of prosternum evenly transverse; prosternal process slightly narrowed between procoxae, expanding posteriorly; abdominal ventrites: each progressively shorter, 1-4, 5 about same length as 2 + 3, apically truncate; femora feebly fusiform, tibiae long, slender; tarsomeres 1-4 each with ventral pulvillus; 5 with claws swollen basally; aedeagus as in fig. 3.

Spécimens examinés / Specimens examined

Holotype ♂ (MNHN ex MCTJ): MADAGASCAR EST: Vondrozo (VADON).

Derivatio nominis

The species is named for the essentially bichromatic body.

Commentaire / Comments

This species can be distinguished from the following new species by the differing coloration and the respective male genitalia.

Madassetia unicolor, sp. nov.

(Pl. 1, fig. 4-5)

Description de l'holotype mâle / Description of male holotype

Length 9.0 mm, width 3.2 mm; elongate ovoid, subcylindrical, transversely convex above and below; coloration: majority of head, pronotum and ventral surface black with deep red reflection; genae and mentum iridescent green; elytra dark burgundy; antennae with faint iridescent blue-green reflection; legs blue-green; surface strongly punctate, elytra striatopunctate; dorsal vestiture reduced to absent, each large puncture on frontovertex with one small, semi-erect seta; vestiture more dense and long ventrally; head with frontovertex slightly projecting between eyes; eyes moderate, well-separated, converging dorsally; frontoclypeus angulately narrowing between widely separated antennal cavities; clypeal distal margin emarginate; antennae with expanded, rounded serrate antennomeres from antennomere 4; pronotum with width subequal to length, widest at posterior margin; anterior margin nearly evenly transverse; posterior margin sinuate on either side; lateral margins feebly arcuate; lateroposterior angles subacute; disc transversely convex, one pair of small depressions on either side of midpoint; scutellum small, ovoid; elytral much wider opposite humeri than pronotum; transversely convex; longitudinally costate; lateral margins serrate in posterior half; apices separately bidentate; epipleuron moderately developed, extending to opposite metacoxa; thoracic ventrites: with anterior margin of prosternum evenly transverse; prosternal process slightly narrowed between procoxae, expanding posteriorly; abdominal ventrites: each progressively shorter, 1-4, 5 about same length as 2 + 3, apically truncate; femora feebly fusiform, tibiae long, slender; tarsomeres 1-4 each with ventral pulvillus; 5 with claws swollen basally; aedeagus as in fig. 5.

Spécimens examinés / Specimens examined

Holotype ♂ (MNHN ex MCTJ): MADAGASCAR EST: Perinet, XII. 1974 (PEYRIERAS).

Derivatio nominis

The species is named for the essentially monochromatic nature of the body.

Commentaire / Comments

This species can be distinguished from *M. bicolor* as discussed above. The illustration of the aedeagus (fig. 5) was taken through the yellowish mounting medium used to mount this structure.

Tribu / Tribe **Coraebini** Bedel, 1921

Genre / Genus *Compsoglypha* Fairmaire, 1904

Compsoglypha Fairmaire, 1904: 233 [Espèce type / Type species: *Compsoglypha perrieri* Fairmaire, (monotypie / monotypy)]

Commentaire / Comments

While there has been confusion about the higher placement of this genus in the past (see entire citation below), the two species of *Compsoglypha* are clearly coraebine by virtue of the particular structure of the:

- 1) head (frontovertex projecting between eyes, frontoclypeus narrowed between large eyes with transverse preantennal groove dorsal to antennal cavities);
- 2) prosternum (strongly projecting mentonnière);
- 3) abdomen (projecting laterally beyond lateral elytral margin);
- 4) male genitalia (e.g. Pl. 1, fig. 8, more detailed, expanded parameres).

Compsoglypha nigrocaerulea, sp. nov.

(Pl. 1, fig. 6-8)

Description de l'holotype mâle / Description of male holotype

Length 15.0 mm, width 5.6 mm, widest at humeri; elongate ovoid, flattened above, transversely convex below; shining black throughout with cupreous reflections around or within each of the various depressions, including those excavated regions below the respective legs; dorsal surface finely shagreened, with small, irregular, widely separated punctures; ventral surface: prosternal process, median area of remaining thoracic and abdominal ventrites irregularly, finely punctate; lateral areas finely imbricate; depressed areas of frontovertex, pronotum and elytra with dense, white, recumbent setae concentrated within; configuration and distribution of small elytral depressions as in fig. 6; ventral surface with sparse, fine, adpressed, white setae on the imbricate portions; two small setal patches on either side of abdominal ventrites 2-5; median portion of thoracic ventrites glabrous; head with frontovertex slightly projecting beyond outline of large eyes, strongly, broadly, longitudinally grooved between eyes; eyes feebly diverging dorsally, circumocular groove extends along inner margin from beyond dorsal apex to beyond ventral apex; preantennal groove feebly arcuate; disc of frontoclypeus very finely strigulate, strongly narrowed between large antennal cavities, then widening to explanate transverse ventral margin; gena obtuse, not strongly projecting, depressed beneath eye for basal antennomeres in repose; antennomere 2 approximately equal in length to 3 + 4; 3 and 4 subserrate; 5-10 serrate, wider than long; 11 obtuse; pronotum with anterior margin arcuate, posterior margin arcuate on either side of narrow transverse prescutellar region; lateral margins widest at subacute lateroposterior angles, arcuate and narrowing to lateroanterior angles; disc with pair of longitudinal calloused areas medially, other depressions and elevations as in fig. 6; scutellum elongate triangular, posterior angle elongate, strongly attenuate; elytra with humeri strongly elevated, depressed inward in strong arc around small medial elevation on either side of scutellum; lateral margins narrowing beyond humeri, then widening again from about midpoint to arcuate extent before gradually narrowing to separately, narrowly rounded apices; margin finely serrate in posterior 1/3; disc irregular with very vague longitudinal, multiply sinuate, feeble, wide costa on either side; one pair

of small oblique elevations subapically, slightly projecting beyond marginal outline; epipleuron narrow from base to opposite metepisternum, not well separated from disc; in anterior portion strongly declivous and excavate to receive mesofemur apex in repose; pygidium with projecting, attenuate spine visible between elytral apices; prosternum with mentonnière strongly projecting, nearly entire except for small lateral notch adjacent to genal depression; process with pair of small longitudinal depressions medially; abdominal ventrites 2-5 each with small, feebly elevated calloused area at lateroanterior angle, each with fringe of white setae along interior margin; metatarsi with setal comb entire on outer face; tarsomeres 1-4 each with wide ventral pulvillus, 5 with claws bifid, inner claws short, stout; aedeagus as in fig. 8.

Spécimens examinés / Specimens examined

Holotype ♂ (MNHN ex MCTJ): MADAGASCAR OUEST: est de Sakaraha, rés. du Zombisy, 10. XII. 1980 (PEYRIERAS).

Derivatio nominis

The species is named for the coloration, predominantly black with blue reflections.

Commentaire / Comments

This new species differs from *C. perrieri* which is more slender in proportion, black on the elytral disc but otherwise strongly roseocupreous and otherwise with a completely different distribution and configuration of depressions on the pronotum and elytra. In addition, *C. perrieri* has the first visible abdominal ventrite longitudinally sulcate with short white setae within.

Genre / Genus *Gracilocala*, gen. nov.

Espèce type du genre / Genus type species

Gracilocala bicolor, sp. nov. (nouvelle dénomination / new designation).

Description

Elongate-ovoid, slender, subparallel, flattened above and transversely convex ventrally; head with frontovertex very feebly projecting anteriorly, longitudinally depressed between eyes; eyes large, with incomplete circumocular groove although entire around inner margins; transverse supra-antennal groove confluent with circumocular grooves; antennal cavities large, subcontiguous; distal margin of frontoclypeus transverse, with short ventrally-deflected edge; gena short, without distal projection; oblique depression from frontoclypeus to gena for antennae in repose; antennae serrate from antennomere 5; pronotum wider than longer, wider above posterior margin; disc evenly convex, oblique depression laterally between disc and sinuate prelateral carina; lateral margin ventrally-deflected, entire; scutellum rounded equilateral triangle; elytra wider opposite humeri than pronotum; disc very feebly transversely convex, with only one small depression between humerus and scutellum; epipleuron short, extending to before anterior suture of metacoxa, then narrowing strongly and extending to before apex; pygidium with sharp, narrow, acuminate lobe projecting between elytral apices; prosternum with short, subtruncate, wide mentonnière, with notch laterally for antennae in repose; prosternal process slightly expanded posterior to procoxae; metacoxal plate with posterior margin sinuate, explanate, with slight ventral flair; lateral projection of basal abdominal tergites

visible lateral to elytral margin posterior to wider basal extent of epipleuron; abdominal ventrite 1 slightly longer than 2, transverse suture between 1 and 2 invisible medially; 4 shorter than 3; 5 longer than 4, very slightly narrowing to subtruncate apex; femora fusiform; tibiae narrow, feebly arcuate; tarsi with ventral pulvilli on tarsomeres 1-4; 5 with claws bifid.

Derivatio nominis

The feminine genus group name is a combination of the prefix for slender "*gracil*" and the suffix from the putative nearest relative *Chloricala* Kerremans, 1893.

Commentaire / Comments

As indicated above, this new genus comes nearest to *Chloricala* in the Madagascan fauna but differs by being much more slender in overall proportion and attenuate posteriorly.

Gracilocala bicolor, sp. nov.

(Pl. 1, fig. 9-11)

Description de l'holotype mâle / Description of male holotype

Length 13.5 mm, width 4.2 mm; elongate-ovoid, slender, subparallel, flattened above and transversely convex ventrally; head, pronotum and approximately apical 1/5 of elytra black with deep blue reflection; ventral surface and legs blue-green; head and pronotum finely shagreened, lateroposterior area of pronotum coarsely imbricate; elytra, median portion of thoracic and abdominal ventrites sparsely, irregularly, shallowly punctate; lateral portion of thoracic and abdominal ventrites imbricate; dorsal surface glabrous; ventral surface glabrous medially, hypomerion, mesosternum and depressed region of abdominal ventrite 1 with moderately covering of short, adpressed, white setae; head with frontovertex very feebly projecting anteriorly, longitudinally depressed between eyes; eyes large, with incomplete circumocular groove although entire around inner margins; transverse supra-antennal groove confluent with circumocular grooves; antennal cavities large, subcontiguous; distal margin of frontoclypeus transverse, with short ventrally-deflected edge; gena short, without distal projection; oblique depression from frontoclypeus to gena for antennae in repose; antennae serrate from antennomere 5; pronotum 1.6 times wider than longer, wider above posterior margin; disc evenly convex, oblique depression laterally between disc and sinuate prelateral carina; lateral margin ventrally-deflected, entire; scutellum rounded equilateral triangle; elytra wider opposite humeri than pronotum; disc very feebly transversely convex, with only one small depression between humerus and scutellum; epipleuron short, extending to before anterior suture of metacoxa, then narrowing strongly and extending to before apex; pygidium with sharp, narrow, acuminate lobe projecting between elytral apices; prosternum with short, subtruncate, wide mentonnière, with notch laterally for antennae in repose; prosternal process slightly expanded posterior to procoxae; metacoxal plate with posterior margin sinuate, explanate, with slight ventral flair; lateral projection of basal abdominal tergites visible lateral to elytral margin posterior to wider basal extent of epipleuron; abdominal ventrite 1 slightly longer than 2, transverse suture between 1 and 2 invisible medially; 4 shorter than 3; 5 longer than 4, very slightly narrowing to subtruncate apex; femora fusiform; tibiae narrow, feebly arcuate; tarsi with ventral pulvilli on tarsomeres 1-4; 5 with claws bifid; aedeagus as in fig. 11.

Spécimens examinés / Specimens examined

Holotype ♂ (MNHN ex MCTJ): MADAGASCAR EST: S.-P. de Maroantsetra, base de la presqu'île de Masoala (massif de l'Ambohitsitondrona), Hiarak, 1000 m (PEYRIERAS).

Etymologie / Etymology

The species is named for the bichromatic coloration.

Commentaire / Comments

Unfortunately only a single male specimen is available and its relatively large size, for the Madagascan coraebine fauna, suggests that it might be of an upper size limit for the predator wasps.

Genre / Genus *Ivalouwayneia*, gen. nov.

Espèce type du genre / Genus type species

Ivalouwayneia ruficapiticauda, sp. nov. (nouvelle dénomination / new designation).

Description

Elongate ovoid, subcylindrical, flattened above, transversely convex below; surface punctate, imbricate; vestiture reduced to very fine setae, one from each puncture and squamose setae on specific portions and configurations of both dorsal and ventral surface; frontovertex bilobed, longitudinally sulcate between large eyes; inner margin of eyes diverging dorsally; circumocular groove present, confluent with supra-antennal groove; frontoclypeus compressed between antennal cavities; gena depressed to receive basal antennomeres, projection subacute; antennae serrate from antennomere 4; pronotum with length and width subequal, widest in posterior half; anterior margin moderately arcuate; posterior margin bisinuate on either side of truncate prescutellar lobe; lateral margins arcuate, lateral carina entire; disc transversely convex; one small prelateral carina on either side; scutellum triangular; elytral width equal to pronotum, widest both opposite humeri and at posterior 1/3; disc even, moderately transversely convex, except for pair of small depressions between humeri and scutellum and pair of preapical swellings; lateral margin narrows after humeri before gradually expanding from near midpoint to posterior 1/3, then strongly narrowing to separately rounded, serrulate apices; fine, narrow, pygidial spine visible between elytral apices; epipleuron short, thin; lateral margin of abdominal tergites visible; prosternum with short, broad mentonierre; metacoxal plate with posterior margin bisinuate; abdominal ventrite 1 approximately as long as 2 + 3; 4 shorter than 3, 5 longer than 4, broadly rounded apically; legs with narrow, fusiform femora; tibia nearly straight, with single apical tooth; tarsi with tarsomeres 1-4 with ventral pulvilli, 5 with claws appendiculate basally.

Derivatio nominis

This new feminine genus is named for my mother and father, Ivalou and Charles Wayne Bellamy, for 54 years of their love, support, teaching and good example.

Commentaire / Comments

This new genus differs from those already known in the Madagascan fauna and isn't particularly similar to any of the described taxa. As I continue the organization and description of the vast Coraebini of Madagascar, I hope to be able to propose suitable groupings.

Ivalouwayneia ruficapiticauda, sp. nov.

(Pl. 2, fig. 12, 13)

Description de l'holotype mâle / Description of male holotype

Small, length 7.2 mm, width 1.9 mm; elongate ovoid, subcylindrical, flattened above, transversely convex below; color shining black with blue to purple reflections except for vertex, frons and extreme elytral apex a shining red-coppery; surface imbricate with coarse, dense punctures on head and pronotum, elytra and ventral surface with punctures smaller, less dense; vestiture reduced to very fine setae, one from each puncture; squamose setae in longitudinal depression of frons, pair of entire longitudinal vitae on pronotum, pair of sinuate vitae on elytra extending from anterior margin to posterior 1/3, pair of small, concave preapical fasciae; ventral surface with squamose setae moderately dense over entire thoracic ventrites and most of abdominal ventrites 1 and 2, and anterolateral angle of 3; frontovertex bilobed, longitudinally sulcate between large eyes and slightly projecting beyond outline of eyes when viewed from above; inner margin of eyes diverging dorsally; circumocular groove present from near dorsal apex of eye to lateral side of ventral apex; circumocular groove confluent with pair of small, arcuate supra-antennal grooves; frontoclypeus compressed between antennal cavities; gena depressed laterally to receive basal antennomeres, lateral apical projection subacute; antennae with antennomere 2 longer, slightly wider than 3, triangularly serrate from 4-11; pronotum with length and width subequal, widest in posterior half; anterior margin moderately arcuate; posterior margin bisinuate on either side of truncate prescutellar lobe; lateral margins arcuate, lateral carina entire; lateroposterior angle strongly obtuse; disc transversely convex; one small prelateral carina on either side; scutellum triangular, angles rounded; elytral width equal to pronotum, widest both opposite humeri and at posterior 1/3; disc even, moderately transversely convex, except for pair of small depressions between humeri and scutellum and pair of preapical swellings; lateral margin narrows after humeri before *gradually* expanding from near midpoint to posterior 1/3, then strongly narrowing to separately rounded, serrulate apices; fine, narrow, pygidial spine visible between elytral apices; epipleuron short, thin, extending not quite opposite anterior margin of metacoxa; lateral margin of abdominal tergites visible; prosternum with short, broad mentonierre; metacoxal plate with posterior margin bisinuate; abdominal ventrite 1 approximately as long as 2 + 3; 4 shorter than 3, 5 longer than 4, broadly rounded apically; legs with narrow, fusiform femora; tibia nearly straight, with single apical tooth; tarsi with tarsomeres 1-4 each with ventral pulvillus, 5 with claws appendiculate basally; aedeagus as in fig. 13.

Variabilité / Variation

♂♂ (n = 13), length 6.3-8.6 mm, width 1.7-2.3 mm; ♀♀ (n = 13), length 7.4-8.8 mm, width 2.0-2.4 mm; there is a slight variation in the extent of the elytral apex that has the red-coppery coloring but otherwise the type series is remarkably uniform except for aspects of wear or slight damage during preparation such as the abrasion of squamose setae on some specimens.

Spécimens examinés / Specimens examined

Holotype ♂ (MNHN): MADAGASCAR EST: S.-P. de Mananara Nord, Antananambe, I. (19) 67 (VADON et PEYRIERAS); 26 paratypes (MNHN, CLBC, MCTJ, TNSC): 2 ♂♂, 3 ♀♀ same data as holotype; 2 ♀♀ same data except II. (19) 67; 1 ♂ same data except XII. 1965; 1 ♂ same data except Seranambe, II. (19) 65; 2 ♂♂, 3 ♀♀ S.-P. de Maroantsetra, Antakotako / Janv.; 4 ♂♂ same data but without date; 1 ♂ same data except Ankovana,

II. 1965; 2 ♀♀ Belalona, 30 km south-west of Sambava, XI. 1968 (VADON et PEYRIERAS); 1 ♀ same data except I. 1970; 1 ♀ same data except II. 1970; 2 ♂♂, 1 ♀ Vondrozo, XII. 1966 (VADON). 1 ex., R. Anosibe, 25. XII. (19) 52 (h) / René Vieu Entomologie Tananarive (p).

Derivatio nominis

The specific epithet is chosen to note the bright reddish-orange coloration (Latin, *rufi*, for reddish-orange) found on the frontovertex (Latin, *capi*, for head) and the elytral apex (Latin, *cauda*, for tail).

Commentaire / Comments

This very distinct (coloration, vestiture) taxon should be recognizable amongst the wealth of related small buprestids from Madagascar.

Les genres *Discoderes* Chevrolat, 1838 et *Phlocteis* Kerremans, 1893 à Madagascar / The genera *Discoderes* Chevrolat, 1838 and *Phlocteis* Kerremans, 1893 in Madagascar

The genera *Discoderes* Chevrolat, 1838 [Genus type species: *Agrilus salzmanni* Solier, 1833 (original designation)] and *Phlocteis* Kerremans, 1893 [Genus type species: *Buprestis exasperata* Swartz, in Schönherr, 1817 (original designation)], are both small genera as defined in earlier works (Bellamy, 1986, 1988, 2001a). *Discoderes* contains two Subsaharan African species and *Phlocteis* contains three species from the African mainland and two from Madagascar as listed below. There are currently an additional 11 Madagascan species that were originally described in or subsequently transferred to one or the other of these genera. Having examined most of the types and the descriptions of all 11 taxa, I find that a necessary preliminary action would be to define two new genus-group names to contain them now. Further study, as my progress defining the vast Madagascan Coraebini continues, may indicate that further generic components or alternative placements are required, but for now these species will have a formal, modern "home".

Genre / Genus *Malagascoderes*, gen. nov.

Espèce type du genre / Genus type species

Discoderes goudotii Thomson, 1878 (nouvelle dénomination / new designation).

Description

Elongate ovoid, flattened above and below; integument shining black with faint blue or purple reflections, striate-punctate beneath moderately dense covering of stout recumbent setae, more or less distinctly patterned in two included species; head with frontovertex projecting beyond outline of eyes, slightly longitudinally depressed; supra-antennal grooves small, arcuate, confluent with medial depression of frontoclypeus between antennal cavities; eyes large, inner margins feebly divergent; antennae serrate from antennomere 5, 4 subserrate; pronotum wider than long, widest in anterior 1/3; anterior margin arcuate, posterior margin feebly bisinuate, lateral margin strongly arcuate, lateroposterior angle obtuse; disc convex medially, slightly more elevated in anterior 1/2, flattened posteromedially, lateral portion flattened, explanate, with prelateral carina; scutellum triangular, longer than wide; elytra approximately as wide as pronotum, widest opposite humeri

and again at apical 1/3; disc entire, transversely convex; epipleuron short, narrow; anterior abdominal tergites visible lateral to elytral margin; pygidium arcuately emarginated with short central spine visible between elytral apices; prosternum with mentonierre feebly projecting; abdominal ventrites 1 and 2 subequal, 3 slightly longer than 4, 5 longer; legs with femora fusiform, tibiae slightly longer, narrow, straight; metatibiae with setal comb on external face; tarsi with tarsomeres 1-4 each progressively slightly shorter, with ventral pulvillus; 5 with claws appendiculate basally.

Etymologie / Etymology

The masculine genus group name is a combination of the prefix "Malagas" from Malagasy and suffix "coderes" from *Discoderes*.

Commentaire / Comments

In addition to the type species, *Discoderes scriptus* Théry, 1937 is placed in *Malagascoderes*.

Malagascoderes goudotii (Thomson, 1878), comb. nov.

Discoderes goudotii Thomson, 1878b: 82 – Kerremans, 1885: 151; 1892a: 236 – Alluaud, 1900b: 196; 1903: 223 – Théry, 1905: 23, 114.

Phlocteis goudotii (Thomson): Obenberger, 1934b: 797.

Discoderes goudotii (Thomson): Théry, 1936a: 60 – Bellamy, 2001a: 67.

Malagascoderes scriptus (Théry, 1937), comb. nov.

(Pl. 2, fig. 14)

Discoderes scriptus Théry, 1937a: 85, fig. 2 – Bellamy, 2001a: 67.

Commentaire / Comments

These two species can be separated most easily by the dorsal setal pattern: *M. goudotii* is almost entirely covered with stout, beige setae, with the vertex, anteromedial 1/3 of pronotum and one pair of preapical elytral areas glabrous, while *M. scriptus* have a distinct fasciate dorsal pattern.

Genre / Genus *Madaphlocteis*, gen. nov.

Espèce type du genre / Genus type species

Discoderes perrieri Fairmaire, 1890 (nouvelle dénomination / new designation).

Description

Elongate ovoid, flattened above, feebly transversely arcuate below; surface irregularly striatocarinat; head with frontovertex quadrituberculate; frontoclypeus narrowed between antennal cavities, yet wider than width of cavity, emarginated medially; genal projection small, obtuse, gena without depression for basal antennomeres in repose; antennae serrate from antennomere 5; pronotum wider than long, widest anteriorly midpoint; anterior margin arcuate medially; lateral margin arcuate; posterior margin bisinuate; disc flattened medially, depressed in posterolateral quadrants, with four elevated gibbosities in transverse

row in anterior half; elytra as wide as pronotum opposite humeri and at posterior 1/3; disc with setal patches; apices separately rounded, margin serrulate; epipleuron short; postero-lateral angle of metacoxae and abdominal tergites visible laterad elytral margin; menton-niere bilobed; tarsal claws bifid.

Etymologie / Etymology

The feminine genus group name combines the prefix "Mada" from Madagascar with *Phlocteis*, one of the oldest names in the tribe Coraebini.

Commentaire / Comments

It is possible that these nine species are not truly congeneric, but this will only be determined as my study of the Madagascan Coraebini continues.

Madaphlocteis ambanjana (Obenberger, 1944), comb. nov.

Phlocteis ambanjana Obenberger, 1944a: 421 – Bellamy, 2001a: 66.

Madaphlocteis ampliata (Fairmaire, 1905), comb. nov.

Discoderes ampliata Fairmaire, 1905: 124 – Théry, 1905: 178 – Marie et Lesne, 1917: 40.

Phlocteis ampliata (Fairmaire): Obenberger, 1928b: 341 ; 1934b: 796 – Bellamy, 2001a: 66.

Madaphlocteis iridipennis (Obenberger, 1944), comb. nov.

Phlocteis iridipennis Obenberger, 1944a: 420 – Bellamy, 2001a: 67.

Madaphlocteis mucorea (Fairmaire, 1902), comb. nov.

Discoderes mucorea Fairmaire, 1902b: 80 – Kerremans, 1903: 223 – Théry, 1905: 24, 116 – Marie et Lesne, 1917: 40 – Obenberger, 1928b: 341 ("new genus").

Phlocteis mucorea (Fairmaire): 1934b: 798 – Bellamy, 2001a: 67.

Madaphlocteis ochraceopicta (Fairmaire, 1888), comb. nov.

Discoderes ochraceopicta Fairmaire, 1888: 56 – Kerremans, 1892a: 237 – Alluaud, 1900b: 197 – Kerremans, 1903: 223 – Théry, 1905: 24, 114, pl. IV, fig. 19 – Marie et Lesne, 1917: 40.

Phlocteis ochraceopicta (Fairmaire): Obenberger, 1934b: 798 – Bellamy, 2001a: 67.

Madaphlocteis perrieri (Fairmaire, 1900), comb. nov.

Discoderes perrieri Fairmaire, 1900: 244 – Kerremans, 1903: 223 – Théry, 1905: 24, 115 – Marie et Lesne, 1917: 40.

Phlocteis perrieri (Fairmaire): Obenberger, 1928b: 341; 1934b: 798 – Bellamy, 2001a: 67.

Madaphlocteis polychroa (Fairmaire, 1904), comb. nov.

Discoderes polychroa Fairmaire, 1904: 234 – Théry, 1905: 28, 177 – Marie et Lesne, 1917: 40.

Phlocteis polychroa (Fairmaire): Obenberger, 1928b: 341; 1934b: 798 – Bellamy, 2001a: 67.

Madaphlocteis purpureosignata (Hoschek, 1931), comb. nov.

Paradora purpureosignata Hoschek, 1931b: 735.

Phlocteis purpureosignata (Hoschek): Obenberger, 1934b: 799 – Bellamy, 2001a: 67.

Madaphlocteis simplicifrons (Fairmaire, 1901), comb. nov.

Discoderes simplicifrons Fairmaire, 1901: 163 – Kerremans, 1903: 223 – Théry, 1905: 24, 115 – Marie et Lesne, 1917: 40.

Phlocteis simplicifrons (Fairmaire): Obenberger, 1934b: 799 – Bellamy, 2001a: 67.

Genre / Genus *Paranastella* Obenberger, 1931

Paranastella Obenberger, 1931b: 198 [Espèce type du genre / Genus type species: *Paranastella strandi* Obenberger, 1931 (dénomination originale / original designation)]; 1934b: 808 – Descarpentries, 1984: 57 – Bellamy, 1985: 424; 2001: 64; 2003b: 78.

Diagnostic / Diagnosis

This interesting genus is recognized by a small suite of characters: head feebly longitudinally depressed between eyes; inner margins of eyes diverging dorsally; antennae serrate from antennomere 4; pronotum nearly as long as wide, premarginal carinae straight, nearly entire; disk of pronotum and elytra with transverse punctate striae; pygidium with strongly acute projecting medial spine visible between elytral apices; male genitalia with parameres completely fused with only a narrow apical opening for the median lobe.

Commentaire / Comments

Now expanded to three species, it is expected that additional species will be discovered. Despite the name, this genus has very little relationship with the southern African *Nastella* Kerremans, 1903 beyond common membership in *Toxoscelina* Majer, 2001.

Paranastella Obenberger, 1931 : a key to the species

- | | | |
|----|---|------------------------------------|
| 1. | Dorsal surface unicolorous, iridescent green | 2 |
| — | Dorsal surface multicolorous | <i>P. villiersi</i> Descarpentries |
| 2. | Thoracic ventrites and legs iridescent purple, abdominal ventrites dark green. | <i>P. strandi</i> Obenberger |
| — | Entire ventral surface and legs the same iridescent green as dorsal surface | <i>P. viridis</i> sp. nov. |

Paranastella Obenberger, 1931 : clé des espèces

- | | | |
|----|---|------------------------------------|
| 1. | Surface dorsale unicolore, d'un vert iridescent | 2 |
| — | Surface dorsale multicolore | <i>P. villiersi</i> Descarpentries |
| 2. | Face ventrale du thorax et pattes d'un violet iridescent, sternites abdominaux vert foncé | <i>P. strandi</i> Obenberger |
| — | Totalité de la surface ventrale et des pattes du même vert iridescent que la face dorsale | <i>P. viridis</i> sp. nov. |

Paranastella strandi Obenberger, 1931

(Pl. 2, fig. 16, 17)

Paranastella strandi Obenberger, 1931b: 198; 1934b: 808 – Descarpentries, 1984: 58, fig. 3 – Bellamy, 2001a: 64.

Description sommaire / Summary Description

Male holotype: length 5.3 mm, width 1.9 mm; color somber green, slightly golden in large lateral pronotal depressions; thoracic ventrites, legs iridescent purple, abdominal ventrites dark green; genitalia as in fig. 17.

Spécimens examinés / Specimens examined

Holotype ♂ (NMPC 23632): « Madagascar ».

Commentaire / Comments

As indicated in the key, the type species comes nearest to *P. viridis*, sp. nov. but differs by having the thoracic ventrites and legs purplish. The holotype is the only specimen known of this species.

Paranastella villiersi Descarpentries, 1984

(Pl. 2, fig. 18, 19)

Paranastella villiersi Descarpentries, 1984: 57, fig. 1, 2 – Bellamy, 2001a: 64.

Description sommaire / Summary description

Length 5.2-7.5 mm, width 1.75-2.6 mm (from original description); head and pronotum iridescent green and elytra with a partial spectrum of colors from yellow-golden along suture then orange to red to purple along lateral margins in longitudinal bands; male genitalia as in fig. 19.

Spécimens examinés / Specimens examined

Holotype ♂ (MNHN): MADAGASCAR EST: S.-P. de Maroantsetra, base de la presqu'île Masoala, massif de l'Ambohitsitondrona, Hiaraka; 8 paratypes (MNHN, CLBC): same data as holotype.

Commentaire / Comments

This is the most colorful species of the genus and the type series included 69 specimens.

Paranastella viridis, sp. nov.

(Pl. 2, fig. 20, 21)

Description de l'holotype / Description of holotype

Elongate ovoid, flattened above and below; length 6.1 mm, width 2.1 mm, widest across pronotal midpoint and just before posterior 1/3 of elytra; entire surface iridescent green tending to green-blue on the posterior half of elytral disc; dorsal surface sculpture irregularly transversely striate, with elongate punctures moderately densely spaced on interstitial transverse costae; ventral surface imbricate-striate; dorsal surface glabrous, with sparse elongate white setae on frontoclypeus between antennal cavities; ventral surface with fine, short recumbent white setae sparse throughout, more dense on thoracic and abdominal disc.

Head feebly longitudinally depressed between large eyes; inner margin of eyes diverge dorsally; circumocular groove extending from slightly beyond dorsal-most point along inner margin around ventral margin then disappearing beyond pronotum; grooves confluent with arcuate supra-antennal grooves; frontoclypeus narrowed between antennal insertions; distal margin of frontoclypeus feebly arcuately projecting medially, transverse laterally to feebly produced obtuse genal projection; antennae with antennomere 2 narrower, shorter than 1, 3 shorter, slightly more robust than 2, 4 subserrate, 5-10 triangularly serrate, 11 oblong, arcuate; pronotum 1.35 x wider than long, widest at about posterior 2/5; anterior margin strongly arcuate medially; posterior margin feeble sinuate, nearly transverse on either side of scutellum; posterolateral angle obtuse; lateral margin widely arcuate, finely crenulate; disc evenly flattened medially, very large shallow depression on either side in posterolateral corner; one longitudinal sinuate premarginal carina on either side; scutellum elongate triangular; elytra narrower at anterior margin and at humeri than pronotum, width equal to pronotum anterior of posterior 1/3; margin narrowed arcuately between humeri and widest point, then gradually narrowing to feebly, separately rounded apices; posterior margin serrulate; abdominal pleurites visible laterad elytral margin, pygidial spine visible between elytral apices; eplipleuron wide at anterior margin, narrowing sharply to a point opposite anterior margin of metacoxal plate, then very narrow yet entire to near elytral apex; prosternum without mentonniere, process parallel between procoxae; posterior margin of metacoxal plate dilated; abdominal ventrites 1 and 2 connate, longer together than 3+4+5; 5 broadly, roundly arcuate distally; femora slightly fusiform; tibiae straight; tarsi with ventral pulvilli on tarsomeres 1-4, 5 with claws stout at base; genitalia as in fig. 21.

Variabilité / Variation

♂♂ (n = 3), length 6.0-6.3 mm, width 2.1-2.2 mm; ♀♀ (n = 5), length 6.9-7.4 mm, width 2.4-2.5 mm; a slight range of green exists within this small series.

Spécimens examinés / Specimens examined

Holotype ♂ (MNHN): MADAGASCAR EST: environs de Perinet, 910 m, XII.1972 (PEYRIERAS); 2 ♂♂, 4 ♀♀ paratypes (MNHN, CLBC): same data as holotype; 1 ♂, 1 ♀ (MNHN): MADAGASCAR EST: environs de Perinet, G. Olsoufieff (OLSOUFIEFF).

Derivatio nominis

The specific epithet *viridis* indicates the green coloration.

Commentaire / Comments

This species resembles *P. strandi*, but differs by the brighter green coloration on both surfaces as indicates in the preceding key.

COMBINAISON NOUVELLE / NEW COMBINATION

Paracastalia gebhardti (Hoscheck, 1931), comb. nov.

Neopolycesta gebhardti Hoscheck, 1931: 133.

Commentaire / Comments

By the time Cobos (1981b) and Holm (1982) had restricted the definition of *Neopolycesta* Kerremans, 1906 as monotypic (for *Buprestis caffra* Thunberg, 1787), *N. gebhardti*

Hoscheck (1931: 133) was left without generic placement. Holm's (1982) subsequent revision of *Paracastalia* allows the best taxon for *N. gebhardti* to be placed in until a more detailed assessment of the Madagascan polycestines can be made in comparison to their continental African relatives.

SYNONYMIE NOUVELLE / NEW SYNONYMY

Meliboeus miliaris (Gory et Laporte de Castelnau, 1839)

Agrilus miliaris Gory et Laporte de Castelnau, 1839: 32 – Gemminger et Harold, 1869: 1442.

Meliboeus miliaris (Gory et Laporte de Castelnau): Saunders, 1871: 105 – Kerremans, 1892a: 232 – Alluaud, 1900b: 198 – Kerremans, 1903: 236 – Théry, 1905: 25, 123 – Obenberger, 1934b: 903 – Bellamy, 2001a: 63.

Meliboeus hovanus Théry, 1937a: 107 – Bellamy, 2001a: 63. *syn. nov.*

Commentaire / Comments

Unpublished notes by the late A. Descarpentries in the collection at MNHN suggested this synonymy so I compared the holotypes of both species during my 2004 visit to MNHN, and I concur that these two taxa are conspecific and propose this new synonymy now.

TAXA SUPPRIMÉS / EXCLUDED TAXA

Genre / Genus *Anadora* Kerremans, 1898

Anadora Kerremans, 1898a: 319 [Espèce type du genre / Genus type species: *Discoderes mechowi* Quedenfeldt, 1886 (par monotypie / by monotypy)] – Obenberger, 1934b: 794 – Bellamy, 1986: 102 (révision / revision).

Anadora hova Kerremans, 1899

Commentaire / Comments

Kerremans (1899: 277) described *Anadora hova*, the first species of this otherwise continental African genus, from Madagascar. It was listed in subsequent works (Alluaud, 1900: 197; Kerremans, 1903: 258; Théry, 1905: 25, 125) before Théry (1927: 260) synonymized it under *A. mechowi* (Quedenfeldt, 1886); this was followed by Obenberger (1934b: 794) and Bellamy (2001a: 67). Having studied the vast material of Madagascan Coraebini in the MNHN and finding no additional specimens therein, I do not consider this species to be a valid member of the Madagascan Buprestidae.

Genre / Genus *Nisibia* Fairmaire, 1903

Nisibia Fairmaire, 1903d: 9 [Espèce type du genre / Genus type species: *Nisibia boopis* Fairmaire, 1903 (par monotypie / by monotypy)] – Marie et Lesne, 1917: 81.

Nisibia boopis Fairmaire, 1903

Nisibia boopis Fairmaire, 1903d: 9 – Marie et Lesne, 1917: 81.

Commentaire / Comments

This genus was compared to *Agrilus* Curtis, 1825, in the original, yet brief, description (Fairmaire, 1903). Subsequently it has only been listed in the catalogue of Marie et Lesne (1917). The placement in Buprestidae and relationship to any other extant buprestid genera is doubtful. The genus name is not found in the *Index Generalis* of the *Coleopterorum Catalogus* (Schenkling, 1940) and no specimens of *Nisibia boopis* have been found in the buprestid portion of the Fairmaire collection in the MNHN.

Famille des Buprestidae / Family Buprestidae



Famille / Family **Buprestidae** Leach, 1815

Bupresti Leach, 1815 : 85.

Buprestides Eschscholtz, 1829 : 8.

Buprestidae Laporte de Castelnau, 1835 : 165.

SOUS-FAMILLE / SUBFAMILY **JULODINAE** LACORDAIRE, 1857

Julodides Lacordaire, 1857 : 10 – Kerremans, 1902 : 6 – Holm, 1979 : 89.

Julodinae Cobos, 1980 : 19 – Bellamy, 1985 : 410 – Cobos, 1986 : 67, 74 – Holyński, 1988 : 50 ; 1993a : 12 – Lawrence et Newton, 1995 : 842 – Bellamy, 2003b : 13.

Tribu / Tribe **Julodini** Lacordaire, 1857

Julodides Lacordaire, 1857 : 10 – Holm, 1979 : 89.

Julodini LeConte et Horn, 1883 : 199 – Kerremans, 1893a : 114 ; 1902 : 6.

Genre / Genus Amblysterna Saunders, 1871

Amblysterna Saunders, 1871 : 2 [Espèce type du genre / Genus type species : *Julodis natalensis* Boheman 1851 (dénomination ultérieure / subsequent designation : Holm, 1979a : 104)] – Thomson, 1878b : 8 – Kerremans, 1892a : 14 ; 1893a : 114 ; 1902 : 15 ; 1905 : 362 – Obenberger, 1926a : 32 – Holm, 1979a : 104 ; 1979b : 1 – Bellamy, 1985 : 410 – Cobos, 1986 : 75 – Holyński, 1988 : 50 ; 1993a : 16 – Bellamy, 2003b : 13.

• ***Amblysterna johnstoni* Waterhouse, 1885**

Waterhouse, 1885 : 233 – Kerremans, 1892a : 14 ; 1902 : 15 ; 1905 : 364 –
Amblysterna natalensis subsp. *johnstoni* Waterhouse : Obenberger, 1926a : 32 – Holm,
1979b : 2.

Holotype : BMNH.

Distribution : SEYCHELLES. Afrique orientale (Éthiopie, Kenya, Somalie, Tanzanie).

SOUS-FAMILLE / SUBFAMILY **POLYCESTINAE** LACORDAIRE, 1857

Polycestides (Buprestides vrais, Groupe III) Lacordaire, 1857 : 61.

Polycestinae Cobos, 1980 : 23 – Bellamy, 2003b : 14.

Haplostethinae LeConte, 1861 : 155.

Mastogeniinae Cobos, 1956 : 203.

Acmaeoderinae Cobos, 1980 : 20.

Paratrachyinae Kurosawa, 1985 : 3.

Tribu / Tribe **Haplostethini** LeConte, 1861

Haplostethinae LeConte, 1861 : 155 – Bellamy, 2003b : 14.

Mastogeniini LeConte et Horn, 1883 : 195, 199 – Kerremans, 1893a : 115 ; 1903 :
332 – Obenberger, 1937a : 1448 – Bellamy, 2003b : 14.

Genre / Genus *Mastogenius* Solier, 1849

Mastogenius Solier, 1849 : 507. [Espèce type du genre / Genus type species :
Mastogenius parallelus Solier 1849 (dénomination originale / original designation)] –
Bellamy, 1991a : 121 ; 2003b : 14.

• ***Mastogenius testaceipes* Obenberger, 1941**

Obenberger, 1941 : 58 – Bellamy, 1991a : 122.

Holotype : NMPC.

Distribution : MADAGASCAR.

Genre / Genus *Ankareus* Kerremans, 1894

Ankareus Kerremans, 1894 : 349 ; 1903 : 333 [Espèce type du genre / Genus type species : *Ankareus cyanicollis* Kerremans, 1894 (dénomination ultérieure / subsequent designation Holyński, 1984 : 108)] Théry, 1905 : 9, 11, 174 ; 1912 : 132 (clé des espèces / spp. key) – Kerremans, 1914 : 244 – Obenberger, 1928a ; 2003b : 14.

Pseudianthe Fairmaire, 1901 : 167 [Espèce type du genre / Genus type species : *Pseudianthe tenebrosa* Fairmaire, 1901 (monotypie / monotypy)] Kerremans, 1903 : 315 – Marie et Lesne, 1917 : 101 – Cobos, 1979a : 414 ; 1981a : 84 (synonyme de / synonym of *Ankareus*) – Bellamy, 1985 : 413 ; 1991a : 123 ; 2003b : 14.

Sicardia Théry, 1909 : 447 (nom. praeocc. par / by *Sicardia* Reitter, 1896) [Espèce type du genre / Genus type species : *Sicardia tristis* Théry, 1909 (monotypie / monotypy)] ; 1912 : 132 (clé des espèces / spp. key) – Obenberger, 1937a : 1449 – Cobos, 1956 : 205 ; 1981a : 72 (synonyme de / synonym of *Mastogenius*) – Holyński, 1984 : 105, 108 – Bellamy, 1985 : 413 ; 1991a : 122 ; 2003b : 14.

Obenbergerietta Strand, 1942 : 392 (nom. nov. de / for *Sicardia* Théry, 1909) – Bellamy, 1985 : 413 ; 1991a : 123 ; 2003b : 14.

• *Ankareus aeneus* Kerremans, 1894

Kerremans, 1894 : 351 — Alluaud, 1900b : 196 — Kerremans, 1903 : 333 — Théry, 1905 : 175 ; 1912 : 132 — Obenberger, 1937a : 1450 — Holyński, 1984, 1 : 108 — Bellamy, 1991a : 123.

Holotype : BMNH.

Distribution : MADAGASCAR NORD : Diégo-Suarez / Antsiranana.

• *Ankareus cyanicollis* Kerremans, 1894

Kerremans, 1894 : 350 — Alluaud, 1900b : 196 — Kerremans, 1903 : 333 — Théry, 1905 : 174 ; 1912 : 132 — Obenberger, 1937a : 1450 — Bellamy, 1991a : 123.

Holotype : BMNH.

Distribution : MADAGASCAR NORD : Diégo-Suarez / Antsiranana.

• *Ankareus gomyi* Descarpentries, 1973

Descarpentries, 1973 : 203, fig. 4 — Bellamy, 1991a : 123 — Gomy, 2000 : 63.

Holotype ♀ : MNHN.

Distribution : MASCAREIGNES : la Réunion, plaine d'Affouaches.

• *Ankareus mameti* Descarpentries, 1973

Descarpentries, 1973 : 203, fig. 5 — Bellamy, 1991a : 123 — Gomy, 2000 : 63.

Holotype ♀ : MNHN.

Distribution : MASCAREIGNES : Maurice, Cabinet.

• *Ankareus mascarenicus* Lesne, 1918

Lesne, 1918 : 468, pl. 1, fig. 9 — Obenberger, 1937a : 1450 — Vinson, 1960 : 143 ; 1967 : 325 — Descarpentries, 1973 : 203, fig. 1 — Holyński, 1984 : 108 — Bellamy, 1991a : 123 — Gomy, 2000 : 63.

Holotype : MNHN.

Distribution : MASCAREIGNES : Maurice, mont Corps de Garde, Le Pouce, Grand Bassin, Roches noires, Curepipe ; la Réunion.

• ***Ankareus micrastoides* (Théry, 1912)**

Sicardia micrastoides Théry, 1912 : 135 – Obenberger, 1937a : 1449 – *Ankareus micrastoides* (Théry) Holyński, 1984 : 108 – Bellamy, 1991a : 123.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR NORD : S.-P. de Diégo-Suarez / Antsiranana, montagne d'Ambre.

• ***Ankareus opaca* (Théry, 1912)**

Sicardia opaca Théry, 1912 : 135 – Obenberger, 1937a : 1449 – *Ankareus opaca* (Théry) Bellamy, 1991a : 123.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR NORD : S.-P. de Diégo-Suarez / Antsiranana, montagne d'Ambre.

• ***Ankareus ruficornis* Théry, 1912**

Théry, 1912 : 132 – Obenberger, 1937a : 1450 – Bellamy, 1991a : 123.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR NORD : S.-P. de Diégo-Suarez / Antsiranana, montagne d'Ambre.

• ***Ankareus rufitarsis* (Théry, 1912)**

Sicardia rufitarsis Théry, 1912 : 134 – Obenberger, 1937a : 1449 – *Ankareus rufitarsis* (Théry) Bellamy, 1991a : 123.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR NORD : S.-P. de Diégo-Suarez / Antsiranana, montagne d'Ambre.

• ***Ankareus subcyaneus* Kerremans, 1894**

Kerremans, 1894 : 351 – Alluaud, 1900b : 196 – Kerremans, 1903 : 331 – Théry, 1905 : 174 ; 1912 : 132 – Obenberger, 1937a : 1450 – Holyński, 1984 : 108 – Bellamy, 1991a : 123.

Holotype : BMNH.

Distribution : MADAGASCAR NORD : S.-P. de Diégo-Suarez / Antsiranana.

• ***Ankareus tenebrosus* (Fairmaire, 1901)**

Pseudianthe tenebrosa Fairmaire, 1901 : 28, 173 – Marie et Lesne, 1917 : 101 – Obenberger, 1937a : 1443 – *Ankaerus tenebrosus* (Fairmaire) Bellamy, 1991a : 110, 123.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR OUEST : région de Maevatanana, cause de Hukaru (nec de l'Ankara).

• **Ankareus tristis** (Théry, 1909)

Sicardia tristis Théry, 1909 : 447 ; Théry, 1912 : 132 – Obenberger, 1937a : 1449 – *Mastogenius tristis* (Théry) – Cobos, 1981a : 75 – *Ankareus tristis* (Théry) : Holyński, 1984 : 108 – Bellamy, 1991a : 123.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR SUD : Ambovombe.

• **Ankareus vinsoni** Descarpentries, 1973

Descarpentries, 1973 : 201, fig. 2, 3 – Bellamy, 1991a : 123 – Gomy, 2000 : 62.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MASCAREIGNES : Maurice, baie du Tamarin, Trois Mamelles.

Tribu / Tribe **Acmaeoderini** Kerremans, 1893

Acmaeoderini Kerremans, 1893a : 112 – Bellamy, 2003b : 15.

Genre / Genus **Acmaeodera** Eschscholtz, 1829

Acmaeodera Eschscholtz, 1829 : 9 [Espèce type du genre / Genus type species : *Buprestis cylindrica* Fabricius 1787 (dénomination ultérieure / subsequent designation : Volkovitsh, 1979 : 339)] – Théry, 1905 : 15, 29 – Bellamy, 2003b : 16.

Sous-genre / Subgenus *Brachmaeodera* Volkovitsh et Bellamy, 1992

Brachmaeodera Volkovitsh et Bellamy, 1992 : 297 [Espèce type du sous-genre / Subgenus type species : *Acmaeodera tantilla* Kerremans, 1907 (dénomination originale / original designation)] – *Acmaeodera* (*Brachmaeodera*) Volkovitsh et Bellamy : Holm et Schoeman, 1999 : 81 – Bellamy, 2003b : 17.

• ***Acmaeodera* (s. str.) apicalis** Fairmaire, 1902

Fairmaire, 1902b : 348 – Théry, 1905 : 15, 32 – Kerremans, 1907 : 448 – Marie et Lesne, 1917 : 2 – Obenberger, 1926a : 85.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR OUEST : région de Maevatanana, cause de Hukaru (nec de l'Ankara).

• ***Acmaeodera* (s. str.) atomosparsa** Fairmaire, 1897

Fairmaire, 1897 : 381 – Alluaud, 1900b : 196 – Kerremans, 1902 : 32 – Théry, 1905 : 15, 30 – Kerremans, 1907 : 374 – Marie et Lesne, 1917 : 2 – Obenberger, 1926a : 85 – Volkovitsh et Bellamy, 1992 : 303.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR OUEST : Suberbieville [= Maevatanana].

nom indisponible / unavailable name : *atomaria* Fairmaire, 1901

Fairmaire, 1901 : 160 (*nom. nud.*) – Marie et Lesne, 1917 : 2.

synonyme / synonym : *elliptica* Théry, 1905

Acmaeodera atomosparsa var. *elliptica* Théry, 1905 : 15, 30 – Kerremans, 1907 : 374 – Obenberger, 1926a : 85.

Holotype : MNHN.

• ***Acmaeodera* (s. str.) *externa* Fairmaire, 1899**

Fairmaire, 1899a : 113 – Alluaud, 1900b : 196 – Kerremans, 1902 : 32 – Théry, 1905 : 15, 30 – Kerremans, 1907 : 372 (synonyme de / synonym of *sparsuta*) – Marie et Lesne, 1917 : 2 – Obenberger, 1926a : 86.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR OUEST : environs de Suberbieville [= Maevatanana].

synonyme / synonym : *perrieri* Fairmaire, 1900

Fairmaire, 1900 : 87 – Alluaud, 1900b : 196 – Théry, 1905 : 15, 30 – Kerremans, 1907 : 372 (synonyme de / synonym of *sparsuta*) – Marie et Lesne, 1917 : 2 – Obenberger, 1926a : 86.

Holotype : MNHN.

synonyme / synonym : *rubromarginata* Théry, 1905

Acmaeodera externa var. *rubromarginata* Théry, 1905 : 30 – *Acmaeodera sparsuta* var. *rubromarginata* (Théry) Kerremans, 1907 : 372 – Obenberger, 1926a : 86.

Holotype : MNHN.

• ***Acmaeodera* (s. str.) *fairmairei* Théry, 1905**

Théry, 1905 : 15, 31, pl. I, fig. 1 – Kerremans, 1907 : 449 – Obenberger, 1926a : 86 – Descarpentries, 1966 : 47.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Maroantsetra, baie d'Antongil, Ambodivoangy ; S.-P. de Mananara Nord, Seranambe.

• ***Acmaeodera* (s. str.) *howa* Obenberger, 1924**

Obenberger, 1924 : 95 ; 1926a : 88.

Holotype : NMPC-19869.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Acmaeodera* (s. str.) *madegassa* Kerremans, 1907**

Kerremans, 1907 : 451 (*nom. nov.* de / for *Acmaeodera amplicollis* Fairmaire, 1902) – Obenberger, 1926a : 89.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR OUEST : environs de Suberbieville [= Maevatanana].

synonyme / synonym : *amplicollis* Fairmaire, 1902

Fairmaire, 1902b : 349 (nom. praeocc. par / by *Acmaeodera amplicollis* LeConte, 1866) – Théry, 1905 : 15, 32 – Kerremans, 1907 : 451 – Marie et Lesne, 1917 : 2 – Obenberger, 1926a : 89.

• *Acmaeodera (s. str.) pingicula* Obenberger, 1924

Obenberger, 1924a : 94 ; 1926a : 89.

Holotype : NMPC-19868.

Distribution : MADAGASCAR.

• *Acmaeodera (s. str.) postfasciata* Fairmaire, 1901

Fairmaire, 1901 : 160 – Théry, 1905 : 15, 31 – Kerremans, 1907 : 375 – Marie et Lesne, 1917 : 2 – Obenberger, 1926a : 89 – Volkovitsh et Bellamy, 1992 : 303.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR OUEST : région de Maevatanana, cause de Hukaru (nec de l'Ankara).

• *Acmaeodera (s. str.) pruinosa* Fairmaire, 1899

Fairmaire, 1899a : 114 – Alluaud, 1900b : 196 – Kerremans, 1902 : 36 – Théry, 1905 : 15, 30 – Kerremans, 1907 : 373 – Marie et Lesne, 1917 : 2 – Obenberger, 1926a : 90 – Volkovitsh et Bellamy, 1992 : 303.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR OUEST : Suberbieville [= Maevatanana].

• *Acmaeodera (s. str.) seyrigi* Théry, 1937

Théry, 1937a : 83, fig. 1.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR CENTRE : Bekily.

• *Acmaeodera (s. str.) sparsuta* Fairmaire, 1898

Fairmaire, 1898 : 228 – Alluaud, 1900b : 196 – Kerremans, 1902 : 32 – Théry, 1905 : 15, 30 – Kerremans, 1907 : 37 – Marie et Lesne, 1917 : 2 – Obenberger, 1926a : 90 – Volkovitsh et Bellamy, 1992 : 303.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• *Acmaeodera (Brachmaeodera) tantilla* Kerremans, 1907

Kerremans, 1907 : 376 – Obenberger, 1926a : 91 – Holm, 1978 : 45 (redescription) ; 1985 : 154 – *Brachmaeodera tantilla* (Kerremans) : Volkovitsh et Bellamy, 1992 : 298 – *Acmaeodera (Brachmaeodera) tantilla* Kerremans : Holm et Schoeman, 1999 : 80.

Holotype : SAMC 1327.

Distribution : MADAGASCAR. Botswana. Malawi. Namibie. Afrique du Sud : Natal, Transvaal. Zambie. Zimbabwe.

synonyme / synonym : *liliputana* Obenberger, 1928

Obenberger, 1928b : 94 – Holm, 1978 : 45 (synonyme de / synonym of *tantilla*) – Volkovitsh et Bellamy, 1992 : 298.

Holotype : NMPC.

synonyme / synonym : *minutissima* Théry, 1926

Théry, 1926 : 126 ; 1937a : 85 – Holm, 1979b : 25 – Volkovitsh et Bellamy, 1992 : 298.

Holotype : MNHN.

• *Acmaeodera* (*s. str.*) *tulearica* Théry, 1926

Théry, 1926 : 124, fig. 2.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR SUD : Tulear / Toliara.

Tribu / Tribe **Paratrachyini** Cobos, 1980

Paratrachysae Cobos, 1980 : 47 – Bellamy, 2003b : 19.

Genre / Genus Sponsor Gory et Laporte de Castelnau, 1839

Sponsor Gory et Laporte de Castelnau, 1839 : 1 – Guérin-Méneville, 1840 : 356 [Espèce type du genre / Genus type species : *Sponsor convexus* Gory et Laporte de Castelnau, 1839 (monotypie / monotypy)] Lacordaire, 1857 : 64 – Gemminger et Harold, 1869 : 1406 – Saunders, 1871 : 76 – Kerremans, 1892a : 162 ; 1893a : 114 ; 1902 : 37 – Théry, 1905 : 16, 32 – Kerremans, 1907 : 524 – Lesne, 1918 : 439 ; 1922 : 277 ; 1924 : 43 – Obenberger, 1926a : 46 – Théry, 1930e : 145 ; 1931b : 587 – Lesne, 1937 : 109 – Cobos, 1955 : 5 – Descarpentries, 1966 : 4 ; 1969c : 909 – Cobos, 1980 : 45 – Bellamy, 1985 : 411 – Holyński, 1992 : 134 ; 1993a : 12 – Bellamy, 2003b : 19.

Oomorpha Dejean, 1833 : 83 ; 1836 : 94 [Espèce type du genre / Genus type species : aucune dénomination / none designated] Gory, 1841 : 322 – Lacordaire, 1857 : 64 – Saunders, 1871 : 76 – Kerremans, 1892a : 162 – Bellamy, 1998c : 378 ; 2003b : 19.

Neoptosima Théry, 1905 : 16, 35 [Espèce type du genre / Genus type species : *Neoptosima spinosa* Théry, 1905 (dénomination ultérieure / subsequent designation : Bellamy, 1998b : 10)] Kerremans, 1907 : 531 (synonyme de / synonym of *Sponsor*) – Obenberger, 1926a : 47, 49 (genre valide / valid genus) – Théry, 1930e : 145 – Cobos, 1955 : 5 ; 1980 : 45 – Bellamy, 1985 : 411 – Holm et Wentzel, 1991 : 52 (synonyme de / synonym of *Sponsor*) – Holyński, 1992 : 134 – Bellamy, 2003b : 19.

Ptosimoides Kerremans, 1907 : 531 (*nom. nud.*) [Espèce type du genre / Genus type species : invalide, aucune espèce valide incluse à l'origine / invalid, no valid species originally included] – Obenberger, 1926a : 49 – Bellamy, 2003b : 19.

Sous-genre / Subgenus *Stenianthe* Fairmaire, 1886

Stenianthe Fairmaire, 1886 : 38 [Espèce type du sous-genre / Subgenus type species : *Stenianthe janthinus* Fairmaire, 1886 (monotypie / monotypy)] Kerremans, 1903 : 315 – Théry, 1905 : 16, 33 – Marie et Lesne, 1917 : 111 – Lesne, 1918 : 439 ; 1924 : 43 – Obenberger, 1926a : 47 – Lesne, 1937 : 109 – Descarpentries, 1966 : 4 ; 1969c : 909 – Cobos, 1980 : 45 – Bellamy, 1985 : 411 – Holm et Wenzel, 1991 : 58 – Holyński, 1992 : 134 – Bellamy, 2003b : 19.

Semianthe Kerremans, 1892a : 293 ; 1893a : 121 — Obenberger, 1926a : 47 — Bellamy, 2003b : 19.

• *Sponsor (s. str.) aeneiventris* Descarpentries, 1966

Descarpentries, 1966 : 40, pl. 3, fig. 25.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Maroantsetra, Antakotako ; S.-P. de Mananara Nord, Seranambe, mont Antampona.

• *Sponsor (s. str.) aeneolus* Descarpentries, 1969

Descarpentries, 1969c : 916, fig. 7.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : Belalona (30 km au sud-ouest de Sambava).

• *Sponsor (s. str.) aeneus* Guérin-Méneville, 1840

Guérin-Méneville, 1840 : 357 – Gory, 1841 : 323, pl. 54, fig. 317 – Lacordaire, 1857 : 65 – Gemminger et Harold, 1869 : 1406 – Saunders, 1871 : 76 – Kerremans, 1892a : 162 – Alluaud, 1900b : 195 – Kerremans, 1902 : 38 – Lesne, 1918 : 456 ; 1924 : 50 – Obenberger, 1926a : 47 – Lesne, 1937 : 151 – Vinson, 1960 : 138 ; 1967 : 324 – Gomy, 2000 : 61.

Holotype : MNHN.

Distribution : MASCAREIGNES : Maurice, quartier de Flacq et régions voisines.

• *Sponsor (s. str.) alluaudi* Kerremans, 1894

Kerremans, 1894 : 348 – Alluaud, 1900b : 195 – Kerremans, 1902 : 38 – Théry, 1905 : 16, 32 – Lesne, 1924 : 48 ; 1937 : 130 – Obenberger, 1926a : 47 – Lesne, 1937 : 146.

Holotype : BMNH.

Distribution : MADAGASCAR NORD : Diégo-Suarez / Antsiranana.

• *Sponsor (s. str.) ambiguus* Lesne, 1937

Lesne, 1937 : 134.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR SUD : plateau de l'Androy, Analavomdrove, Ambondro.

• ***Sponsor (s. str.) androyensis* Lesne, 1937**

Lesne, 1937 : 140.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR SUD : région de l'Androy, Ambovombe.

• ***Sponsor (s. str.) antamponensis* Descarpentries, 1966**

Descarpentries, 1966 : 45, pl. 1, fig. 15.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Mananara Nord, mont Antampona.

• ***Sponsor (Stenianthe) antanala* Descarpentries, 1969**

Descarpentries, 1969c : 909, fig. 1.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Vondrozo.

• ***Sponsor (s. str.) antelmei* Lesne, 1918**

Lesne, 1918 : 455, pl. 1, fig. 8 ; 1924 : 50 - Obenberger, 1926a : 47 - Lesne, 1937 : 150 - Vinson, 1960 : 138 ; 1967 : 324 - Gomy, 2000 : 61.

Holotype : MNHN.

Distribution : MASCAREIGNES : Maurice, Centre, Curepipe.

• ***Sponsor (Stenianthe) anthracinus* Descarpentries, 1966**

Descarpentries, 1966 : 15.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Maroantsetra, Antakotako, Ambodivoangy ; S.-P. de Mananara Nord, haute Fananehana, Fahitrosy, Seranambe, mont Antampona.

• ***Sponsor (s. str.) antsihanaka* Descarpentries, 1958**

Descarpentries, 1957 (1958a) : 204, fig. 3.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR CENTRE : Pays Antsihanaka.

• ***Sponsor (Stenianthe) ater* Descarpentries, 1966**

Descarpentries, 1966 : 17 ; 1969c : 911.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Maroantsetra, Antakotako, Ambodivoangy, Varingohitra ; S.-P. de Mananara Nord, Seranambe.

• ***Sponsor (s. str.) auribasis* Descarpentries, 1966**

Descarpentries, 1966 : 26, pl. 1, fig. 10.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Mananara Nord, Seranambe, mont Antampona.

• ***Sponsor (s. str.) betsimisaraka* Descarpentries, 1966**

Descarpentries, 1966 : 35.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Maroantsetra, Ambodivoangy, Varingohitra ; S.-P. de Mananara Nord, haute Fananehana, Seranambe.

• ***Sponsor (s. str.) bicolor* Descarpentries, 1966**

Descarpentries, 1966 : 43, pl. 2, fig. 24, pl. 3, fig. 29, 31.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Maroantsetra, Antakotako, Ambodivoangy, Varingohitra, Nosy Mangabe.

• ***Sponsor (s. str.) caeruleus* Guérin-Méneville, 1840**

Guérin-Méneville, 1840 : 358 – Gory, 1841 : 324, pl. 54, fig. 318 – Lacordaire, 1857 : 65 – Gemminger et Harold, 1869 : 1406 – Saunders, 1871 : 76 – Kerremans, 1892a : 162 – Alluaud, 1900b : 195 – Kerremans, 1902 : 38 – Lesne, 1918 : 450, fig. 8 ; 1924 : 46 – Obenberger, 1926a : 47 – Lesne, 1937 : 135, fig. 11 – Vinson, 1960 : 136 ; 1967 : 324 – Gomy, 2000 : 61.

Holotype : MNHN.

Distribution : MASCAREIGNES : Maurice, quartier de Flacq et régions voisines, Le Pouce, mont Corps de Garde.

• ***Sponsor (s. str.) calo* Descarpentries, 1966**

Descarpentries, 1966 : 30.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Mananara Nord, mont Antampona.

• ***Sponsor (Stenianthe) carbonarius* (Théry, 1905)**

Stenianthe carbonarius Théry, 1905 : 16, 35, pl. I, fig. 2 – Lesne, 1924 : 48 – Obenberger, 1926a : 47 – Lesne, 1937 : 132 – Descarpentries, 1969c : 911.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR SUD : haut Manambolo, Androy, Ankobo.

• ***Sponsor (s. str.) cariei* Lesne, 1918**

Lesne, 1918 : 453, fig. 4, pl. 1, fig. 7 ; 1924 : 49 – Obenberger, 1926a : 47 – Lesne, 1932 : 23 ; 1937 : 149 – Vinson, 1960 : 137 ; 1967 : 324 – Gomy, 2000 : 61.

Holotype : MNHN.

Distribution : MASCAREIGNES : Maurice, Ouest, quartier de la Rivière Noire, La Ferme, Bambou.

• ***Sponsor (s. str.) chaldeus* Descarpentries, 1966**

Descarpentries, 1966 : 33.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Mananara Nord, haute Fananehana, Seranambe, mont Antampona.

• **Sponsor (s. str.) *chalybaeus* Descarpentries, 1969**

Descarpentries, 1969b : 913.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Mananara Nord, mont Antampona.

• **Sponsor (s. str.) *cobosi* Bellamy, 1998**

Bellamy, 1998a : 92.

Distribution : MADAGASCAR SUD : Andrahomana.

synonyme / synonym : *pinguis* (Fairmaire, 1902a)

Fairmaire, 1902a : 79 (*Acmaeodera*, nom. praecocc. *Acmaeodera pinguis* Guérin-Méneville, 1840) – Théry, 1905 : 15, 31 – Kerremans, 1907 : 450 – *Neoptosima pinguis* : Lesne, 1918 : 454 – Marie et Lesne, 1918 : 2 – Obenberger, 1926a : 50 – Bellamy, 1998a : 92.

Holotype : MNHN.

synonyme / synonym : *spinosa* (Théry, 1905)

Neoptosima spinosa Théry, 1905 : 16, 37, pl. I, fig. 3 – Kerremans, 1907 : 536 – Obenberger, 1926a : 50 – Théry, 1931b : 590.

Holotype : MNHN.

• **Sponsor (s. str.) *convexus* Gory et Laporte de Castelnau, 1839**

Gory et Laporte de Castelnau, 1839 : 2, pl. 1, fig. 1 – Gory, 1841 : 321 – Lacordaire, 1857 : 65 – Gemminger et Harold, 1869 : 1406 – Saunders, 1871 : 76 – Kerremans, 1892a : 162 – Alluaud, 1900b : 195 – Kerremans, 1902 : 38 – Lesne, 1918 : 454 ; 1924 : 46 – Obenberger, 1926a : 47 – Vinson, 1960 : 137 ; 1967 : 324 – Descarpentries, 1973 : 201 – Gomy, 2000 : 61.

Holotype : MNHN.

Distribution : MASCAREIGNES : Maurice, Est, quartier de Flacq.

• **Sponsor (s. str.) *cupreoviolaceus* Descarpentries, 1966**

Descarpentries, 1966 : 42, pl. 3, fig. 27.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Maroantsetra, Antakotako, Fampanambo, Ambodivoangy ; S.-P. de Mananara Nord, haute Fananehana, Seranambe, mont Antampona.

• **Sponsor (s. str.) *cupreoviridis* Descarpentries, 1966**

Descarpentries, 1966 : 39, pl. 2, fig. 20.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Maroantsetra, Fampanambo ; S.-P. de Mananara Nord, haute Fananehana, Seranambe, mont Antampona.

• ***Sponsor (s. str.) cupripennis* Descarpentries, 1957**

Descarpentries, 1957 : 206, fig. 2, 9, 10 – Vinson, 1960 : 138 ; 1967 : 324 – Gomy, 2000 : 61.

Holotype : MNHN.

Distribution : MASCAREIGNES : Maurice, Le Pouce.

• ***Sponsor (Stenianthe) cyaneus* Descarpentries, 1966**

Descarpentries, 1966 : 19.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Maroantsetra, Antakotako, Ambodivoangy, Varingohitra ; S.-P. de Mananara Nord, Fahitrosy, Ambodivoanio, Seranambe, mont Antampona.

• ***Sponsor (Stenianthe) cyanipennis* Descarpentries, 1966**

Descarpentries, 1966 : 21, pl. 1, fig. 9.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Maroantsetra, Antakotako, Fampanambo, Ambodivoangy, Nosy Mangabe ; S.-P. de Mananara Nord, haute Fananehana, Seranambe, mont Antampona.

• ***Sponsor (s. str.) deplanatus* (Théry, 1905)**

Neoptosima deplanata Théry, 1905 : 16, 36 – Kerremans, 1907 : 537 – *Sponsor deplanatus* (Théry) : Lesne, 1924 : 50 – Obenberger, 1926a : 47.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR NORD : cap d'Ambre.

• ***Sponsor (s. str.) dermestoides* Lesne, 1918**

Lesne, 1918 : 451, fig. 2, 9, pl. 1, fig. 5 ; 1924 : 47 – Obenberger, 1926a : 47 – Lesne, 1932 : 22 ; 1937 : 136 – Vinson, 1960 : 136 ; 1967 : 324 – Gomy, 2000 : 61.

Holotype : MNHN.

Distribution : MASCAREIGNES : Maurice, Ouest, mont Corps de Garde.

• **sous-espèce / subspecies : *borbonicus* Lesne, 1918**

Lesne, 1918 : 443, fig. 1 ; 1924 : 47 – Obenberger, 1926a : 47 – Lesne, 1937 : 136.

Holotype : MNHN.

Distribution : MASCAREIGNES : la Réunion.

• ***Sponsor (s. str.) desjardinsii* Guérin-Méneville, 1840**

Guérin-Méneville, 1840 : 357 – Gory, 1841 : 320, pl. 54, fig. 314 – Lacordaire, 1857 : 65 – Gemminger et Harold, 1869 : 1406 – Saunders, 1871 : 76 – Kerremans, 1892a : 162 – Alluaud, 1900b : 195 – Kerremans, 1902 : 38 – Lesne, 1918 : 454 ; 1924 : 49 – Obenberger, 1926a : 47 – Lesne, 1932 : 23 ; 1937 : 149 – Vinson, 1960 : 139 ; 1967 : 324 – Gomy, 2000 : 61.

Holotype : MNHN.

Distribution : MASCAREIGNES : Maurice, Ouest, quartier de Flacq et régions voisines.

nom indisponible / unavailable name : *ovalis* (Dejean, 1833)

Oomorpha ovalis Dejean, 1833 : 83 (nom. nud.) ; 1836 : 94 (nom. nud.).

synonyme / synonym : *ovalis* Gory, 1841

Gory, 1841 : 322, pl. 54, fig. 316 – Lacordaire, 1857 : 65 – Gemminger et Harold, 1869 : 1406 – Saunders, 1871 : 76 – Kerremans, 1892a : 162 – Alluaud, 1900b : 195 – Kerremans, 1902 : 38 – Lesne, 1918 : 454 (synonyme de / synonym of *desjardinsii*) ; 1924 : 49 – Obenberger, 1926a : 47 – Vinson, 1960 : 139.

Holotype : MNHN.

• **Sponsor (s. str.) *distinctus* Descarpentries, 1969**

Descarpentries, 1969b : 919, fig. 9.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : Belalona (30 km au sud-ouest de Sambava).

• **Sponsor (s. str.) *elegans* Descarpentries, 1966**

Descarpentries, 1966 : 35, pl. 2, fig. 23.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Maroantsetra, Fampanambo, Nosy Mangabe ; S.-P. de Mananara Nord, haute Fananehana, Ambodivoanio, Seranambe, mont Antampona.

• **Sponsor (s. str.) *elongatus* Descarpentries, 1966**

Descarpentries, 1966 : 37, pl. 2, fig. 22 ; 1969c : 919.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Maroantsetra, Antakotako ; S.-P. de Mananara Nord, haute Fananehana, Seranambe, mont Antampona.

• **Sponsor (s. str.) *emmae* Descarpentries, 1958**

Descarpentries, 1958a : 205, fig. 11 ; 1966 : 28 ; 1969b : 913.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Maroantsetra, Ambohitsitondrona, Antongonivitsika, Antakotako, Ambodivoangy, Varingohitra ; S.-P. de Mananara Nord, haute Fananehana, Fahitrosy, Seranambe, mont Antampona.

• **Sponsor (*Stenianthe*) *emmerezi* Lesne, 1918**

Lesne, 1918 : 448, pl. 1, fig. 3 ; 1924 : 45 – Obenberger, 1926a : 48 – Vinson, 1960 : 134 – Gomy, 2000 : 61.

Holotype : MNHN.

Distribution : MASCAREIGNES : Maurice, Ouest, mont Corps de Garde.

• ***Sponsor (s. str.) epicureus* Descarpentries, 1966**

Descarpentries, 1966 : 25, pl. 1, fig. 14 ; 1969b : 913.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Maroantsetra, Antakotako, Fampanambo, Ambodivoangy ; S.-P. de Mananara Nord, Ambodivoanio, Seranambe, mont Antampona.

• ***Sponsor (s. str.) epistomalis* Descarpentries, 1957**

Descarpentries, 1957 : 207, fig. 7, 8.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : Fenerive / Fenoarivo, Atsinanana.

• ***Sponsor (Stenianthe) fulgens* Fairmaire, 1899**

Fairmaire, 1899a : 117 ; 1900 : 243 – Alluaud, 1900b : 195 – Marie et Lesne, 1917 : 110 – Lesne, 1918 : 448, fig. 7 ; 1924 : 46 – Obenberger, 1926a : 48 – Lesne, 1937 : 133, fig. 14, 15, 17, 21, 23, 24 – Vinson, 1960 : 135 – Gomy, 2000 : 62.

Holotype : MNHN.

Distribution : MASCAREIGNES : Maurice, Ouest, mont Corps de Garde, Curepipe, quartier des Plaines Wilhems, Mare aux Vacoas, Le Pouce, mont Calebasses, Les Mares, Route Macabé.

• ***Sponsor (Stenianthe) fusiformis* Lesne, 1923**

Lesne, 1923 : 42 ; 1924 : 45 – Obenberger, 1926a : 48 – Lesne, 1937 : 130.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Sponsor (Stenianthe) gagates* Descarpentries, 1966**

Descarpentries, 1966 : 23.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Maroantsetra, Fampanambo ; S.-P. de Mananara Nord, Fahitrosy, Seranambe, mont Antampona.

• ***Sponsor (Stenianthe) gemmatus* Descarpentries, 1966**

Descarpentries, 1966 : 14 ; 1969c : 909.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Mananara Nord, haute Fananehana, Fahitrosy, Ambodivoanio, Seranambe, mont Antampona.

• ***Sponsor (Stenianthe) grandis* Lesne, 1937**

Lesne, 1937 : 133.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR NORD : Diégo-Suarez / Antsiranana.

• ***Sponsor (s. str.) granulicollis* Descarpentries, 1966**

Descarpentries, 1966 : 44.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Mananara Nord, mont Antampona.

• ***Sponsor (Stenianthe) gyrinoides* Lesne, 1918**

Lesne, 1918 : 447, pl. 1, fig. 2 ; 1924 : 44 – Obenberger, 1926a : 48 – Vinson, 1960 : 134 – Gomy, 2000 : 62.

Holotype : MNHN.

Distribution : MASCAREIGNES : Maurice, Ouest, mont Corps de Garde, Le Pouce.

• ***Sponsor (Stenianthe) ignipennis* Descarpentries, 1966**

Descarpentries, 1966 : 20, pl. 1, fig. 8.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Maroantsetra, Antakotako, Fampanambo, Ambodivoangy ; S.-P. de Mananara Nord, haute Fananehana, Seranambe, mont Antampona.

• ***Sponsor (s. str.) irideus* Kerremans, 1902**

Kerremans, 1902 : 38 – Lesne, 1918 : 457, fig. 5 ; 1924 : 50 – Obenberger, 1926a : 48 – Lesne, 1932 : 24 ; 1937 : 151 – Vinson, 1960 : 140 ; 1967 : 324 – Gomy, 2000 : 62.

Holotype : MNHN.

Distribution : MASCAREIGNES : Maurice, Pointe aux Feuilles, mont Corps de Garde.

• ***Sponsor (Stenianthe) janthinus* (Fairmaire, 1886)**

Stenianthe janthina Fairmaire, 1886 : 38 – *Stenianthe janthinus* Fairmaire, 1886 : Kerremans, 1892a : 293 ; 1903 : 315 – Théry, 1905 : 16, 33 – Marie et Lesne, 1917 : 112 – Lesne, 1924 : 45 – Obenberger, 1926a : 48 – Lesne, 1937 : 128, fig. 1, 9.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR NORD : S.-P. de Diégo-Suarez / Antsiranana, montagne d'Ambre.

• ***Sponsor (s. str.) kerremansi* (Théry, 1905)**

Neoptosima kerremansi Théry, 1905 : 16, 36, 178 – Kerremans, 1907 : 535 – *Sponsor kerremansi* (Théry) : Lesne, 1918 : 441 ; 1924 : 49 – Obenberger, 1926a : 48 – Lesne, 1937 : 147 – Descarpentries, 1966 : 34.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Maroantsetra, Varingohitra (baie d'Antongil) ; S.-P. de Mananara Nord, haute Fananehana, Seranambe, mont Antampona.

• ***Sponsor (s. str.) lepidus* Lesne, 1918**

Lesne, 1918 : 452, fig. 3, pl. 1, fig. 6 ; 1924 : 48 – Obenberger, 1926a : 48 – Vinson, 1960 : 137 ; 1967 : 324 – Gomy, 2000 : 62.

Holotype : MNHN.

Distribution : MASCAREIGNES : Maurice, mont Corps de Garde.

• ***Sponsor (s. str.) livens* Descarpentries, 1966**

Descarpentries, 1966 : 28, pl. 1, fig. 13 ; 1969c : 913.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Maroantsetra, Antakotako, Fampanambo, Ambodivoangy, Varingohitra, Nosy Mangabe ranambe, mont Antampona.

• ***Sponsor (s. str.) malartici* Lesne, 1922**

Lesne, 1922 : 278 ; 1924 : 48 – Obenberger, 1926a : 48 – Lesne, 1932 : 22 ; 1937 : 151 – Vinson, 1960 : 139 ; 1967 : 324 – Gomy, 2000 : 62.

Holotype : MNHN.

Distribution : MASCAREIGNES : Maurice, Pointe aux Feuilles, mont Corps de Garde.

• ***Sponsor (s. str.) mameti* Descarpentries, 1958**

Descarpentries, 1958a : 200, fig. 1 – Vinson, 1960 : 135 ; 1967 : 324 – Gomy, 2000 : 62.

Holotype : MNHN.

Distribution : MASCAREIGNES : Maurice, Le Pouce.

• ***Sponsor (s. str.) mandranus* Lesne, 1924**

Lesne, 1924 : 48 – Obenberger, 1926a : 48 – Lesne, 1937 : 138.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Sponsor (s. str.) melanopus* Descarpentries, 1966**

Descarpentries, 1966 : 29.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Mananara-Nord, haute Fananehana, Fahitrosy, Seranambe, mont Antampona.

• ***Sponsor (s. str.) metallinus* (Fairmaire, 1900)**

Stenianthe metallina Fairmaire, 1900 : 243 – Kerremans, 1903 : 315 – Théry, 1905 : 16, 33 – Marie et Lesne, 1917 : 112 – *Sponsor metallinus* (Fairmaire) : Lesne, 1918 : 440 ; 1924 : 48 – Obenberger, 1926a : 48 – Lesne, 1937 : 144.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR OUEST : environs de Suberbieville [= Maevatanana], région de Maevatanana, cause de Hukaru (nec de l'Ankara), Soalala.

synonyme / synonym : *crassulus* (Fairmaire, 1901)

Stenianthe crassula Fairmaire, 1901 : 166 ; 1902d : 351 – Kerremans, 1903 : 315 – Théry, 1905 : 16, 34 – Marie et Lesne, 1917 : 111 – Lesne, 1918 : 440 – Obenberger, 1926a : 48 (synonyme de / synonym of *metallina*).

Holotype : MNHN.

• ***Sponsor (s. str.) mirabilis* Descarpentries, 1969**

Descarpentries, 1969 : 912.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : Belalona (30 km au sud-ouest de Sambava).

• ***Sponsor (Stenianthe) montanus* Descarpentries, 1969**

Descarpentries, 1969c : 910.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR NORD : S.-P. de Diégo-Suarez / Antsiranana, montagne d'Ambre.

• ***Sponsor (s. str.) monticola* Descarpentries, 1969**

Descarpentries, 1969c : 916, fig. 6.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR NORD : S.-P. de Diégo-Suarez / Antsiranana, montagne d'Ambre.

• ***Sponsor (s. str.) montivagus* Descarpentries, 1969**

Descarpentries, 1969c : 915, fig. 5.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR NORD : S.-P. de Diégo-Suarez / Antsiranana, montagne d'Ambre.

• ***Sponsor (s. str.) niger* Descarpentries, 1969**

Descarpentries, 1969c : 914, fig. 3.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : Belalona (30 km au sud-ouest de Sambava).

• ***Sponsor (Stenianthe) nigricollis* Descarpentries, 1966**

Descarpentries, 1966 : 22, pl. 1, fig. 2, 7.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Maroantsetra, Fampanambo, Ambodivoangy, Varingohitra, Nosy Mangabe ; S.-P. de Mananara Nord, haute Fananehana, Seranambe, mont Antampona.

• ***Sponsor (Stenianthe) nigroaeneus* Descarpentries, 1966**

Descarpentries, 1966 : 23, pl. 1, fig. 3.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Mananara Nord, Seranambe.

• ***Sponsor (s. str.) nigrocyaneus* Descarpentries, 1966**

Descarpentries, 1966 : 29, pl. 1, fig. 5, 12 ; 1969c : 913.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Mananara Nord, Fahitrosy, Seranambe, mont Antampona.

• ***Sponsor (s. str.) oblongus* Kerremans, 1902**

Kerremans, 1902 : 38 – Lesne, 1918 : 450 ; 1924 : 46 – Obenberger, 1926a : 47 – Lesne, 1937 : 135 – Vinson : 1960 : 136 ; 1967 : 324 – Gomy, 2000 : 62.

Holotype : MNHN.

Distribution : MASCAREIGNES : Maurice, mont Corps de Garde.

• ***Sponsor (s. str.) parilis* Lesne, 1937**

Lesne, 1937 : 147, fig. 6.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR NORD : S.-P. de Diégo-Suarez / Antsiranana, montagne d'Ambre

• ***Sponsor (s. str.) parvulus* Guérin-Méneville, 1840**

Guérin-Méneville, 1840 : 358 – Gory, 1841 : 325, pl. 54, fig. 319 – Lacordaire, 1857 : 65 – Gemminger et Harold, 1869 : 1406 – Saunders, 1871 : 76 – Kerremans, 1892a : 162 – Alluaud, 1900b : 195 – Kerremans, 1902 : 38 – Lesne, 1918 : 453 ; 1924 : 49 – Obenberger, 1926a : 48 – Lesne, 1937 : 149 – Vinson, 1960 : 137 ; 1967 : 324 – Gomy, 2000 : 62.

Holotype : MNHN.

Distribution : MASCAREIGNES : Maurice, Flacq, mont Corps de Garde, mont Cocotte, Le Pouce, Chamarel.

• ***Sponsor (s. str.) perrieri* (Fairmaire, 1902)**

Ptosima perrieri Fairmaire, 1902d : 347 – *Neoptosima perrieri* (Fairmaire) : Théry, 1905 : 16, 36 – Kerremans, 1907 : 533 – Marie et Lesne, 1917 : 103 – *Sponsor perrieri* (Fairmaire) : Lesne, 1918 : 441 ; 1924 : 47 – Obenberger, 1926a : 49 – Lesne, 1937 : 136, fig. 4, 22, 25.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR NORD : cap d'Ambre. MADAGASCAR EST : Ampasimena, vallée d'Ambolo. MADAGASCAR OUEST : S.-P. d'Ambato-Boeni, Ankirihitra (nec Ankarahitra).

• ***Sponsor (s. str.) pexipennis* Lesne, 1937**

Lesne, 1937 : 145.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR NORD : S.-P. de Diégo-Suarez / Antsiranana, montagne d'Ambre.

• ***Sponsor (Stenianthe) peyeri* Descarpentries, 1966**

Descarpentries, 1966 : 13.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution: MADAGASCAR EST : S.-P. de Maroantsetra, Antakotako, Ambodivoangy ; S.-P. de Mananara Nord, haute Fananehana, Fahitrosy, Ambodivoanio, Seranambe, mont Antampona.

• **Sponsor (s. str.) pilosellus Kerremans, 1914**

Kerremans, 1914d : 378 – Lesne, 1924 : 55 – Obenberger, 1926a : 49 – Lesne, 1937 : 136, fig. 8.

Holotype : BMNH.

Distribution : ALDABRA.

• **Sponsor (s. str.) pinguis Guérin-Méneville, 1840**

Guérin-Méneville, 1840 : 357 – Gory, 1841 : 321, pl. 54, fig. 314 – Lacordaire, 1857 : 65 – Gemminger et Harold, 1869 : 1406 – Saunders, 1871 : 76 – Kerremans, 1892a : 163 – Alluaud, 1900b : 195 – Kerremans, 1902 : 38 – Lesne, 1918 : 458 ; 1924 : 55 – Obenberger, 1926a : 47 – Vinson, 1960 : 140 ; 1967 : 324 – Gomy, 2000 : 62.

Holotype : MNHN ? D'après / after Vinson : « *apparently lost* ».

Distribution : MASCAREIGNES : Maurice, quartier de Flacq et dans ses environs.

• **Sponsor (s. str.) pseudelongatus Descarpentries, 1966**

Descarpentries, 1966 : 36, pl. 2, fig. 21 ; 1969c : 919.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Maroantsetra, Antakotako, Fampanambo, Ambodivoangy ; S.-P. de Mananara Nord, Seranambe, mont Antampona.

• **Sponsor (s. str.) pseudepistomalis Descarpentries, 1966**

Descarpentries, 1966 : 43, pl. 3, fig. 28, 30 ; 1969c : 922.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Maroantsetra, Ambodivoangy, Varingohitra ; S.-P. de Mananara Nord, Seranambe, mont Antampona.

• **Sponsor (s. str.) pubescens Descarpentries, 1966**

Descarpentries, 1966, pl. 3, fig. 26 ; 1969c : 921.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Maroantsetra, Antakotako ; S.-P. de Mananara Nord, Ambodivoanio, Seranambe, mont Antampona.

• **sous-espèce / subspecies : amethystinus Descarpentries, 1969**

Descarpentries, 1969c : 921.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : Belalona (30 km au Sud-Ouest de Sambava).

• **Sponsor (Stenianthe) pulcher Lesne, 1937**

Lesne, 1937 : 132 – Vinson, 1960 : 135 ; 1967 : 324 – Gomy, 2000 : 62.

Holotype : MNHN.

Distribution : MASCAREIGNES : Maurice, Forest Side.

• ***Sponsor (Stenianthe) pupa* Lesne, 1924**

Lesne, 1924 : 45 – Obenberger, 1926a : 49 – Lesne, 1937 : 130.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Sponsor (Stenianthe) purpureipennis* Descarpentries, 1966**

Descarpentries, 1966 : 18, pl. 1, fig. 4.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Maroantsetra, Antakotako, Fampambo, Ambodivoangy, Varingohitra ; S.-P. de Mananara Nord, haute Fananehana, Ambodivoanio, Seranambe, mont Antampona.

• **sous-espèce / subspecies : *fuscus* Descarpentries, 1969**

Descarpentries, 1969c : 911.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : Belalona (30 km au sud-ouest de Sambava).

• **sous-espèce / subspecies : *episcopalis* Descarpentries, 1969**

Descarpentries, 1969c : 912.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : Vondrozo.

• ***Sponsor (Stenianthe) pygmaeus* Lesne, 1922**

Lesne, 1922 : 277 ; 1924 : 45 – Obenberger, 1926a : 49 – Lesne, 1932 : 21 ; 1937 : 128 – Vinson, 1960 : 134 ; 1967 : 324 – Gomy, 2000 : 62.

Holotype : MNHN.

Distribution : MASCAREIGNES : Maurice.

• ***Sponsor (s. str.) reunionensis* Descarpentries, 1958**

Descarpentries, 1958a : 201, fig. 4.

Holotype : MNHN.

Distribution : MASCAREIGNES : la Réunion, plaine des Cafres, forêt de Bélouve.

• ***Sponsor (s. str.) rodriganus* Lesne, 1918**

Lesne, 1918 : 456 ; 1924 : 50 – Obenberger, 1926a : 49 – Vinson, 1960 : 138 ; 1967 : 324 – Gomy, 2000 : 62.

Holotype : BMNH.

Distribution : MASCAREIGNES : Rodrigues, plaine Corail (Petite Butte).

• ***Sponsor (Stenianthe) rufipes* Descarpentries, 1966**

Descarpentries, 1966 : 16.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Maroantsetra, Fampanambo, Ambodivoangy ; S.-P. de Mananara Nord, Seranambe.

• ***Sponsor (Stenianthe) rufitarsis* Lesne, 1918**

Lesne, 1918 : 446, pl. 1, fig. 1 ; 1924 : 44 - Obenberger, 1926a : 49 - Vinson, 1960 : 134 ; 1967 : 324 - Gomy, 2000 : 62.

Holotype : MNHN.

Distribution : MASCAREIGNES : Maurice, Ouest, mont Corps de Garde.

• ***Sponsor (s. str.) rutilans* Descarpentries, 1966**

Descarpentries, 1966 : 39 ; 1969c : 920.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Maroantsetra, Antakotako ; S.-P. de Mananara Nord, haute Fananehana, Ambodivoanio, Seranambe, mont Antampona.

• **sous-espèce / subspecies : *viridicollis* Descarpentries, 1969**

Descarpentries, 1969c : 920.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : Belalona (30 km au sud-ouest de Sambava).

• ***Sponsor (Stenianthe) satanas* Descarpentries, 1966**

Descarpentries, 1966 : 20, pl. 1, fig. 6.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Mananara Nord, haute Fananehana, Seranambe, mont Antampona.

• ***Sponsor (s. str.) semistrigosus* (Fairmaire, 1902)**

Pseudianthe semistrigosa Fairmaire, 1902b : 81 - Kerremans, 1903 : 316 - Théry, 1905 : 28, 173 - Marie et Lesne, 1917 : 101 - *Sponsor semistrigosus* (Fairmaire) : Lesne, 1924 : 48 - Obenberger, 1926a : 49 - Lesne, 1937 : 136, fig. 7.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR SUD : Andrahomana.

• ***Sponsor (s. str.) senescens* Descarpentries, 1969**

Descarpentries, 1969c : 914, fig. 4.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : Belalona (30 km au sud-ouest de de Sambava).

• ***Sponsor (s. str.) senilis* Descarpentries, 1966**

Descarpentries, 1966 : 32, pl. 2, fig. 17 ; 1969c : 914.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Mananara Nord, Fahitrosy, Seranambe, mont Antampona.

• ***Sponsor (s. str.) sericeus* (Kerremans, 1894)**

Ptosima sericea Kerremans, 1894 : 349 ; 1900a : 310 – Alluud, 1900b : 195 – Kerremans, 1902 : 38 – *Neoptosima sericeus* (Kerremans) : Théry, 1905 : 16, 36 – Kerremans, 1907 : 536 – *Sponsor sericeus* (Kerremans) : Lesne, 1918 : 441 ; 1924 : 48 – Obenberger, 1926a : 49 – Lesne, 1937 : 140 – Descarpentries, 1969c : 919.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR NORD : Diégo-Suarez / Antsiranana.

• ***Sponsor (s. str.) setosulus* Lesne, 1937**

Lesne, 1937 : 148 – Descarpentries, 1966 : 34, pl. 2, fig. 18.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Maroantsetra, baie d'Antongil, Antakotako, Fampanambo, Ambodivoangy, Varingohitra ; S.-P. de Mananara Nord, haute Fananehana, Seranambe, mont Antampona.

• ***Sponsor (s. str.) seyrigi* Descarpentries, 1958**

Descarpentries, 1957 (1958a) : 202, fig. 6.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR CENTRE : Ampandrandava.

• ***Sponsor (Stenianthe) similis* Descarpentries, 1966**

Descarpentries, 1966 : 16.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Mananara Nord, haute Fananehana, Fahitrosy, Ambodivoanio, Seranambe, mont Antampona.

• ***Sponsor (s. str.) splendens* Guérin-Méneville, 1840**

Guérin-Méneville, 1840 : 357 – Gory, 1841 : 319, pl. 53, fig. 313 – Lacordaire, 1857 : 65 – Gemminger et Harold, 1869 : 1406 – Saunders, 1871 : 76 – Kerremans, 1892a : 163 – Alluud, 1900b : 196 – Kerremans, 1902 : 38 – Lesne, 1918 : 458, fig. 6 ; 1924 : 51 – Obenberger, 1926a : 49 – Lesne, 1932 : 24 ; 1937 : 152, fig. 10 – Vinson, 1960 : 140 ; 1967 : 324 – Gomy, 2000 : 62.

Holotype : MNHN.

Distribution : MASCAREIGNES : Maurice, quartier de Flacq et régions voisines, quartier de Moka, Chute Nouvelle, mont Corps de Garde, piton du Milieu.

• ***Sponsor (s. str.) subparallelus* Lesne, 1918**

Lesne, 1918 : 442, 449, pl. 1, fig. 4 ; 1924 : 46 – Obenberger, 1926a : 49 – Lesne, 1932 : 22 ; 1937 : 135, fig. 3 – Vinson, 1960 : 135 ; 1967 : 324 – Gomy, 2000 : 62.

Holotype : MNHN.

Distribution : MASCAREIGNES: Maurice, Ouest, mont Corps de Garde.

• ***Sponsor (s. str.) succinicola* Descarpentries, 1969**

Descarpentries, 1969c : 918, fig. 8.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR NORD : S.-P. de Diégo-Suarez / Antsiranana, montagne d'Ambre.

• ***Sponsor (s. str.) theryi* Lesne, 1937**

Lesne, 1937 : 138.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Sponsor (s. str.) tristis* Descarpentries, 1966**

Descarpentries, 1966 : 31.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Mananara Nord, mont Antampona.

• ***Sponsor (Stenianthe) vadoni* Lesne, 1937**

Lesne, 1937 : 131 – Descarpentries, 1966 : 16 ; 1969c : 910.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Maroantsetra, baie d'Antongil, Antakotako, Ambodivoangy, Varingohitra ; S.-P. de Mananara Nord, Seranambe, mont Antampona.

• ***Sponsor (Stenianthe) vadonius* Descarpentries, 1958**

Descarpentries, 1957 (1958a) : 199, fig. 5 ; 1966 : 22.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Maroantsetra, Antakotako, Ambodivoangy ; S.-P. de Mananara Nord, Fahitrosy, Seranambe.

• ***Sponsor (s. str.) vetustus* Descarpentries, 1966**

Descarpentries, 1966 : 32, pl. 2, fig. 16 ; 1969c : 916.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Mananara Nord, Seranambe, mont Antampona.

• ***Sponsor (Stenianthe) viduus* Descarpentries, 1969**

Descarpentries, 1969c : 911, fig. 2.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR NORD : S.-P. de Diégo-Suarez / Antsiranana, montagne d'Ambre.

• ***Sponsor (s. str.) viettei* Descarpentries, 1966**

Descarpentries, 1966 : 38, pl. 2, fig. 19.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Mananara Nord, mont Antampona.

• **Sponsor (*Stenianthe*) *viei* Descarpentries, 1966**

Descarpentries, 1966 : 18, pl. 1, fig. 1.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Mananara Nord, Seranambe, mont Antampona.

• **Sponsor (*s. str.*) *villosus* Lesne, 1922**

Lesne, 1922 : 278 ; 1924 : 49 – Obenberger, 1926a : 49 – Lesne, 1932 : 23 ; 1937 : 152 – Vinson, 1960 : 140 ; 1967 : 324 – Gomy, 2000 : 62.

Holotype : MNHN.

Distribution : MASCAREIGNES : Maurice.

• **Sponsor (*s. str.*) *vinsoni* Lesne, 1937**

Lesne, 1937 : 150 – Vinson, 1960 : 138 ; 1967 : 324 – Gomy, 2000 : 62.

Holotype : MNHN.

Distribution : MASCAREIGNES : Maurice, mont Corps de Garde.

• **Sponsor (*s. str.*) *violaceipennis* Descarpentries, 1969**

Descarpentries, 1969c : 920, fig. 10.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : Vondrozo.

• **Sponsor (*Stenianthe*) *violaceus* (Fairmaire, 1903)**

Stenianthe violacea Fairmaire, 1903c : 363 – Théry, 1905 : 16, 34 – Marie et Lesne, 1917 : 112 – Lesne, 1918 : 440 – *Sponsor violaceus* (Fairmaire) : Lesne, 1924 : 45 – Obenberger, 1926a : 49 – Lesne, 1937 : 132.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• **Sponsor (*s. str.*) *viridiauratus* Descarpentries, 1966**

Descarpentries, 1966 : 24, pl. 1, fig. 11.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Mananara Nord, haute Fananehana, Seranambe, mont Antampona.

• **Sponsor (*s. str.*) *viridiaenus* Descarpentries, 1969**

Descarpentries, 1969c : 921, fig. 11.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : Belalona (30 km au Sud-Ouest de Sambava).

• **Sponsor (*s. str.*) *viridicoerulans* Descarpentries, 1966**

Descarpentries, 1966 : 27 ; 1969c : 913.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Maroantsetra, Antakotako ; S.-P. de Mananara Nord, haute Fananehana, Seranambe.

Tribu / Tribe **Polycestini** Lacordaire, 1857

Polycestites Lacordaire, 1857 : 61.

Polycestini Kerremans, 1893a : 112 ; 1902 : 16 ; 1905 : 373 – Obenberger, 1926a : 35 – Bellamy, 2003b : 20.

Genre / Genus *Paracastalia* Kerremans, 1902

Paracastalia Kerremans, 1902 : 22 ; 1905 : 407 [Espèce type du genre / Genus type species : *Polycesta plagiata* Kerremans, 1899 (dénomination ultérieure / subsequent designation : Cobos, 1981b : 28)] Obenberger, 1926a : 38 – Cobos, 1955 : 4 ; 1980 : 88 (clé / key) ; 1981b : 26 – Bellamy, 1985 : 411 ; 2003b : 22.

• ***Paracastalia gebhardti* (Hoschek, 1931)**

Neopolycesta gebhardti Hoschek, 1931a : 133, fig. 1.

Holotype : NHMB.

Distribution : MADAGASCAR.

Genre / Genus *Parapolycesta* Cobos, 1981

Parapolycesta Cobos, 1981b : 38 ; 1980 : 90 [Espèce type du genre / Genus type species : *Pseudocastalia cobosi* Descarpentries, 1975 (dénomination originale / original designation)] Bellamy, 1985 : 412 ; 2003b : 23.

• ***Parapolycesta cobosi* (Descarpentries, 1975)**

Pseudocastalia cobosi Descarpentries, 1975b : 270 – *Parapolycesta cobosi* (Descarpentries) : Cobos, 1981b : 39.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR SUD : S.-P. d'Amboasary, Behara.

Genre / Genus *Madecastalia* Descarpentries, 1976

Madecastalia Descarpentries, 1976 : 268 [Espèce type du genre / Genus type species : *Madecastalia albignaci* Descarpentries, 1975 (dénomination originale / original designation)] Cobos, 1980 : 89 (clé / key) ; 1981b : 54 – Bellamy, 1985 : 412 ; 2003b : 22.

• ***Madecastalia albignaci* Descarpentries, 1975**

Descarpentries, 1975b : 269, fig. 2 – Cobos, 1981b : 55.

Holotype ♀ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR OUEST : forêt d'Analabe, près de Morondava.

Genre / Genus *Pseudopolycesta* Cobos, 1981

Pseudopolycesta Cobos, 1981b : 57 ; 1980 : 91 (clé / key) [Espèce type du genre / Genus type species : *Polycesta tigrina* Gory et Laporte de Castelnau, 1838 (dénomination originale / original designation)] – Bellamy, 1985 : 412 ; 2003b : 24.

• ***Pseudopolycesta tigrina* (Gory et Laporte de Castelnau, 1838)**

Polycesta tigrina Gory et Laporte de Castelnau, 1838 : 6, pl. 1, fig. 7 – Chevrolat, 1838a : 56 – Lacordaire, 1857 : 62 – Gemminger et Harold, 1869 : 1405 – Saunders, 1871 : 59 – Kerremans, 1892a : 161 – Alluaud, 1900b : 195 – Kerremans, 1902 : 26 – *Neopolycesta tigrina* (Gory et Laporte de Castelnau) : Kerremans, 1906a : 466 – *Polycesta tigrina* (Gory et Laporte de Castelnau) : Théry, 1905 : 29 – Obenberger, 1926a : 41 – *Pseudopolycesta tigrina* (Gory et Laporte de Castelnau) : Cobos, 1981b : 59 – Bellamy, 1999 : 5.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

synonyme / synonym : *goryi* (Thomson, 1878)

Polycesta goryi Thomson, 1878b : 45 – Kerremans, 1892a : 161 – Alluaud, 1900b : 194 – Kerremans, 1902 : 26 – Théry, 1905 : 15, 29 – Kerremans, 1906a : 467 – Obenberger, 1926a : 41 – Cobos, 1981b : 59.

Holotype : MNHN.

Genre / Genus *Aldabrica* Cobos, 1981

Aldabrica Cobos, 1981b : 74 ; 1980 : 92 (clé / key) [Espèce type du genre / Genus type species : *Pseudocastalia fryeri* Kerremans, 1914 (dénomination originale / original designation)] Bellamy, 1985b : 412 ; 2003b : 21.

• ***Aldabrica fryeri* (Kerremans, 1914)**

Pseudocastalia fryeri Kerremans, 1914d d : 377 – Obenberger, 1926a : 41 – *Aldabrica fryeri* (Kerremans) : Cobos, 1981b : 75 – Holm, 1982 : 27.

Holotype : BMNH.

Distribution : ALDABRA.

Genre / Genus *Micropolycesta* Cobos, 1981

Micropolycesta Cobos, 1981b : 76 [Espèce type du genre / Genus type species : *Neopolycesta sirgueyi* Théry, 1926 (dénomination originale / original designation)] ; 1980 : 92 (clé / key) – Bellamy, 1985 : 412 ; 2003b : 22.

• ***Micropolycesta sirgueyi* (Théry, 1926)**

Neopolycesta sirgueyi Théry, 1926 : 123, fig. 1 – *Micropolycesta sirgueyi* (Théry) : Cobos, 1981b : 77.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR CENTRE : Tananarive / Antananarivo.

Genre / Genus *Castaliella* Cobos, 1981

Castaliella Cobos, 1981b : 81 [Espèce type du genre / Genus type species : *Polycesta laesicollis* Fairmaire, 1902 (dénomination originale / original designation)] – Cobos, 1980 : 92 (clé / key) – Holm, 1982 : 17 – Bellamy, 1985 : 412 ; 2003b : 22.

• ***Castaliella laesicollis* (Fairmaire, 1902)**

Polycesta laesicollis Fairmaire, 1902a : 79 – *Pseudocastalia laesicollis* (Fairmaire) : Théry, 1905 : 15, 29 – Kerremans, 1907 : 611 – Marie et Lesne, 1917 : 98 – Obenberger, 1926a : 41 – *Castaliella laesicollis* (Fairmaire) : Cobos, 1981b : 82 – Holm, 1982 : 17 ; 1985 : 139.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR SUD : bassin du Mandrare, Ampasimpolaka. Angola. Botswana. Afrique du Sud. Zimbabwe.

synonyme / synonym : *peringueyi* (Kerremans, 1906)

Pseudocastalia peringueyi Kerremans, 1906a : 452 ; 1911a : 85 – Obenberger, 1926a : 41 (synonyme de / synonym of *laesicollis*) – Cobos, 1981b : 82 – Holm, 1982 : 17.

Holotype : MNHN.

Genre / Genus *Polycestaxia* Cobos, 1981

Polycestaxia Cobos, 1981b : 83 ; 1980 : 91 (clé / key) [Espèce type du genre / Genus type species : *Polycesta howas* Kerremans, 1894 (dénomination originale / original designation)] – Bellamy, 1985 : 412 ; 2003b : 23.

• ***Polycestaxia howas* (Kerremans, 1894)**

Polycesta howas Kerremans, 1894 : 348 – Alluaud, 1900b : 194 – *Neopolycesta howas* (Kerremans) : Kerremans, 1902 : 26 ; 1906 : 468 – *Polycesta howa* Kerremans : Théry, 1905 : 15, 29 – Obenberger, 1926a : 41 – *Polycestaxia howas* (Kerremans) : Cobos, 1981b : 84.

Holotype : BMNH.

Distribution : MADAGASCAR NORD : Diégo-Suarez / Antsiranana.

Genre / Genus *Madecacesta* Descarpentries, 1976

Madecacesta Descarpentries, 1976 : 266 [Espèce type du genre / Genus type species : *Madecacesta gaudroni* Descarpentries, 1976 (dénomination originale / original designation)] – Cobos, 1980 : 88 (clé / key) ; 1981b : 85 – Bellamy, 1985 : 411 – Cobos, 1986 : 12, 24.

• ***Madecacesta gaudroni* Descarpentries, 1976**

Descarpentries, 1976 : 266, fig. 1 – Cobos, 1981b : 86.

Holotype ♀ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : Vondrozo.

SOUS-FAMILLE / SUBFAMILY **GALBELLINAE** REITTER, 1911

Galbellinae Reitter, 1911 : 178 – Bellamy, 1985 : 428 – Cobos, 1986 : 71 – Bellamy, 1995 : 7 – Volkovitsh et Bílý, 2001 : 135 ; 2003b : 22.

Genre / Genus *Galbella* Westwood, 1848

Galbella Westwood, 1848 : 83 [Espèce type du genre / Genus type species : *Galbella violacea* Westwood 1848 (monotypie / monotypy)] – Gemminger et Harold, 1869 : 1454 – Saunders, 1871 : 133 – Kerremans, 1892a : 293 ; 1893a : 121 ; 1903 : 316 – Théry, 1905 : 27, 166 – Obenberger, 1918a : 68 – Théry, 1927c : 45 – Obenberger, 1928b : 342 – Théry, 1930d : 21 – Obenberger, 1937a : 1444 – Cobos, 1979a : 414 – Bellamy, 1985 : 428 – Bellamy et Holm, 1986 : 3 – Cobos, 1986 : 4, 11, 20, 69 – Holyński, 1993a : 15, 32 – Bellamy, 2000b : 109 ; 2003b : 27.

Janthe de Marseul, 1866 : 520 [Espèce type du genre / Genus type species : *Janthe felix* de Marseul 1866 (monotypie / monotypy)] – Gemminger et Harold, 1869 : 1448 – Saunders, 1871 : 133 – Kerremans, 1893a : 121 ; 1903 : 316 – Jakobson, 1912 : 800 – Obenberger, 1918a : 68 ; 1924b : 17 ; 1936b : 58 ; 1937a : 1444 – Théry, 1947c : 79 – Bellamy, 1985 : 428 – Bellamy et Holm, 1986 : 3 – Bellamy, 2003b : 27.

Oncomaea Saunders, 1866 : 321 [Espèce type du genre / Genus type species : *Oncomaea coerulea* Saunders, 1866 (monotypie / monotypy)] – Gemminger et Harold, 1869 : 1454 – Saunders, 1871 : 133 – Kerremans, 1903 : 316 – Obenberger, 1937a : 1444 – Théry, 1947c : 79 – Bellamy, 1985 : 428 – Bellamy et Holm, 1986 : 3 – Bellamy, 2003b : 27.

Sponsorinus Fairmaire, 1900 : 241 [Espèce type du genre / Genus type species : *Sponsorinus lata* Fairmaire, 1900 (monotypie / monotypy)] – Kerremans, 1903 : 316 – Théry, 1905 : 167 – Marie et Lesne, 1917 : 111 – Obenberger, 1928b : 342 ; 1937a : 1444 – Bellamy, 1985 : 428 – Bellamy et Holm, 1986 : 3 – Bellamy, 2003b : 27.

• ***Galbella antiqua* Théry, 1905**

Théry, 1905 : 28, 171, pl. VII, fig. 54 ; 1930d : 31 – *Janthe antiqua* (Théry) : Obenberger, 1937a : 1444.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR SUD : région de l'Androy.

• ***Galbella byrrhoides* Théry, 1905**

Théry, 1905 : 27, 170, pl. VII, fig. 52 ; 1930d : 31 – *Janthe byrrhoides* (Théry) : Obenberger, 1937a : 1445.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR OUEST : Boeni, basse Betsiboka.

• ***Galbella hovana* (Fairmaire, 1902)**

Pachyschelus hovanus Fairmaire, 1902b : 351 – Kerremans, 1903 : 320 – Théry, 1905 : 28, 174 – Marie et Lesne, 1917 : 89 – *Galbella hovana* (Fairmaire) : Théry, 1927 : 260 ; 1930d : 31 ; 1936a : 343 – *Janthe hovana* (Fairmaire) : Obenberger, 1937a : 1446.

Holotype : BMNH.

Distribution : MADAGASCAR NORD : Diégo-Suarez / Antsiranana.

• ***Galbella howas* Kerremans, 1894**

Kerremans, 1894 : 354 – Alluaud, 1900b : 200 – *Janthe hova* Kerremans, 1903 : 317 (*lapsus calami*) – *Galbella howas* (Kerremans) : Théry, 1905 : 28, 172 – *Galbella hova* (Kerremans) : Théry, 1930d : 31 (*lapsus calami*) – *Janthe howas* (Kerremans) : Obenberger, 1937a : 1446.

Holotype : BMNH.

Distribution : MADAGASCAR NORD : Diégo-Suarez / Antsiranana.

• ***Galbella lata* (Fairmaire, 1900)**

Sponsorinus lata Fairmaire, 1900 : 242 – Kerremans, 1903 : 316 – *Galbella lata* (Fairmaire) : Théry, 1905 : 28, 172 – Marie et Lesne, 1917 : 111 – Obenberger, 1928b : 342 – Théry, 1930d : 31 – *Janthe lata* (Fairmaire) : Obenberger, 1937a : 1447.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR OUEST : environs de Suberbieville [= Maevatanana], région de l'Androy.

synonyme / synonym : *pretiosa* Théry, 1905

Théry, 1905 : 27, 169, pl. VII, fig. 50, 51 – Obenberger, 1928b : 342 – Théry, 1930d : 31 – *Janthe pretiosa* (Théry) : Obenberger, 1937a : 1447.

Holotype : MNHN.

• ***Galbella limbata* Théry, 1905**

Théry, 1905 : 27, 170, pl. VII, fig. 53 ; 1930d : 31 – *Janthe limbata* (Théry) : Obenberger, 1937a : 1447.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR SUD : région de l'Androy.

• ***Galbella perrieri* (Fairmaire, 1900)**

Sponsorinus perrieri Fairmaire, 1900 : 242 – Kerremans, 1903 : 316 – *Galbella perrieri* (Fairmaire) : Théry, 1905 : 27, 168 – Marie et Lesne, 1917 : 111 – Obenberger, 1928b : 342 – Théry, 1930d : 31 – *Janthe perrieri* (Fairmaire) : Obenberger, 1937a : 1447.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR OUEST : environs de Suberbieville [= Maevatanana] – Boeni Maevatanana.

synonyme / synonym : *chrysonotata* Théry, 1905

Théry, 1905 : 27, 168, pl. VII, fig. 49 – Obenberger, 1928b : 342 – Théry, 1930d : 31 – *Janthe chrysonotata* (Théry) : Obenberger, 1937a : 1447.

Holotype : MNHN.

• ***Galbella trachydea* (Fairmaire, 1902)**

Stenianthe trachydea Fairmaire, 1902b : 81 – Théry, 1905 : 16, 34 – Marie et Lesne, 1917 : 112 – Obenberger, 1928b : 342 – *Galbella trachydea* (Fairmaire) : Théry, 1930d : 23, 31 ; 1931b : 590 – *Janthe trachydea* (Fairmaire) : Obenberger, 1937a : 1448.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR SUD : sud du Pays Androy.

synonyme / synonym : *insularis* Théry, 1905

Théry, 1905 : 27, 167, pl. VII, fig. 48 – Obenberger, 1928b : 342 – Théry, 1930d : 23, 31 ; 1931b : 590 – *Janthe insularis* (Théry) : Obenberger, 1937a : 1448 (synonyme de / synonym of *trachydea*).

Holotype : MNHN.

synonyme / synonym : *amethystina* Théry, 1905

Galbella insularis var. *amethystina* Théry, 1905 : 27, 168 – *Janthe insularis* var. *amethystina* (Théry) : Obenberger, 1937a : 1448.

Holotype : MNHN.

SOUS-FAMILLE / SUBFAMILY **CHRYSOCHROINAE** LAPORTE DE CASTELNAU, 1835

Chrysochroites Laporte de Castelnau, 1835 : 158 – Bellamy, 2003b : 28.

Chalcophorides Lacordaire, 1857 : 14.

Tribu / Tribe **Vadonaxiini** Descarpentries, 1970

Vadonaxiini Descarpentries, 1970 : 188 – Bellamy, 2003b : 28.

Genre / Genus *Vadonaxia* Descarpentries, 1970

(Pl. 2, fig. 1)

Vadonaxia Descarpentries, 1970 : 189 [Espèce type / Type species : *Vadonaxia peyrierasi* Descarpentries (dénomination originale / original designation)] – Bellamy, 1985 : 413 ; 2003b : 28.

• ***Vadonaxia peyrierasi* Descarpentries, 1969**

Descarpentries, 1969b : 191, fig. 1-5.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Mananara Nord, Seranambe-Antanambe.

Tribu / Tribe **Chalcophorini** Lacordaire, 1857

« Chalcophorides vrais » (Groupe / Group II) Lacordaire, 1857 : 20 – Bellamy, 2003b : 32.

Chalcophorini Kerremans, 1893a : 102 ; 1903 : 56 – Bellamy, 2003b : 32.

Chalcophorina: Holyński, 1993a: 13, 22 – Bellamy, 2003b : 32.

Chrysodemides Deyrolle, 1864 : 11 – Bellamy, 2003b : 32.

Iridotaenini (*sic*) Tôyama, 1987 : 5 – Bellamy, 2003b : 32.

Lampropeplina Holyński, 1993a: 13, 22 – Bellamy, 1997 : 219 – Holyński, 1997 : 184 – Bellamy, 2003b : 32.

Genre / Genus *Iridotaenia* Deyrolle, 1864

Iridotaenia Deyrolle 1864 : 25 [Espèce type / Type species : *Chrysodema sumptuosa* Laporte de Castelnau et Gory (dénomination ultérieure / subsequent designation : Kurosawa, 1982 : 188)] – Gemminger et Harold, 1869 : 1356 (synonyme de / synonym of *Chalcophora*) – Saunders, 1871 : 14 – Kerremans, 1892a : 41 ; 1893a : 105 ; 1903 : 72 – Jakobson 1912 : 780 – Obenberger, 1926a : 125 – Bellamy, 1985 : 415 – Tôyama 1987 : 5 – Holyński, 1993a : 13, 20 ; 2001 : 3 – Bellamy, 2003b : 34.

Sous-genre / Subgenus *Euridotaenia* Holyński, 2001

Iridotaenia (*Euridotaenia*) Holyński, 2001 : 11 [Espèce type / Type species : *Buprestis cyaniceps* Fabricius (dénomination originale / original designation)] – Bellamy, 2003b : 34.

• ***Iridotaenia* (*Euridotaenia*) *mahena* Fairmaire, 1891**

Fairmaire, 1891 : xlv – Kerremans, 1892a : 42 – Alluaud, 1900b : 178 – Kerremans, 1903a : 73 ; 1914a : 377 – Marie et Lesne, 1917 : 63 – Obenberger, 1926a : 126.

Holotype : MNHN.

Distribution : SEYCHELLES.

Genre / Genus *Madecassia* Kerremans, 1903

Madecassia Kerremans, 1903 : 82 [Espèce type / Type species : *Chalcophoropsis rothschildi* Gahan 1893 (monotypie / monotypy)] – Fairmaire, 1904 : 231 – Théry, 1905 :

16, 38, 176 – Kerremans, 1909b : 96 – Marie et Lesne, 1917 : 72 – Obenberger, 1926a : 147 ; 1958 : 491 – Bellamy, 1985 : 415 ; 2003b : 36.

Lampropepla Fairmaire, 1904 : 231 [Espèce type / Type species : *Lampropepla ophthalmica* Fairmaire, 1894 (monotypie / monotypy)] – Théry, 1905 : 28, 175 – Kerremans, 1909b : 96 – Marie et Lesne, 1917 : 65 – Obenberger, 1926a : 147 ; 1958 : 491 – Levey, 1978 : 154 – Bellamy, 1985 : 415 – Holyński, 1993a : 13, 22 ; 1997 : 186 – Bellamy, 2003b : 36.

• ***Madecassia fairmairei* (Obenberger, 1958)**

Lampropepla fairmairei Obenberger, 1958 : 492.

Holotype : NMPC-20660.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Madecassia ophthalmica* (Fairmaire, 1904)**

Lampropepla ophthalmica Fairmaire, 1904 : 231 – Théry, 1905 : 28, 176 – Kerremans, 1909b : 99 – Marie et Lesne, 1917 : 65 – Obenberger, 1926a : 147 ; 1958 : 493.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR SUD : région de l'Androy, Behara ; S.-P. de Betioky Sud.

• ***Madecassia rothschildi* (Gahan, 1893) (Pl. 3, fig. 23-24)**

Chalcophoropsis rothschildi Gahan 1893 : 224 – Alluaud, 1900b : 179 – *Madecassia rothschildi* (Gahan) : Kerremans, 1903 : 82, pl. 1, fig. 10 – *Lampropepla rothschildi* (Gahan) : Fairmaire, 1904 : 231 – Théry, 1905 : 16, 176 – Kerremans, 1909b : 98 – Obenberger, 1926a : 147 ; 1958 : 493 – Griveaud, 1981 : pl. 25, fig. 53.

Holotype : BMNH.

Distribution : MADAGASCAR SUD : nord de Tuléar / Toliara, Ifaty ; nord de la région de l'Androy, Imanombo ; S.-P. de Betioky Sud.

Genre / Genus *Chalcophoropsis* Saunders, 1871

Chalcophoropsis Saunders, 1871 : 12 [Espèce type / Type species : *Buprestis ta* Laporte de Castelnau et Gory (dénomination ultérieure / subsequent designation : Bellamy, 1997 : 219)] – Thomson, 1878b : 18 – Kerremans, 1892a : 34 ; 1893a : 105 ; 1903 : 54 – Théry, 1905 : 16, 38 – Kerremans, 1908a : 208 – Obenberger, 1926a : 114 – Théry, 1943 : 149 – Levey, 1978 : 154 – Bellamy, 1985 : 415 – Holyński, 1993a : 13, 22 – Bellamy, 1997 : 219 – Gianasso, 1999 : 321 – Bellamy, 2003b : 36.

Chalcophoropsis Deyrolle (*in litt.*) – Saunders, 1871 : 12 – Thomson, 1878b : 18 – Kerremans, 1908a : 208.

• ***Chalcophoropsis monochroma* Gianasso, 1999**

Gianasso, 1999 : 322.

Holotype : MRSN.

Distribution : COMORES : Mayotte.

• ***Chalcophoropsis quadriveolata* (Laporte de Castelnau et Gory, 1836)** (Pl. 3, fig. 25-26)

Buprestis (Chalcophora) quadriveolata Laporte de Castelnau et Gory, 1836 : 8, pl. 2, fig. 4 (*quadriveolata sic*) – *Chrysochroa quadriveolata* (Laporte de Castelnau et Gory) : Gemminger et Harold, 1869 : 1355 – *Chalcophoropsis quadriveolata* (Laporte de Castelnau et Gory) : Saunders, 1871 : 12 – Thomson, 1878b : 18 – Künckel d'Herculais, 1890 : pl. 38, fig. 1 – Kerremans, 1892a : 34 ; 1894 : 339 – Alluaud, 1900b : 179 – Kerremans, 1903 : 54 – Théry, 1905 : 16, 38 – Kerremans, 1908a : 211 – Obenberger, 1926a : 114.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : Pays Antsianaka.

nom indisponible / unavailable name : *quadriveolata* (Dejean, 1833)

Polybothris quadriveolata Dejean, 1833 : 78 (*nom. nud.*).

nom indisponible / unavailable name : *foveipennis* (Dupont, 1836)

Chalcophora foveipennis Dupont, in Dejean, 1836 : 87 (*nom. nud.*) – Gemminger et Harold, 1869 : 1355 – Kerremans, 1892a : 34 – Théry, 1905 : 16, 38 – Kerremans, 1908a : 210.

nom indisponible / unavailable name : *quadriveata* (Lacordaire, 1857)

Chalcophora quadriveata Lacordaire, 1857 : 21 (*nom. nud.*).

synonyme / synonym : *primaria* (Chevrolat, 1838)

Chalcophora primaria Chevrolat, 1838a : 57 – Lacordaire, 1857 : 23 – *Chrysochroa primaria* (Chevrolat) : Gemminger et Harold, 1869 : 1355 – *Chalcophoropsis primaria* (Chevrolat) : Saunders, 1871 : 12 – Thomson, 1878b : 18 – Kerremans, 1892a : 34 – Alluaud, 1900b : 179 – Kerremans, 1903 : 54 – Théry, 1905 : 16, 38 – Kerremans, 1908a : 211 – Obenberger, 1926a : 114.

Holotype : BMNH.

synonyme / synonym : *bilis* (Gory, 1841)


Chrysochroa bilis Gory, 1841 : 59, pl. 11, fig. 59 – Gemminger et Harold, 1869 : 1355 – *Chalcophoropsis bilis* (Gory) : Saunders, 1871 : 12 – Thomson, 1878b : 18 – Kerremans, 1892a : 35 – Alluaud, 1900b : 179 – Kerremans, 1903 : 54 – Théry, 1905 : 38 – Kerremans, 1908a : 211 – Obenberger, 1926a : 114.

Holotype : MNHN.

synonyme / synonym : *jacquemonti* (Gory, 1841)

Chrysochroa jacquemonti Gory, 1841 : 60, pl. 11, fig. 60 – Gemminger et Harold, 1869 : 1354 – *Chalcophoropsis jacquemonti* (Gory) : Saunders, 1871 : 12 – Kerremans, 1892a : 35 – Alluaud, 1900b : 179 – Kerremans, 1903 : 54 – Théry, 1905 : 16, 38 – Kerremans, 1908a : 211 – Obenberger, 1926a : 114.

Holotype : MNHN.



Chalcophoropsis quadriveolata (Laporte de Castelnau et Gory, 1836) (d'après/from Künckel d'Herculais in Grandidier, 1890).

Tribu / Tribe **Dicercini** Gistel, 1848

Dicercini Gistel, 1848b : cover-[3] – Bellamy, 2003b: 44.

Psilopterides Lacordaire, 1857 : 26 – Bellamy, 2003b: 44.

Psilopterites Thomson, 1878b : 28 ; 1879 : 62 – Kerremans, 1893a : 106 ; 1903 : 89.

Psilopterini Schaefer, 1949 : 129 – Holyński, 1988 : 51.

Psilopterina : Holyński, 1993a : 13, 24 – Bellamy, 1997 : 219.

Genre / Genus *Lampetis* Dejean, 1833

Lampetis Dejean, 1833 : 76 [Espèce type / Type species : *Buprestis bioculata* Olivier (dénomination ultérieure / subsequent designation : Lacordaire, 1857 : 30)] – Spinola, 1837 : 113 – Lacordaire, 1857 : 27 (synonyme de / synonym of *Psiloptera*) – Gemminger et Harold, 1869 : 1364 (synonyme de / synonym of *Psiloptera*) – Saunders, 1871 : 22 – Thomson, 1878b : 29 (*Psiloptera*, 2^e coupe) – Kerremans, 1892a : 56 ; 1893a : 106 ; 1903 : 92 – Bellamy, 2003b : 48.

Psiloptera (*Lampetis*) : Théry, 1905 : 16, 39 (*Psiloptera* : Division I, Section I) – Obenberger, 1926a : 163 – Bellamy, 1985 : 416 – Kurosawa, 1993 : 580.

• *Lampetis* (s. str.) *albosparsa* (Fairmaire, 1869)

Psiloptera albosparsa Fairmaire, 1869 : 210 – Saunders, 1871 : 27 – *Alampetis albosparsa* (Fairmaire) : Waterhouse, 1880 : 180 – *Psiloptera albosparsa* (Fairmaire) : Kerremans, 1885 : 132 – *Polybothris albosparsa* (Fairmaire) : Kerremans, 1892a : 68 – Fairmaire, 1899b : 19 – Alluaud, 1900b : 180 – *Psiloptera* (*Polybothris*) *albosparsa* (Fairmaire) : Kerremans, 1903 : 95 – *Psiloptera* (*Lampetis*) *albosparsa* (Fairmaire) : Théry, 1905 : 16, 40 – *Psiloptera* (*Polybothris*) *albosparsa* (Fairmaire) : Kerremans, 1911b : 369 – Marie et Lesne, 1917 : 103 – Obenberger, 1926a : 182.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR OUEST : environs de Suberbieville [= Maevatanana]. MADAGASCAR CENTRE : S.-P. de Fianarantsoa, Sahambavy ; S.-P. d'Ambohimahaso, Ialatsara ; forêt de Sangasanga.

nom indisponible / unavailable name : *aenea* Blanchard

Blanchard (*in litt.*) – Kerremans, 1911b : 372 – Obenberger, 1926a : 182.

nom indisponible / unavailable name : *leucosticta* Fairmaire

Fairmaire (*in litt.*) – *Alampetis leucosticta* (Fairmaire) : Thomson, 1878a : 319 ; 1878b : 30 – Kerremans, 1903 : 95 ; 1911b : 372 – Obenberger, 1926a : 182.

Holotype : MNHN.

synonyme / synonym : *aeneostictica* (Künckel d'Herculais, 1890)

Polybothris aeneostictica Künckel d'Herculais, 1890 : pl. 39, fig. 9 – Kerremans, 1911b : 372 (synonyme de / synonym of *albosparsa*) – Obenberger, 1926a : 182.

• ***Lampetis* (s. str.) *alluaudi* (Kerremans, 1893)**

Dicercomorpha alluaudi Kerremans, 1893d : ciii – Alluaud, 1900b : 192 – Kerremans, 1903 : 128 ; 1914a : 378 – Obenberger, 1930 : 357 – *Lampetis alluaudi* (Kerremans) : Obenberger, 1932 : 213 – Holyński, 1993a : 26.

Holotype : BMNH.

Distribution : SEYCHELLES.

• ***Lampetis* (s. str.) *bremei* (Fairmaire, 1869)**

Psiloptera bremei Fairmaire, 1869 : 212 – Saunders, 1871 : 28 – *Psiloptera bremei* (Fairmaire) : Kerremans, 1885 : 132 – *Polybothris bremei* (Fairmaire) : 1892a : 69 ; 1894 : 339 – Alluaud, 1900b : 182 – *Psiloptera (Polybothris) bremei* (Fairmaire) : Kerremans, 1903 : 95 – *Psiloptera (Lampetis) bremei* (Fairmaire) : Théry, 1905 : 16, 41 – *Psiloptera (Polybothris) bremei* (Fairmaire) : Kerremans, 1911b : 371 – Marie et Lesne, 1917 : 103 – Obenberger, 1926a : 184.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR NORD : Diégo-Suarez / Antsiranana.

nom indisponible / unavailable name : *semiimpressa* Künckel d'Herculais, 1890

Künckel d'Herculais, 1890 : pl. 44, fig. 5 – Kerremans, 1911b : 371 (synonyme de / synonym of *bremei*) – Obenberger, 1926a : 184.

• ***Lampetis* (s. str.) *comorica* (Mannerheim, 1837)**

Psiloptera comorica Mannerheim, 1837 : 125 – Gemminger et Harold, 1869 : 1365 – Saunders, 1871 : 25 – *Lampetis comorica* (Mannerheim) : Thomson, 1878b : 30 – Kerremans, 1892a : 59 – Fairmaire, 1893 : 523, 533 – *Polybothris comorica* (Mannerheim) : Alluaud, 1900b : 183 – *Psiloptera (Lampetis) comorica* (Mannerheim) : Kerremans, 1903 : 95 – *Psiloptera (Lampetis) comorica* Mannerheim : Théry, 1905 : 16, 42 – Kerremans, 1911b : 318, 363 – Marie et Lesne, 1917 : 103 – Obenberger, 1926a : 186 – *Psiloptera (Lampetis) comorica comorica* Mannerheim : Descarpentries, 1978 : 105.

Holotype : MZHF.

Distribution : COMORES : Anjouan.

synonyme / synonym : *sommeri* (Gory, 1840)

Buprestis sommeri Gory, 1840 : 94, pl. 16, fig. 92 – *Psiloptera sommeri* (Gory) : Gemminger et Harold, 1869 : 1369 – Saunders, 1871 : 25 – Kerremans, 1892a : 59 – Alluaud, 1900b : 183 – *Psiloptera (Lampetis) sommeri* (Gory) : Kerremans, 1903 : 95 (synonyme de / synonym of *comorica*) ; 1911b : 363 – *Psiloptera (Polybothris) sommeri* (Gory) : Obenberger, 1926a : 186 – Descarpentries, 1978 : 105 – Bellamy, 1999 : 5.

Holotype : MNHN.

• **sous-espèce / subspecies** : *angazidziana* (Descarpentries, 1978)

Psiloptera (Lampetis) comorica angazidziana Descarpentries, 1978 : 105.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : COMORES : Grande Comore / Ngazidja.

• ***Lampetis* (s. str.) *coquerelii* (Fairmaire, 1869)**

Psiloptera coquerelii Fairmaire, 1869 : 211 – Saunders, 1871 : 28 – Snellen van Vollenhoven, 1874 : 2 (*coquereli*) – *Alampetis coquerelii* (Fairmaire) : Thomson, 1878a : 319 – *Lampetis coquerelii* (Fairmaire) : Thomson, 1878b : 33 – *Psiloptera coquerelii* (Fairmaire) : Kerremans, 1885 : 132 – Künckel d'Herculais, 1890 : pl. 39, fig. 8 – *Polybothris coquerelii* (Fairmaire) : Kerremans, 1892a : 70 – Fairmaire, 1893 : 523 – Kerremans, 1894 : 339 – Fairmaire, 1899b : 19 – Alluaud, 1900b : 183 – *Psiloptera* (*Polybothris*) *coquerelii* (Fairmaire) : Kerremans, 1903 : 95 – *Psiloptera* (*Lampetis*) *coquerelii* (Fairmaire) : Théry, 1905 : 16, 41 – *Psiloptera* (*Polybothris*) *coquerelii* (Fairmaire) : Kerremans, 1911b : 374 – Marie et Lesne, 1917 : 103 – Obenberger, 1926a : 186 – *Psiloptera* (*Lampetis*) *coquerelii* (Fairmaire) : Descarpentries, 1978 : 103.

Lectotype ♂ : BMNH.

Distribution : COMORES : Mayotte. MADAGASCAR OUEST : environs de Suberbieville [= Maevatanana]. MADAGASCAR CENTRE : Tananarive / Antananarivo. MADAGASCAR NORD : Diégo-Suarez / Antsiranana. MADAGASCAR EST : Pays Antsianaka.

nom indisponible / unavailable name : *coquerelli* La Férte

La Férte (*in litt.*) – Thomson, 1878b : 33.

nom indisponible / unavailable name : *coquerelli* (Thomson, 1878)

Alampetis coquerelii Thomson, 1878a : 319 (synonyme de / synonym of *coquerelii*).

synonyme / synonym : *coquerelli* (Thomson, 1878)

Lampetis coquerelii Thomson, 1878b : 33.

synonyme / synonym : *purpurea* Théry, 1912

Polybothris coquereli var. *purpurea* Théry, 1912 : 108.

Holotype : MNHN.

• ***Lampetis* (s. str.) *cyanimaculifer* (Künckel d'Herculais, 1890)**

Polybothris cyanimaculifer Künckel d'Herculais, 1890 : pl. 38, fig. 8 – *Psiloptera* (*Polybothris*) *cyaneomaculifer* (Künckel d'Herculais) : Kerremans, 1911b : 352 – Obenberger, 1926a : 187.

Holotype : inconnu / unknown.

Distribution : MADAGASCAR.

synonyme / synonym : *curtula* (Kerremans, 1899)

Polybothris curtula Kerremans, 1899 : 262 – Alluaud, 1900b : 184 – *Psiloptera* (*Polybothris*) *curtula* (Kerremans) : Kerremans, 1903 : 101 – *Psiloptera curtula* (Kerremans) : Théry, 1905 : 17, 44 – Kerremans, 1911b : 352 (synonyme de / synonym of *cyanimaculifer*) – Obenberger, 1926a : 187.

Holotype : BMNH.

• ***Lampetis* (s. str.) *cyclops* (Théry, 1905)**

Psiloptera (*Lampetis*) *cyclops* Théry, 1905 : 17, 44 – *Psiloptera* (*Polybothris*) *cyclops* Théry : Kerremans, 1911b : 368 – Obenberger, 1926a : 187.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR SUD : S.-P. de Betioky Sud.

• ***Lampetis* (s. str.) *decorsei* (Théry, 1905)**

Psiloptera (*Lampetis*) *decorsei* Théry, 1905 : 17, 42, pl. I, fig. 4 – *Psiloptera* (*Polybothris*) *decorsei* Théry : Kerremans, 1911b : 373 – Obenberger, 1926a : 187.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR SUD : Amboasary, Tsitevempeky et Ambinangy.

• ***Lampetis* (s. str.) *exophthalma* (Guérin-Ménéville, 1832)**

Buprestis exophthalma Guérin-Ménéville, 1832d : N° 26 – Laporte de Castelnau et Gory, 1837 : 86 – Mannerheim, 1837 : 39 – *Psiloptera exophthalma* (Guérin-Ménéville) : Lacordaire, 1857 : 30 – Gemminger et Harold, 1869 : 1366 – Saunders, 1871 : 27 – *Alampetis exophthalma* (Guérin-Ménéville) : Thomson, 1878a : 319 – *Lampetis exophthalma* (Guérin-Ménéville) : Thomson, 1878b : 30 ; *Polybothris exophthalma* (Guérin-Ménéville) : Kerremans, 1892a : 71 ; 1894 : 339 – Alluaud, 1900b : 185 – *Psiloptera* (*Polybothris*) *exophthalma* (Guérin-Ménéville) : Kerremans, 1903 : 95 – *Psiloptera exophthalma* (Guérin-Ménéville) : Théry, 1905 : 16, 41 – *Psiloptera* (*Polybothris*) *exophthalma* (Guérin-Ménéville) : Kerremans, 1911b : 361 (*exophthalma*) – Obenberger, 1926a : 188.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : pays Antsianaka.

nom indisponible / unavailable name : *goudotii* Dejean, 1833

Dejean, 1833 : 77 (*Dicerca*, nom. nud.) ; 1836 : 87 – Mannerheim, 1837 : 40 – *Lampetis goudotii* (Dejean) : Spinola, 1837 : 107, 114 – *Psiloptera goudotii* (Dejean) : Gemminger et Harold, 1869 : 1366 (synonyme de / synonym of *exophthalma*) – Obenberger, 1926a : 188.

synonyme / synonym : *chalybeata* (Klug, 1833)

Buprestis chalybeata Klug, 1833 : 61 ; 1834 : 149 – Mannerheim, 1837 : 40 – Spinola, 1837 : 114 – Lacordaire, 1857 : 30 – *Psiloptera chalybeata* (Klug) : Gemminger et Harold, 1869 : 1366 (synonyme de / synonym of *exophthalma*) – Saunders, 1871 : 27 – *Polybothris chalybeata* (Klug) : Kerremans, 1892a : 71 – Alluaud, 1900b : 179 – *Psiloptera* (*Polybothris*) *chalybeata* (Klug) : Kerremans, 1903 : 95 – *Psiloptera chalybeata* (Klug) : Théry, 1905 : 16 – *Psiloptera* (*Polybothris*) *chalybeata* (Klug) : Kerremans, 1911b : 361 – Obenberger, 1926a : 188.

Holotype : ZMHB.

synonyme / synonym : *tropica* (Laporte de Castelnau et Gory, 1837)

Buprestis (*Psiloptera*) *tropica* Laporte de Castelnau et Gory, 1837 : 87 – *Psiloptera tropica* (Laporte de Castelnau et Gory) : Gemminger et Harold, 1869 : 1366 (synonyme de / synonym of *exophthalma*) – Saunders, 1871 : 27 – *Alampetis tropica* (Laporte de Castelnau et Gory) : Thomson, 1878a : 319 – *Polybothris tropica* (Laporte de Castelnau et Gory) : Kerremans, 1892a : 71 – Alluaud, 1900b : 180 – *Psiloptera tropica* (Laporte de Castelnau et Gory) : Kerremans, 1903 : 95 – Théry, 1905 : 16 – *Psiloptera* (*Polybothris*) *tropica* (Laporte de Castelnau et Gory) : Kerremans, 1911b : 361 – Obenberger, 1926a : 189 (variété de / variety of *exophthalma*).

Holotype : MNHN.

synonyme / synonym : *soror* (Thomson, 1878)

Alampetis soror Thomson, 1878a : 335 – Waterhouse, 1880 : 180 – *Polybothris soror* (Thomson) : Kerremans, 1885 : 131 ; 1892a : 75 ; 1900a : 292 (synonyme de / synonym of *exophthalma*) – Alluaud, 1900b : 190 – *Psiloptera (Polybothris) soror* (Thomson) : Kerremans, 1903 : 95 – *Psiloptera soror* (Thomson) : Théry, 1905 : 16 – *Psiloptera (Polybothris) soror* (Thomson) : Kerremans, 1911b : 361 – Obenberger, 1926a : 189 (variété de / variety of *exophthalma*).

Holotype : MNHN.

• ***Lampetis (s. str.) flavocincta* (Kerremans, 1894)**

Polybothris flavocincta Kerremans, 1894 : 339 – Alluaud, 1900b : 185 – *Psiloptera (Polybothris) flavocincta* (Kerremans) : Kerremans, 1903 : 95 – *Psiloptera flavocincta* (Kerremans) : Théry, 1905 : 17, 42 – Kerremans, 1911b : 358 – Obenberger, 1926a : 189.

Holotype : BMNH.

Distribution : MADAGASCAR EST : Pays Antsianaka. MADAGASCAR NORD : Pays Antankares / Antankarana.

• ***Lampetis (s. str.) pater* (Théry, 1905)**

Psiloptera (Lampetis) pater Théry, 1905 : 17, 45, 178 – *Psiloptera (Polybothris) pater* (Théry, 1905) : Kerremans, 1911b : 359 – Obenberger, 1926a : 195.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Lampetis (s. str.) patruelis* (Fairmaire, 1869)**

Psiloptera patruelis Fairmaire, 1869 : 211 – Saunders, 1871 : 28 – *Psiloptera patruelis* (Fairmaire) : Kerremans, 1885 : 133 – *Polybothris patruelis* (Fairmaire) : Kerremans, 1892a : 74 – Fairmaire, 1893 : 523 – Alluaud, 1900b : 188 – *Psiloptera patruelis* (Fairmaire) : Kerremans, 1903 : 95 – Théry, 1905 : 16, 41 – *Psiloptera (Polybothris) patruelis* (Fairmaire) : Kerremans, 1911b : 365 – Marie et Lesne, 1917 : 103 – *Psiloptera patruelis* (Fairmaire) : Voeltzkow, 1917 : 465 – Obenberger, 1926a : 195 – Descarpentries, 1978 : 104.

Lectotype ♂ : MNHN.

Distribution : COMORES : Mayotte.

synonyme / synonym : *mayottensis* (Snellen von Vollenhoeven, 1869)

Psiloptera mayottensis Snellen von Vollenhoeven, 1869 : 9 – Saunders, 1871 : 27 – *Polybothris mayottensis* (Snellen von Vollenhoeven) : 1892a : 72 – Alluaud, 1900b : 187 – Kerremans, 1903 : 102 – *Psiloptera mayottensis* (Snellen von Vollenhoeven) : Théry, 1905 : 22, 104 (Division II, Section VI) – Kerremans, 1911b : 369 – Obenberger, 1926a : 192 – Descarpentries, 1978 : 104 (synonyme de / synonym of *patruelis*).

Holotype : RMNH.

synonyme / synonym : *sternalis* (Fairmaire, 1869)

Psiloptera sternalis Fairmaire, 1869 : 213 – Saunders, 1871 : 28 – *Alampetis sternalis* (Fairmaire) : Thomson, 1878a : 319 ; 1878b : 30 – Künckel d'Herculais, 1890, pl. 44, fig. 2 – Fairmaire, 1893 : 523 – *Psiloptera sternalis* (Fairmaire) : Théry, 1905 : 16, 42 – Kerremans, 1885 : 134 ; 1892a : 75 – Alluaud, 1900b : 191 – Kerremans, 1903 : 95 ; 1911b : 369 – Marie et Lesne, 1917 : 103 – Obenberger, 1926a : 192 – Descarpentries, 1978 : 104 (synonyme de / synonym of *patruelis*).

Lectotype ♀ : MNHN.

• ***Lampetis* (s. str.) *peraffinis* (Fairmaire, 1869)**

Psiloptera peraffinis Fairmaire, 1869 : 214 – Saunders, 1871 : 28 – *Alampetis peraffinis* (Fairmaire) : Thomson, 1878a : 319 – *Psiloptera peraffinis* (Fairmaire) : Kerremans, 1885 : 133 – Künckel d'Herculais, 1890 : pl. 44, fig. 8 (*paraffinis*) – *Polybothris peraffinis* (Fairmaire) : Kerremans, 1892a : 74 – Alluaud, 1900b : 188 – Kerremans, 1903 : 102 – *Psiloptera* (*Lampetis*) *peraffinis* (Fairmaire) : Théry, 1905 : 17, 44 – *Psiloptera* (*Polybothris*) *peraffinis* (Fairmaire) : Kerremans, 1911b : 355 – Marie et Lesne, 1917 : 103 – Obenberger, 1926a : 195.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Lampetis* (s. str.) *sycophanta* (Fairmaire, 1869)**

Psiloptera sycophanta Fairmaire, 1869 : 212 – Saunders, 1871 : 28 – Kerremans, 1885 : 134 – Künckel d'Herculais, 1890 : pl. 44, fig. 9 – *Polybothris sycophanta* (Fairmaire) : Kerremans, 1892a : 76 – Alluaud, 1900b : 191 – Kerremans, 1903 : 95 (*sycophantha*) – *Psiloptera* (*Lampetis*) *sycophanta* (Fairmaire) : Théry, 1905 : 16, 41 – *Psiloptera* (*Polybothris*) *sycophanta* (Fairmaire) : Kerremans, 1911b : 363 (*sycophantha*) – Marie et Lesne, 1917 : 103 – Obenberger, 1926a : 199.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Lampetis* (s. str.) *valreasi* (Théry, 1905)**

Psiloptera (*Lampetis*) *valreasi* Théry, 1905 : 17, 43 – *Psiloptera* (*Polybothris*) *valreasi* Théry : Kerremans, 1911b : 355, pl. 30, fig. 7 – Obenberger, 1926a : 199.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Maroantsetra, baie d'Antongil.

• ***Lampetis* (s. str.) *viridicornis* (Künckel d'Herculais, 1890)**

Polybothris viridicornis Künckel d'Herculais, 1890 : pl. 43, fig. 3 – *Psiloptera* (*Polybothris*) *viridicornis* (Künckel d'Herculais) : Kerremans, 1911b : 357 – Obenberger, 1926a : 199.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

synonyme / synonym : *lemur* (Théry, 1905)

Psiloptera (*Lampetis*) *lemur* Théry, 1905 : 17, 43 – *Psiloptera* (*Polybothris*) *lemur* (Théry) : Kerremans, 1911b : 357 (synonyme de / synonym of *viridicornis*) – Obenberger, 1926a : 199.

Genre / Genus *Apateum* Spinola, 1837

Apateum Spinola, 1837 : 120 [Espèce type / Type species : *Buprestis luccotii* Guérin-Ménéville (dénomination ultérieure / subsequent designation : Thomson, 1878 : 317)] – Lacordaire, 1857 : 27 (synonyme de / synonym of *Psiloptera*) – Saunders, 1871 : 22 (synonyme de / synonym of *Psiloptera*) – Kurosawa, 1993 : 581 – Bellamy, 2003b : 46.

Apatea Thomson, 1878a : 317 (émendation injustifiée / unjustified emendation) ; 1878b : 34 (*Psiloptera*, 4^e Coupe, 1^{re} Division) – Kerremans, 1892a : 68 (synonyme de / synonym of *Psiloptera*) ; 1903 : 90 ; 1910 : 3 – Obenberger, 1926a : 182.

Psiloptera (*Apatea*) : Théry, 1905 : 17, 53 (*Psiloptera* : Division I, Section III).

Sous-genre / Subgenus *Alampetis* Thomson, 1878

Alampetis Thomson, 1878a : 317 [Espèce type / Type species : *Buprestis zivetta* Klug (dénomination originale / original designation)] – Kerremans, 1885 : 130 (synonyme de / synonym of *Polybothris*) ; 1903 : 90 ; 1910 : 3 – Obenberger, 1926a : 182 ; 1942b : 30 – Kurosawa, 1993 : 581 – Bellamy, 2003b : 46.

Polybothris Auctorum – Kerremans, 1903 : 97 (nec Spinola, 1837) – Kurosawa, 1993 : 581.

Lampetis Auctorum – Théry, 1905 : 39 – Kurosawa, 1993 : 581.

Psiloptera (*Alampetis*) : Théry, 1905 : 17, 45 (*Psiloptera*, Division I, Section II)

• *Apateum* (*Alampetis*) *acuminatum* (Kerremans, 1898)

Polybothris acuminata Kerremans, 1898b : 79 – *Psiloptera* (*Polybothris*) *acuminata* (Kerremans) : Kerremans, 1903 : 97 – *Psiloptera acuminata* (Kerremans) : Théry, 1905 : 17, 45 – *Psiloptera* (*Polybothris*) *acuminata* (Kerremans) : Théry, 1911b : 384 – Obenberger, 1926a : 182.

Holotype : BMNH.

Distribution : MADAGASCAR.

synonyme / synonym : *olsoufieviella* (Obenberger, 1942)

Polybothris (*Alampetis*) *acuminata* var. *olsoufieviella* Obenberger, 1942b : 32.

Holotype : NMPC-20925.

• *Apateum* (*Alampetis*) *aeneipes* (Fairmaire, 1903)

Polybothris aeneipes Fairmaire, 1903a : 28 – *Psiloptera aeneipes* (Fairmaire) : Théry, 1905 : 17, 52 – *Psiloptera* (*Polybothris*) : Kerremans, 1911b : 377 – Marie et Lesne, 1917 : 97 – Obenberger, 1926a : 182.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR OUEST : environs de Suberbieville [= Maevatanana].

synonyme / synonym : *staudingeriana* (Obenberger, 1917)

Psiloptera (*Polybothris*) *staudingeriana* Obenberger, 1917b : 278 ; 1926a : 198 – Théry, 1935 : 255 (synonyme de / synonym of *aeneipes*).

Holotype : NMPC.

• ***Apateum (Alampetis) ambiguum* (Thomson, 1878)**

Alampetis ambigua Thomson, 1878a : 337 – *Polybothris ambigua* (Thomson) : Kerremans, 1885 : 130 ; 1892a : 68 – Alluaud, 1900b : 180 – *Psiloptera (Polybothris) ambigua* (Thomson) : Kerremans, 1903 : 100 – *Psiloptera ambigua* (Thomson) : Théry, 1905 : 104 – *Psiloptera (Polybothris) ambigua* (Thomson) : Kerremans, 1911b : 520 – Obenberger, 1926a : 182.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Apateum (Alampetis) convexum* (Laporte de Castelnau et Gory, 1836)**

Buprestis (Psiloptera) convexa Laporte de Castelnau et Gory, 1836 : 58, pl. 14, fig. 74 – *Polybothris convexa* (Laporte de Castelnau et Gory) : Gemminger et Harold, 1869 : 1363 – *Psiloptera convexa* (Laporte de Castelnau et Gory) : Saunders, 1871 : 28 – Waterhouse 1880 : 180 – *Polybothris convexa* (Laporte de Castelnau et Gory) : Kerremans, 1892a : 70 ; 1894 : 341 – Alluaud, 1900b : 183 – *Psiloptera convexa* (Laporte de Castelnau et Gory) : Théry, 1905 : 17, 52 – *Psiloptera (Polybothris) convexa* (Laporte de Castelnau et Gory) : Kerremans, 1911b : 395 – Obenberger, 1926a : 186.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Apateum (Alampetis) cribristernum* (Fairmaire, 1903)**

Polybothris cribristerna Fairmaire, 1903a : 29 – *Psiloptera cribristerna* (Fairmaire) : Théry, 1905 : 17, 53 – *Psiloptera (Polybothris) cribristerna* (Fairmaire) : Kerremans, 1911b : 379, pl. 31, fig. 1 – Marie et Lesne, 1917 : 97 – Obenberger, 1926a : 187.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : Farafangana

• ***Apateum (Alampetis) davidi* (Fairmaire, 1889)**

Polybothris davidi Fairmaire, 1889b : 111 – Alluaud, 1900b : 184 – Kerremans, 1903 : 97 – *Psiloptera davidi* (Fairmaire) : Théry, 1905 : 17, 50 – *Psiloptera (Polybothris) davidi* (Fairmaire) : Kerremans, 1911b : 392, pl. 31, fig. 2 – Marie et Lesne, 1917 : 97 – Obenberger, 1926a : 187.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : Farafangana.

• ***Apateum (Alampetis) differens* (Kerremans, 1903)**

Polybothris differens Kerremans, 1903 : 97 – *Psiloptera differens* (Kerremans) : Théry, 1905 : 17, 47 – *Psiloptera (Polybothris) differens* (Kerremans) : Kerremans, 1911b : 392 – Obenberger, 1926a : 188.

Holotype : MRAC.

Distribution : MADAGASCAR.

synonyme / synonym : *pamene* (Obenberger, 1942)

Polybothris (Alampetis) differens var. *pamene* Obenberger, 1942b : 33.

Holotype : NMPC-20931.

• ***Apateum (Alampetis) dissimilis* (Thomson, 1878)**

Alampetis dissimilis Thomson, 1878a : 332 – *Polybothris dissimilis* (Thomson) : Kerremans, 1885 : 130 ; 1892a : 71 – Alluaud, 1900b : 184 – *Psiloptera (Polybothris) dissimilis* (Thomson) : Kerremans, 1903 : 97 – *Psiloptera dissimilis* (Thomson) : Théry, 1905 : 17, 46 – *Psiloptera (Polybothris) dissimilis* (Thomson) : Kerremans, 1911b : 384 – Obenberger, 1926a : 188.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

synonyme / synonym : *salebria* (Obenberger, 1942)

Polybothris (Alampetis) donckieri var. *salebria* Obenberger, 1942b : 32.

Holotype : NMPC-20927.

• ***Apateum (Alampetis) donckieri* (Théry, 1905)**

Psiloptera donckieri Théry, 1905 : 17, 47, 178, pl. I, fig. 5 – *Psiloptera (Polybothris) donckieri* (Théry) : Kerremans, 1911b : 389 – Obenberger, 1926a : 188.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

synonyme / synonym : *nigellata* (Obenberger, 1942)

Polybothris (Alampetis) donckieri var. *nigellata* Obenberger, 1942b : 33.

Holotype : NMPC-20930.

• ***Apateum (s. g. indef.) epigaptrum* (Obenberger, 1942)**

Polybothris epigaptra Obenberger, 1942b : 31.

Holotype : NMPC-20922.

Distribution : MADAGASCAR CENTRE : Ambalavao.

• ***Apateum (Apateum) incongruum* (Thomson, 1878)**

Alampetis incongrua Thomson, 1878a : 333 – *Polybothris incongrua* (Thomson) : Kerremans, 1885 : 130 ; 1892a : 72 – Alluaud, 1900b : 185 – *Psiloptera (Polybothris) incongrua* (Thomson) : Kerremans, 1903 : 101 – *Psiloptera incongrua* (Thomson) : Théry, 1905 : 17, 51 – *Psiloptera (Polybothris) incongrua* (Thomson) : Kerremans, 1911b : 390 – Obenberger, 1926a : 190.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

synonyme / synonym : *crassiuscula* (Fairmaire, 1889)

Psiloptera crassiuscula Fairmaire, 1889a : vii – Kerremans, 1892a : 70 – Alluaud, 1900b : 183 – *Psiloptera (Polybothris) crassiuscula* (Fairmaire) : Kerremans, 1903 : 97 – *Psiloptera*

crassiuscula (Fairmaire) : Théry, 1905 : 17, 47 – *Psiloptera* (*Polybothris*) *crassiuscula* (Fairmaire) : Kerremans, 1911b : 390 – Marie et Lesne, 1917 : 103 – Obenberger, 1926a : 190.

Holotype : MNHN.

synonyme / synonym : *dubitata* (Kerremans, 1903)

Psiloptera dubitata Kerremans, 1903 : 97 – Théry, 1905 : 17, 47 – *Psiloptera* (*Polybothris*) *dubitata* (Kerremans) : Kerremans, 1911b : 390 – Obenberger, 1926a : 190.

Holotype : BMNH.

• ***Apateum* (*Apateum*) *luczotii* (Guérin-Méneville, 1833)**

Buprestis luczotii Guérin-Méneville, 1833b : N° 65 – *Buprestis* (*Psiloptera*) *luczotii* Guérin-Méneville : Laporte de Castelnau et Gory, 1836 : 50, pl. 12, fig. 63 – *Apateum luczotii* (Guérin-Méneville) : Spinola, 1837 : 120 – *Psiloptera luczotii* (Guérin-Méneville) : Lacordaire, 1857 : 29 – *Polybothris luczotii* (Guérin-Méneville) : Gemminger et Harold, 1869 : 1363 – *Psiloptera luczotii* (Guérin-Méneville) : Saunders, 1871 : 29 – *Apatea luczotii* (Guérin-Méneville) : Thomson, 1878a : 319 ; 1878b : 34 – Waterhouse 1880 : 180 – *Polybothris luczotii* (Guérin-Méneville) : Künckel d'Herculais, 1890 : pl. 40, fig. 2 – Kerremans, 1892a : 72 ; 1894 : 340 – Alluaud, 1900b : 187 – Kerremans, 1903 : 98 – *Psiloptera luczotii* (Guérin-Méneville) : Théry, 1905 : 17, 53 – *Psiloptera* (*Polybothris*) *luczotii* (Guérin-Méneville) : Kerremans, 1911b : 349 – Obenberger, 1926a : 192 – Hoschek 1927 : 233.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : Pays Antsianaka.

synonyme / synonym : *calceata* (Klug, 1833)

Buprestis calceata Klug, 1833 : 53, pl. 2, fig. 5 ; 1834 : 141 – *Lampetis calceata* (Klug) : Dejean, 1836 : 86 – *Apateum calceata* (Klug) : Spinola, 1837 : 120 – *Psiloptera calceata* (Klug) : Lacordaire, 1857 : 29 – *Polybothris calceata* (Klug) : Gemminger et Harold, 1869 : 1363 (synonyme de / synonym of *luczotii*) – *Psiloptera calceata* (Klug) : Saunders, 1871 : 29 – *Polybothris calceata* (Klug) : Thomson, 1878a : 319 (synonyme de / synonym of *luczotii*) ; 1878b : 34 – Kerremans, 1892a : 72 – Alluaud, 1900b : 179 (synonyme de / synonym of *luczotii*) – *Psiloptera* (*Polybothris*) *calceata* (Klug) : Kerremans, 1903 : 98 – *Psiloptera calceata* (Klug) : Théry, 1905 : 17 – *Psiloptera* (*Polybothris*) *calceata* (Klug) : Kerremans, 1911b : 349 – Obenberger, 1926a : 192.

Holotype : ZMHB.

• **sous-espèce / subspecies** : *abeillei* (Théry, 1905)

Psiloptera abeillei Théry, 1905 : 18, 54, 178 – *Psiloptera* (*Polybothris*) *abeillei* (Théry) : Kerremans, 1911b : 349 – Obenberger, 1926a : 192.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• **sous-espèce / subspecies** : *aeneidorsis* (Obenberger, 1928)

Psiloptera (*Polybothris*) *luczotii* subsp. *aeneidorsis* Obenberger, 1928b : 170.

Holotype : NMPC-20912.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Apateum (Alampetis) opistograptis* (Obenberger, 1942)**

Polybothris opistograptis Obenberger, 1942b : 32.

Holotype : NMPC-20923.

Distribution : MADAGASCAR EST : Befotaka

• ***Apateum (Alampetis) plicifrons* (Fairmaire, 1903)**

Polybothris plicifrons Fairmaire, 1903a : 27 – *Psiloptera plicifrons* (Fairmaire) : Théry, 1905 : 17, 52 – *Psiloptera (Polybothris) plicifrons* (Fairmaire) : Kerremans, 1911b : 376 – Marie et Lesne, 1917 : 98 – Obenberger, 1926a : 195.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Maroantsetra, baie d'Antongil

• ***Apateum (Alampetis) protasis* (Obenberger, 1942)**

Polybothris protasis Obenberger, 1942b : 30.

Holotype : NMPC-20920

Distribution : MADAGASCAR SAMBIRANO : haute vallée du Sambirano.

• ***Apateum (Alampetis) purpureiventris* (Fairmaire, 1899)**

Polybothris purpureiventris Fairmaire, 1899a : 111 – Alluaud, 1900b : 189 – *Psiloptera (Polybothris) purpureiventris* (Fairmaire) : Kerremans, 1903 : 102 – *Psiloptera purpureiventris* (Fairmaire) : Théry, 1905 : 17, 51 – *Psiloptera (Polybothris) purpureiventris* (Fairmaire) : Kerremans, 1911b : 396 – Marie et Lesne, 1917 : 98 – Obenberger, 1926a : 195.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : Farafangana.

• ***Apateum (Alampetis) quadriplicatum* (Thomson, 1878)**

Alampetis quadriplicata Thomson, 1878a : 333 – *Polybothris quadriplicata* (Thomson) : Kerremans, 1885 : 131 ; 1892a : 74 – Alluaud, 1900b : 189 – *Psiloptera (Polybothris) quadriplicata* (Thomson) : Kerremans, 1903 : 97 – *Psiloptera quadriplicata* (Thomson) : Théry, 1905 : 17, 46 – *Psiloptera (Polybothris) quadriplicata* (Thomson) : Kerremans, 1911b : 378 – Obenberger, 1926a : 196.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

synonyme / synonym : *rebelia* (Obenberger, 1942)

Polybothris (Alampetis) quadriplicata var. *rebelia* Obenberger, 1942b : 31.

Holotype : NMPC.

• ***Apateum (Alampetis) semipolitus* (Fairmaire, 1903)**

Polybothris semipolita Fairmaire, 1903b : 200 – *Psiloptera semipolita* (Fairmaire) : Théry, 1905 : 17, 50 – *Psiloptera (Polybothris) semipolita* (Fairmaire) : Kerremans, 1911b : 365, pl. 30, fig. 8 – Marie et Lesne, 1917 : 98 – Obenberger, 1926a : 197.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR NORD : Diégo-Suarez / Antsiranana.

• ***Apateum (Alampetis) sexsulcatum* (Fairmaire, 1869)** (Pl. 3, fig. 27-28)

Psiloptera sexsulcata Fairmaire, 1869 : 215 – Saunders, 1871 : 28 – *Alampetis sexsulcata* (Fairmaire) : Thomson, 1878a : 319 – *Psiloptera sexsulcata* (Fairmaire) : Kerremans, 1885 : 133 – *Polybothris sexsulcata* (Fairmaire) : Kerremans, 1892a : 75 – Alluaud, 1900b : 190 – *Psiloptera (Polybothris) sexsulcata* (Fairmaire) : Kerremans, 1903 : 102 – *Psiloptera sexsulcata* (Fairmaire) : Théry, 1905 : 17, 51 – *Psiloptera (Polybothris) sexsulcata* (Fairmaire) : Kerremans, 1911b : 375 – Marie et Lesne, 1917 : 103 – Obenberger, 1926a : 197.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : Perinet.

• ***Apateum (Alampetis) similis* (Kerremans, 1903)**

Psiloptera (Polybothris) similis Kerremans, 1903 : 97 – *Psiloptera similis* (Kerremans) : Théry, 1905 : 17, 46 – *Psiloptera (Polybothris) similis* (Kerremans) : Kerremans, 1911b : 387 – Obenberger, 1926a : 197.

Holotype : BMNH.

Distribution : MADAGASCAR.

synonyme / synonym : *affinis* (Kerremans, 1900)

Polybothris affinis Kerremans, 1900a : 292 ; 1903 : 97 – Théry, 1905 : 17 (synonyme de / synonym of *similis*) – Kerremans, 1911b : 387 – Obenberger, 1926a : 197.

Holotype : BMNH.

synonyme / synonym : *midongyana* (Obenberger, 1942)

Polybothris (Alampetis) similis var. *midongyana* Obenberger, 1942b : 33.

Holotype : NMPC-20928.

• ***Apateum (Alampetis) sordidum* (Théry, 1905)**

Psiloptera sordida Théry, 1905 : 17, 46 – *Psiloptera (Polybothris) sordida* (Théry) : Kerremans, 1911b : 386 – Obenberger, 1926a : 198.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Maroantsetra, baie d'Antongil.

• ***Apateum (Alampetis) viriditarsis* (Laporte de Castelnau et Gory, 1836)**

Buprestis (Psiloptera) viriditarsis Laporte de Castelnau et Gory, 1836 : 47, pl. 12, fig. 60 – Gemminger et Harold, 1869 : 1364 – Saunders, 1871 : 27 – *Alampetis viriditarsis* (Laporte de Castelnau et Gory) : Thomson, 1878a : 319 – Künckel d'Herculais, 1890 : pl. 43, fig. 4 – *Polybothris viriditarsis* (Laporte de Castelnau et Gory) : Kerremans, 1892a : 76 – Alluaud, 1900b : 192 – *Psiloptera (Polybothris) viriditarsis* (Laporte de Castelnau et Gory) : Kerremans, 1903 : 97 – *Psiloptera viriditarsis* (Laporte de Castelnau et Gory) : Théry, 1905 : 17, 46 – *Psiloptera (Polybothris) viriditarsis* Laporte de Castelnau et Gory ; Kerremans, 1911b : 380 – Obenberger, 1926a : 199.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

synonyme / synonym : *extrema* (Thomson, 1878)

Alampetis extrema Thomson, 1878a : 334 – *Polybothris extrema* (Thomson) : Kerremans, 1885 : 130 ; 1892a : 71 ; 1900a : 291 (synonyme de / synonym of *viriditarsis*) – Alluaud, 1900b : 185 – *Psiloptera extrema* (Thomson) : Kerremans, 1903 : 97 – Théry, 1905 : 17 – Kerremans, 1911b : 380 – Obenberger, 1926a : 199.

Holotype : MNHN.

synonyme / synonym : *luteomaculata* (Künckel d'Herculais, 1890)

Polybothris luteomaculata Künckel d'Herculais, 1890 : pl. 44, fig. 11 – *Psiloptera* (*Polybothris*) *luteomaculata* (Künckel d'Herculais) : Kerremans, 1911b : 380 (synonyme de / synonym of *viriditarsis*) – Obenberger, 1926a : 199.

synonyme / synonym : *episcopalis* (Obenberger, 1942)

Polybothris (*Alampetis*) *viriditarsis* var. *episcopalis* Obenberger, 1942b : 31.

Holotype : NMPC-20924

• ***Apateum* (*Alampetis*) *waterhousei* (Kerremans, 1903)**

Psiloptera (*Polybothris*) *waterhousei* Kerremans, 1903 : 102 (nom. nov. de / for *Alampetis scintillans* Waterhouse, 1880) – *Psiloptera waterhousei* (Kerremans) : Théry, 1905 : 17, 50 – *Psiloptera* (*Polybothris*) *waterhousei* (Kerremans) : Kerremans, 1911b : 394 – Obenberger, 1926a : 199.

Holotype : BMNH.

Distribution : MADAGASCAR EST : Pays Antsianaka.

synonyme / synonym : *scintillans* (Waterhouse, 1880)

Alampetis scintillans Waterhouse, 1880 : 180 (nom. praeocc. par / by *scintillans* Waterhouse, 1877) – *Polybothris scintillans* (Waterhouse) : Kerremans, 1885 : 131 ; 1892a : 75 – Alluaud, 1900b : 190 – *Psiloptera* (*Polybothris*) *scintillans* (Waterhouse) : Kerremans, 1903 : 97, 102 – *Psiloptera scintillans* (Waterhouse) : Théry, 1905 : 17 – *Psiloptera* (*Polybothris*) *scintillans* (Waterhouse) : Kerremans, 1911b : 394 – Obenberger, 1926a : 200.

Holotype : BMNH.

synonyme / synonym : *convexa* (Künckel d'Herculais, 1890)

Polybothris convexa Künckel d'Herculais, 1890 : pl. 38, fig. 7 – *Psiloptera* (*Polybothris*) *convexa* (Künckel d'Herculais) : Kerremans, 1911b : 394 (synonyme de / synonym of *waterhousei*) – Obenberger, 1926a : 200.

Holotype : inconnu / unknown.

• ***Apateum* (*Alampetis*) *xanthostictum* (Fairmaire, 1896)**

Psiloptera xanthosticta Fairmaire, 1896 : 215 – Saunders, 1871 : 28 – Künckel d'Herculais, 1890 : pl. 44, fig. 7 – *Psiloptera xanthosticta* (Fairmaire) : Kerremans, 1885 : 134 – *Polybothris xanthosticta* (Fairmaire) : Kerremans, 1892a : 76 – Alluaud, 1900b :

192 – *Psiloptera (Polybothris) xanthosticta* (Fairmaire) : Kerremans, 1903 : 103 – *Psiloptera xanthosticta* (Fairmaire) : Théry, 1905 : 17, 52 – *Psiloptera (Polybothris) xanthosticta* (Fairmaire) : Kerremans, 1911b : 388 – Marie et Lesne, 1917 : 103 – Obenberger, 1926a : 200.

Distribution : MADAGASCAR NORD : Pays des Antankares / Antakarana.

Holotype : MNHN.

synonyme / synonym : *humeralis* (Kerremans, 1894)

Polybothris humeralis Kerremans, 1894 : 340 – Alluaud, 1900b : 185 – *Psiloptera (Polybothris) humeralis* (Kerremans) : Kerremans, 1903 : 97 – *Psiloptera humeralis* (Kerremans) : Théry, 1905 : 17, 46 – *Psiloptera (Polybothris) humeralis* (Kerremans) : Kerremans, 1911b : 388 – Obenberger, 1926a : 200.

Holotype : BMNH.

synonyme / synonym : *lateripicta* (Fairmaire, 1899)

Polybothris lateripicta Fairmaire, 1899a : 112 – Alluaud, 1900b : 186 – *Psiloptera (Polybothris) lateripicta* (Fairmaire) : Kerremans, 1903 : 102 – *Psiloptera lateripicta* (Fairmaire) : Théry, 1905 : 17 – *Psiloptera (Polybothris) lateripicta* (Fairmaire) : Kerremans, 1911b : 388 – Marie et Lesne, 1917 : 97 – Obenberger, 1926a : 200.

Holotype : MNHN.

synonyme / synonym : *notocelia* (Obenberger, 1942)

Polybothris (Alampetis) xanthosticta var. *notocelia* Obenberger, 1942b : 33.

Holotype : NMPC-20929.

• ***Apateum (Alampetis) zivettum* (Klug, 1833)**

Buprestis zivetta Klug, 1833 : 54, pl. 2, fig. 6 ; 1834 : 143 – *Buprestis (Psiloptera) zivetta* Klug : Laporte de Castelnau et Gory, 1836 : 48, pl. 12, fig. 61 – *Polybothris zivetta* (Klug) : Spinola, 1837 : 117 – Mannerheim, 1837 : 60 – *Psiloptera zivetta* (Klug) : Lacordaire, 1857 : 29 – Gemminger et Harold, 1869 : 1364 – Saunders, 1871 : 28 – *Alampetis zivetta* (Klug) : Thomson, 1878a : 319 – Waterhouse 1880 : 180 – Künckel d'Herculais, 1890 : pl. 38, fig. 2 – *Polybothris zivetta* (Klug) : Kerremans, 1892a : 76 ; 1894 : 340 – Alluaud, 1900b : 192 – *Psiloptera (Polybothris) zivetta* (Klug) : Kerremans, 1903 : 97 – *Psiloptera zivetta* (Klug) : Théry, 1905 : 17, 45 – *Psiloptera (Polybothris) zivetta* (Klug) : Kerremans, 1911b : 382 – Obenberger, 1926a : 200.

Holotype : ZMHB.

Distribution : MADAGASCAR EST : Pays Antsianaka (Le type de Klug collecté par J. Goudot provient probablement de / The Klug's type collected by J. Goudot comes probably from MADAGASCAR CENTRE : Imerina).


synonyme / synonym : *granulosissima* (Thomson, 1878)

Alampetis granulosissima Thomson, 1878a : 332 – *Polybothris granulosissima* (Thomson) : Kerremans, 1885 : 130 ; 1892a : 71 – Alluaud, 1900b : 185 – *Psiloptera (Polybothris) granulosissima* (Thomson) : Kerremans, 1903 : 101 – *Psiloptera granulosissima* (Thomson) : Théry, 1905 : 17, 50 – *Psiloptera (Polybothris) granulosissima* (Thomson) : Kerremans, 1911b : 382 – Obenberger, 1926a : 200 (variété de / variety of *zivetta*).

Holotype : MNHN.

synonyme / synonym : *auritarsis* (Kerremans, 1898)

Polybothris auritarsis Kerremans, 1898b : 78 – Alluaud, 1900b : 181 – *Psiloptera* (*Polybothris*) *auritarsis* (Kerremans) : Kerremans, 1903 : 97 – *Psiloptera auritarsis* (Kerremans) : Théry, 1905 : 17, 45 – *Psiloptera* (*Polybothris*) *auritarsis* (Kerremans) : Kerremans, 1911b : 382 – Obenberger, 1926a : 200 (variété de / variety of *zivetta*).



Apateum zivettum (Klug, 1833) (d'après/from Künckel d'Herculais in Grandidier, 1890).

Holotype : BMNH.

synonyme / synonym : *imbella* (Théry, 1912)

Polybothris zivetta var. *imbella* Théry, 1912 : 110 – Obenberger, 1926a : 200.

Holotype : MNHN.

• ***Apateum* (*Alampetis*) *zivettoides* (Fairmaire, 1889)**

Polybothris zivettoides Fairmaire, 1889a : vii – Kerremans, 1892a : 76 – Alluaud, 1900b : 192 – *Psiloptera* (*Polybothris*) *zivettoides* (Fairmaire) : Kerremans, 1903 : 97 – *Psiloptera zivettoides* (Fairmaire) : Théry, 1905 : 17, 45 – *Psiloptera* (*Polybothris*) *zivettoides* (Fairmaire) : Kerremans, 1911b : 381 – Marie et Lesne, 1917 : 103 – Obenberger, 1926a : 200.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

Genre / Genus *Polybothris* Spinola, 1837

Polybothris Spinola, 1837 : 115 [Espèce type / Type species : *Buprestis sumptuosa* Klug 1833 (dénomination ultérieure / subsequent designation : Thomson, 1878a : 315)] – Gistel, 1848 : 128 – Lacordaire, 1857 : 27 (synonyme de / synonym of *Psiloptera*) – Gemminger et Harold, 1869 : 1362 (genre valide / valid genus) – Saunders, 1871 : 22 (synonyme de / synonym of *Psiloptera*) – Thomson, 1878a : 315 ; 1878b : 35 (*Psiloptera*, 6^e Coupe) ; 1879 : 62 – Kerremans, 1885 : 130 ; 1892a : 68 ; 1893a : 106 – Alluaud, 1900b : 179 – Kerremans, 1903 : 97 – Casey 1909 : 71 – *Psiloptera* (*Polybothris*) Kerremans, 1911b : 314 (sous-genre de / subgenus of *Psiloptera*) – Obenberger, 1926a : 181 ; 1942b : 30 – Bellamy, 1985 : 416 – Cobos, 1986 : 12, 13, 21, 54 – Holyński, 1993a : 25 (sous-genre de / subgenus of *Psiloptera*) – Kurosawa, 1993 : 581 – Bellamy, 1998c : 374 ; 2003b : 47.

Polybothris Dejean, 1833 : 78 [Espèce type / Type species : indisponible / unavailable, aucune dénomination / no type species designated] ; 1836 : 88 – Mannerheim, 1837 : 59 – Bellamy, 1998c : 374.

Pseudophthalma Thomson, 1878a : 315 [Espèce type / Type species : *Pseudophthalma videns* Thomson, 1878 (dénomination originale / original designation)] – Kerremans, 1885 : 130 (synonyme de / synonym of *Polybothris*) ; 1892a : 68 (synonyme de / synonym of *Psiloptera*) ; 1903 : 90 (*Pseudophthalma*) – Obenberger, 1926a : 181 – Bellamy, 1985 : 416 – Kurosawa, 1993 : 581 – Bellamy, 2003b : 47.

Aplax Thomson, 1878a : 317 [Espèce type / Type species : *Aplax obscura* Thomson, 1878 (dénomination originale / original designation)] – Kerremans, 1885 : 130 (synonyme de / synonym of *Polybothris*) ; 1892a : 68 (synonyme de / synonym of *Psiloptera*) ; 1903 : 90 ; 1910 : 3 – Obenberger, 1926a : 182 – Bellamy, 1985 : 416 – Kurosawa, 1993 : 581 – Bellamy, 2003b : 47.

Psiloptera (*Polybothris*) : Théry, 1905 : 18, 54 (Division II, Section I) – Bellamy, 2003b : 47.

Psiloptera (*Polybothrys*) (sic) : Obenberger, 1917b : 278 – Bellamy, 2003b : 47.

Sous-genre / Subgenus *Amphisbeta* Thomson, 1878

Amphisbeta Thomson, 1878a : 316 [Espèce type / Type species : *Buprestis navicularis* Laporte de Castelnau et Gory, 1836 (dénomination originale / original designation)] ; 1878b : 35 (*Psiloptera*, 5^e Coupe) – Kerremans, 1885 : 130 (synonyme de / synonym of *Polybothris*) ; 1892a : 68 (synonyme de / synonym of *Psiloptera*) ; 1903 : 90 ; 1910 : 3 – Obenberger, 1926a : 181 ; 1942b : 33 – Bellamy, 1985 : 416 – Kurosawa, 1993 : 581 – Bellamy, 2003b : 47.

Psiloptera (*Polybothris* section II) : Théry, 1905 : 56 – Bellamy, 2003b : 47.

Sous-genre / Subgenus *Carcinias* Thomson, 1878

Carcinias Thomson, 1878a : 317 [Espèce type / Type species : *Buprestis scapularis* Guérin-Méneville 1832 (dénomination originale / original designation)] ; 1878b : 34 (*Psiloptera*, 3^e Coupe) – Kerremans, 1885 : 130 (synonyme de / synonym of *Polybothris*) ; 1892a : 68 (synonyme de / synonym of *Psiloptera*) ; 1903 : 90 ; 1910 : 3 – Obenberger, 1926a : 181 – Bellamy, 1985 : 416 – Kurosawa, 1993 : 581 – Bellamy, 2003b : 47.

Sous-genre / Subgenus *Cassidiobothris* Thomson, 1878

Cassidiobothris Thomson, 1878a : 318 [Espèce type / Type species : *Buprestis collicata* Guérin-Méneville 1832 (dénomination originale / original designation)] ; 1878b : 34 (*Apatea*, 2^e Division) – Kerremans, 1892c : 68 (synonyme de / synonym of *Psiloptera*) ; 1903 : 90 ; 1910 : 3 – Obenberger, 1926a : 182 – Bellamy, 1985 : 417 – Kurosawa, 1993 : 581 (synonyme de / synonym of *Polybothris* (*Cornelia*)) – Bellamy, 2003b : 47 (synonyme de / synonym of *Cornelia*).

Polybothris (*Cassidiobothris*) : Obenberger, 1942b:46.

Sous-genre / Subgenus *Coccinellopsis* Thomson, 1878

Coccinellopsis Thomson, 1878a : 318 [Espèce type / Type species : *Coccinellopsis orbicularis* Thomson, (dénomination originale / original designation)] ; 1878b : 35 (*Apatea*, 4^e Division) – Kerremans, 1885 : 130 (synonyme de / synonym of *Polybothris*) ; 1892a : 68 (synonyme de / synonym of *Psiloptera*) ; 1903 : 90 ; 1910 : 3 – Obenberger, 1926a : 182 ; 1942b : 40 – Bellamy, 1985 : 417 – Kurosawa, 1993 : 581 – Bellamy, 2003b : 47.

Sous-genre / Subgenus *Cornelia* Thomson, 1878

Cornelia Thomson, 1878a : 317 [Espèce type / Type species : *Polybothris pyropyga* Coquerel (dénomination originale / original designation)] – Kerremans, 1885 : 130

(synonyme de / synonym of *Polybothris*) ; 1892a : 68 (synonyme de / synonym of *Psiloptera*) ; 1903 : 90 ; 1910 : 3 – Obenberger, 1926a : 182 ; 1942b : 42 – Bellamy, 1985 : 416 – Kurosawa, 1993 : 581 – Bellamy, 2003b : 47.

Enharpya Thomson, 1878a : 316 [Espèce type / Type species : *Buprestis amorpha* Laporte de Castelnau et Gory (dénomination originale / original designation)] – Kerremans, 1885 : 130 (synonyme de / synonym of *Polybothris*) ; 1892a : 68 (synonyme de / synonym of *Psiloptera*) ; 1903 : 90 ; 1910 : 3 – Obenberger, 1926a : 181 – Bellamy, 1985 : 416 – Kurosawa, 1993 : 581 – Bellamy, 2003b : 47 (synonyme de / synonym of *Polybothris* (*Cornelia*)).

Pycnbothris Thomson, 1878a : 318 [Espèce type / Type species : *Buprestis mucronata* Laporte de Castelnau et Gory (dénomination originale / original designation)] – Kerremans, 1885 : 130 (synonyme de / synonym of *Polybothris*) ; 1892a : 68 (synonyme de / synonym of *Psiloptera*) ; 1903 : 90 ; 1910 : 3 – Obenberger, 1926a : 182 – Bellamy, 1985 : 417 – Kurosawa, 1993 : 581 – Bellamy, 2003b : 47 (synonyme de / synonym of *Polybothris* (*Cornelia*)).

Sous-genre / Subgenus *Erebodes* Thomson, 1878

Erebodes Thomson, 1878a : 317 [Espèce type / Type species : *Erebodes jansonii* Thomson, (dénomination originale / original designation)] – Kerremans, 1885 : 130 (synonyme de / synonym of *Polybothris*) ; 1892a : 68 (synonyme de / synonym of *Psiloptera*) ; 1903 : 90 ; 1910 : 3 – Obenberger, 1926a : 181 – Bellamy, 1985 : 416 – Kurosawa, 1993 : 581 – Bellamy, 2003b : 47.

Sous-genre / Subgenus *Laconides* Thomson, 1878

Laconides Thomson, 1878a : 316 [Espèce type / Type species : *Polybothris lelieurii* Buquet (dénomination originale / original designation)] – Kerremans, 1885 : 130 (synonyme de / synonym of *Polybothris*) ; 1892a : 68 (synonyme de / synonym of *Psiloptera*) ; 1903 : 90 ; 1910 : 3 – Obenberger, 1926a : 181 ; 1942b : 36 – Bellamy, 1985 : 416 – Kurosawa, 1993 : 581 – Bellamy, 2003b : 47.

Hemisobothris Thomson, 1878a : 315 [Espèce type / Type species : *Hemisobothris infraspiciens* Thomson, (dénomination originale / original designation)] – Kerremans, 1885 : 130 (synonyme de / synonym of *Polybothris*) ; 1903 : 90 ; 1910 : 2 – Obenberger, 1926a : 181 – Bellamy, 1985 : 416 – Kurosawa, 1993 : 581 – Bellamy, 2003b : 47 (synonyme de / synonym of *Polybothris* (*Laconides*)).

Sous-genre / Subgenus *Palaeobothris* Thomson, 1878

Palaeobothris Thomson, 1878a : 316 [Espèce type / Type species : *Buprestis ochreatea* Olivier (dénomination originale / original designation)] – Kerremans, 1885 : 130 (synonyme de / synonym of *Polybothris*) ; 1892a : 68 (synonyme de / synonym of *Psiloptera*) ; 1903 : 90 ; 1910 : 3 – Obenberger, 1926a : 181 – Bellamy, 1985 : 416 – Kurosawa, 1993 : 581 – Bellamy, 2003b : 48.

Sous-genre / Subgenus *Phobetodes* Thomson, 1878

Phobetodes Thomson, 1878a : 316 [Espèce type / Type species : *Buprestis dilatata* Olivier (dénomination originale / original designation)] ; 1878b : 36 (*Psiloptera*, 7^e Coupe) –

Kerremans, 1885 : 130 (synonyme de / synonym of *Polybothris*) ; 1892a : 68 (synonyme de / synonym of *Psiloptera*) ; 1903 : 90 ; 1910 : 3 – Obenberger, 1926a : 181 ; 1942b : 34 (clé / key) – Bellamy, 1985 : 416 – Kurosawa, 1993 : 581 – Bellamy, 2003b : 48.

• ***Polybothris (Amphisbeta) acripes* Guérin, 1925**

Guérin, 1925 : 41 – Obenberger, 1926a : 183.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris (s. g. indef.) adspersipennis* (Théry, 1905)**

Psiloptera adspersipennis Théry, 1905 : 19, 76 (Division II, Section V) – *Psiloptera (Polybothris) adspersipennis* (Théry) : Kerremans, 1911b : 461 – Obenberger, 1926a : 182.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR NORD : Diégo-Suarez / Antsiranana.

nom indisponible / unavailable name : *rutiliventris* Fairmaire

Fairmaire (*in litt.*) – *Psiloptera (Polybothris) rutiliventris* Fairmaire : Kerremans, 1911b : 461.

• ***Polybothris (s. g. indef.) aeneicollis* (Kerremans, 1911)**

Psiloptera (Polybothris) aeneicollis Kerremans, 1911b : 481 – Obenberger, 1926a : 182.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris (Cornelia) aeneomaculata* (Klug, 1833)**

Buprestis aeneomaculata Klug, 1833 : 61 ; 1834 : 149 – *Buprestis (Psiloptera) aeneomaculata* Klug Laporte de Castelnau et Gory, 1837 : 76, pl. 19, fig. 102 – *Polybothris aeneomaculata* (Klug) : Spinola, 1837 : 118 – Mannerheim, 1837 : 60 – *Psiloptera aeneomaculata* (Klug) : Lacordaire, 1857 : 29 – *Polybothris aeneomaculata* (Klug) : Gemminger et Harold, 1869 : 1362 – *Psiloptera aeneomaculata* (Klug) : Saunders, 1871 : 27 – *Pycnotheris aeneomaculata* (Klug) : Thomson, 1878a : 320 – *Cassidabothris aeneomaculata* (Klug) : 1878b : 34 – *Polybothris aeneomaculata* (Klug) : Künckel d'Herculais, 1890 : pl. 38, fig. 4 – Kerremans, 1892a : 68 – Brancsik, 1893 : 234 – Kerremans, 1894 : 347 – Alluaud, 1900b : 180 – Kerremans, 1903 : 100 – *Psiloptera (Polybothris) aeneomaculata* (Klug) : Théry, 1905 : 22, 100 (Division II, Section VI) – Kerremans, 1911b : 346, 556 – Obenberger, 1926a : 182 ; 1942b : 48 – Descarpentries, 1978 : 106.

Holotype : ZMHB.

Distribution : COMORES : Grande Comore / Ngazidja, Mohéli. MADAGASCAR EST : Pays Antsianaka. Perinet.

nom indisponible / unavailable name : *stellaris* Guérin-Ménéville

stellaris Guérin-Ménéville (*in litt.*) – *Psiloptera stellaris* (Guérin-Ménéville) : Lacordaire, 1857 : 29 – Gemminger et Harold, 1869 : 1362 (synonyme de / synonym of *aeneomaculata*) – Kerremans, 1892a : 68.

nom indisponible / unavailable name : *stigmatipennis* d'Urville

stigmatipennis d'Urville *in* Dejean, 1836 : 88 (*nom. nud.*) – *Polybothris stigmatipennis* (d'Urville) : Mannerheim, 1837 : 60 – Gemminger et Harold, 1869 : 1362 (synonyme de /

synonym of *aeneomaculata*) – Kerremans, 1892a : 68 – Obenberger, 1926a : 182 (*stigmatipennis*).

nom indisponible / unavailable name : var. *aeneomaculata* Künckel d'Herculais, 1890

Künckel d'Herculais, 1890 : pl. 43, fig. 5 – Kerremans, 1911d : 556 (synonyme de / synonym of *aeneomaculata*).

synonyme / synonym : *arge* Obenberger, 1942

Polybothris (Cornelia) aeneomaculata var. *arge* Obenberger, 1942b : 48.

Holotype : NMPC.

• ***Polybothris (Coccinellopsis) alboplagiata* (Laporte de Castelnau et Gory, 1836)**

Buprestis (Psiloptera) alboplagiata Laporte de Castelnau et Gory, 1836 : 63, pl. 16, fig. 81 – *Polybothris alboplagiata* (Laporte de Castelnau et Gory) : Gemminger et Harold, 1869 : 1362 – *Psiloptera alboplagiata* (Laporte de Castelnau et Gory) : Saunders, 1871 : 30 – *Coccinellopsis alboplagiata* (Laporte de Castelnau et Gory) : Thomson, 1878a : 320 – *Polybothris alboplagiata* (Laporte de Castelnau et Gory) : Kerremans, 1892a : 68 – Alluaud, 1900b : 180 – *Psiloptera (Polybothris) alboplagiata* (Laporte de Castelnau et Gory) : Kerremans, 1903 : 99 – *Psiloptera alboplagiata* (Laporte de Castelnau et Gory) : Théry, 1905 : 20, 81 (Division II, Section V) – *Psiloptera (Polybothris) alboplagiata* (Laporte de Castelnau et Gory) : Kerremans, 1911b : 492 – Obenberger, 1926a : 182.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR CENTRE : Fianarantsoa

synonyme / synonym : *caudalis* (Thomson, 1878)

Coccinellopsis caudalis Thomson, 1878a : 346 – *Polybothris caudalis* (Thomson) : Kerremans, 1885 : 130 ; 1892a : 69 – Alluaud, 1900b : 182 – *Psiloptera (Polybothris) caudalis* (Thomson) : Kerremans, 1903 : 99 – *Psiloptera caudalis* (Thomson) : Théry, 1905 : 20 (synonyme de / synonym of *alboplagiata*) – *Psiloptera (Polybothris) caudalis* (Thomson) : Kerremans, 1911b : 492 – Obenberger, 1926a : 182.

Holotype : MNHN.

synonyme / synonym : *plagiata* (Waterhouse, 1880)

Coccinellopsis plagiata Waterhouse, 1880 : 191 – *Polybothris plagiata* (Waterhouse) : Kerremans, 1885 : 131 ; 1892a : 69 – Alluaud, 1900b : 180 (synonyme de / synonym of *caudalis*) – *Psiloptera (Polybothris) plagiata* (Waterhouse) : Kerremans, 1903 : 99 – *Psiloptera plagiata* (Waterhouse) : Théry, 1905 : 20 (synonyme de / synonym of *alboplagiata*) – *Psiloptera (Polybothris) plagiata* (Waterhouse) : Kerremans, 1911b : 492 – Obenberger, 1926a : 182.

Holotype : BMNH.

• ***Polybothris (Cornelia) amorosa* Obenberger, 1942**

Obenberger, 1942b : 43.

Holotype : NMPC.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris (Cornelia) amorphia* (Laporte de Castelnau et Gory, 1836)**

Buprestis (Psiloptera) amorphia Laporte de Castelnau et Gory, 1836 : 51, pl. 13, fig. 65 – *Polybothris amorphia* (Laporte de Castelnau et Gory) : Gemminger et Harold, 1869 : 1362 – *Psiloptera amorphia* (Laporte de Castelnau et Gory) : Saunders, 1871 : 28 – *Enharpya amorphia* (Laporte de Castelnau et Gory) : Thomson, 1878a : 316 – Waterhouse 1880 : 180 – *Polybothris amorphia* (Laporte de Castelnau et Gory) : Künckel d'Herculais, 1890 : pl. 40, fig. 8 – Kerremans, 1892a : 68 – Alluaud, 1900b : 180 – *Psiloptera (Polybothris) amorphia* (Laporte de Castelnau et Gory) : Kerremans, 1903 : 98 – *Psiloptera amorphia* (Laporte de Castelnau et Gory) : Théry, 1905 : 19, 67 (Division II, Section IV) – *Psiloptera (Polybothris) amorphia* (Laporte de Castelnau et Gory) : Kerremans, 1911b : 414 – Obenberger, 1926a : 183.

Holotype : NMPC.

Distribution : MADAGASCAR.

synonyme / synonym : *chaotica* (Thomson, 1878)

Enharpya chaotica Thomson, 1878a : 328 – Waterhouse 1880 : 183 – *Polybothris chaotica* (Thomson) : Kerremans, 1885 : 130 ; 1892a : 68 – Alluaud, 1900b : 179 (synonyme de / synonym of *amorphia*) – *Psiloptera (Polybothris) chaotica* (Thomson) : Kerremans, 1903 : 98 – *Psiloptera chaotica* (Thomson) : Théry, 1905 : 19 (synonyme de / synonym of *amorphia*) – *Psiloptera (Polybothris) chaotica* (Thomson) : Kerremans, 1911b : 414 – Obenberger, 1926a : 183 (variété de / variety of *amorphia*).

Holotype : MNHN.

• ***Polybothris (s. g. indef.) ampliata* (Fairmaire, 1869)**

Psiloptera ampliata Fairmaire, 1869 : 210 – Saunders, 1871 : 27 – Kerremans, 1885 : 132 – *Polybothris ampliata* (Fairmaire) : Kerremans, 1892a : 68 – Alluaud, 1900b : 181 – *Psiloptera (Polybothris) ampliata* (Fairmaire) : Kerremans, 1903 : 100 – *Psiloptera ampliata* (Fairmaire) : Théry, 1905 : 22, 98 (Division II, Section VI) – *Psiloptera (Polybothris) ampliata* (Fairmaire) : Kerremans, 1911b : 540 – Marie et Lesne, 1917 : 103 – Obenberger, 1926a : 183.

Holotype : NMPC.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris (Cornelia) analis* (Chevrolat, 1833)**

Buprestis analis Chevrolat, 1833a : N° 60 – *Polybothris analis* (Chevrolat) : Coquerel 1852 : 315 – Gemminger et Harold, 1869 : 1362 – *Psiloptera analis* (Chevrolat) : Saunders, 1871 : 27 – *Cornelia analis* (Chevrolat) : Thomson, 1878a : 320 – *Apatea analis* (Chevrolat) : Thomson, 1878b : 34 – Waterhouse 1880 : 180 – *Polybothris analis* (Chevrolat) : Künckel d'Herculais, 1890 : pl. 39, fig. 7 – Kerremans, 1892a : 68 ; 1894 : 347 – Alluaud, 1900b : 181 – *Psiloptera (Polybothris) analis* (Chevrolat) : Kerremans, 1903 : 100 – *Psiloptera analis* (Chevrolat) : Théry, 1905 : 22, 98 (Division II, Section VI) – *Psiloptera (Polybothris) analis* (Chevrolat) : Kerremans, 1911b : 547 – Obenberger, 1926a : 183.

Holotype : BMNH.

Distribution : MADAGASCAR EST : Pays Antsianaka.

synonyme / synonym : *auromaculata* (Laporte de Castelnau et Gory, 1836)

Buprestis (*Psiloptera*) *auromaculata* Laporte de Castelnau et Gory, 1836 : 60, pl. 15, fig. 77 – *Polybothris auromaculata* (Laporte de Castelnau et Gory) : Gemminger et Harold, 1869 : 1362 (synonyme de / synonym of *analis*) – Saunders, 1871 : 27 – Thomson, 1878a : 320 – *Polybothris auromaculata* (Laporte de Castelnau et Gory) : Kerremans, 1892a : 68 – Alluaud, 1900b : 179 – *Psiloptera* (*Polybothris*) *auromaculata* (Laporte de Castelnau et Gory) : Kerremans, 1903 : 100 – *Psiloptera auromaculata* (Laporte de Castelnau et Gory) : Théry, 1905 : 22 – *Psiloptera* (*Polybothris*) *auromaculata* (Laporte de Castelnau et Gory) : Kerremans, 1911b : 547 – Obenberger, 1926a : 183.

Holotype : MNHN.

• ***Polybothris* (*s. g. indef.*) *angulicollis* (Kerremans, 1911)**

Psiloptera (*Polybothris*) *angulicollis* Kerremans, 1911b : 533 – Obenberger, 1926a : 183.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris* (*s. g. indef.*) *angulosa* (Théry, 1905)**

Psiloptera angulosa Théry, 1905 : 22, 99 (Division II, Section VI) – *Psiloptera* (*Polybothris*) *angulosa* (Théry) : Kerremans, 1911b : 557 – Obenberger, 1926a : 183.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR SUD : S.-P. de Betioky Sud.

• ***Polybothris* (*s. g. indef.*) *angusta* (Kerremans, 1911)**

Psiloptera (*Polybothris*) *angusta* Kerremans, 1911b : 360 – Obenberger, 1926a : 183.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris* (*s. g. indef.*) *anniae* (Obenberger, 1928)**

Psiloptera (*Polybothris*) *anniae* Obenberger, 1928b : 172, pl. III, fig. 5.

Holotype : NMPC-21014.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris* (*Carcinias*) *anulifer* (Waterhouse, 1880)**

Carcinias anulifer Waterhouse, 1880 : 184 – *Polybothris anulifer* (Waterhouse) : Kerremans, 1885 : 130 ; 1892a : 69 – Alluaud, 1900b : 181 (*annulifera*) – *Psiloptera* (*Polybothris*) *anulifer* (Waterhouse) : Kerremans, 1903 : 100 – *Psiloptera anulifer* (Waterhouse) : Théry, 1905 : 19, 68 (*annulifer*, Division II, Section IV) – *Psiloptera* (*Polybothris*) *anulifer* (Waterhouse) : Kerremans, 1911b : 406 – Obenberger, 1926a : 183.

Holotype : BMNH.

Distribution : MADAGASCAR CENTRE : Tananarive / Antananarivo.

• ***Polybothris* (*Cornelia*) *antiopa* Obenberger, 1942**

Obenberger, 1942b : 48.

Holotype : NMPC

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris (s. g. indef.) antiqua* (Kerremans, 1911)**

Psiloptera (Polybothris) antiqua Kerremans, 1911b : 351 – Obenberger, 1926a : 183.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris (Cornelia) artemis* Obenberger, 1942**

Obenberger, 1942b : 46.

Holotype : NMPC

Distribution : MADAGASCAR EST : Befotaka.

• ***Polybothris (s. g. indef.) auberti* Théry, 1912**

Théry, 1912 : 108 – Obenberger, 1926a : 184.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris (Laconides) aureopilosa* (Guérin-Méneville, 1832)**

Buprestis aureopilosa, 1832a : N° 13 – *Buprestis (Psiloptera) aureopilosa* Guérin-Méneville : Laporte de Castelnau et Gory, 1836 : 55 – *Polybothris aureopilosa* (Guérin-Méneville) : Gemminger et Harold, 1869 : 1362 – *Psiloptera aureopilosa* (Guérin-Méneville) : Saunders, 1871 : 28 – *Laconides aureopilosa* (Guérin-Méneville) : Thomson, 1878a : 326 – *Polybothris aureopilosa* (Guérin-Méneville) : Thomson, 1878b : 35 – Waterhouse 1880 : 180 – Künckel d'Herculais, 1890 : pl. 39, fig. 1 – Kerremans, 1892a : 69 ; 1900a : 292 – Alluaud, 1900b : 181 – *Psiloptera (Polybothris) aureopilosa* (Guérin-Méneville) : Kerremans, 1903 : 98 – *Psiloptera aureopilosa* (Guérin-Méneville) : Théry, 1905 : 18, 61 (Division II, Section III) – *Psiloptera (Polybothris) aureopilosa* (Guérin-Méneville) : Kerremans, 1911b : 433 – Obenberger, 1926a : 183.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

synonyme / synonym : *goudotii* (Klug, 1833)

Buprestis goudotii Klug, 1833 : 56, pl. 2, fig. 4 ; 1834 : 144 – *Polybothris goudotii* (Klug) : Gemminger et Harold, 1869 : 1362 (synonyme de / synonym of *aureopilosa*) – Thomson, 1878a : 319 ; 1878b : 35 – Künckel d'Herculais, 1890 : pl. 40, fig. 5 – Kerremans, 1892a : 69 ; 1900a : 292 – Alluaud, 1900b : 179 (synonyme de / synonym of *aureopilosa*) – *Psiloptera (Polybothris) goudotii* (Klug) : Kerremans, 1903 : 98 – *Psiloptera goudotii* (Klug) : Théry, 1905 : 18 (synonyme de / synonym of *aureopilosa*) – *Psiloptera (Polybothris) goudotii* (Klug) : Kerremans, 1911b : 433 – Obenberger, 1926a : 183.

Holotype : ZMHB.

• ***Polybothris (Coccinellopsis) auriventris* (Laporte de Castelnau et Gory, 1837)**
(Pl. 4, fig. 29-30)

Buprestis (Psiloptera) auriventris Laporte de Castelnau et Gory, 1837 : 68, pl. 17, fig. 89 – *Polybothris auriventris* (Laporte de Castelnau et Gory) : Gemminger et Harold, 1869 : 1362 – *Psiloptera auriventris* (Laporte de Castelnau et Gory) : Saunders, 1871 : 29 – *Coccinellopsis auriventris* (Laporte de Castelnau et Gory) : Thomson, 1878a : 320 ; 1878b : 35 – *Polybothris auriventris* (Laporte de Castelnau et Gory) : Künckel d'Herculais, 1890, pl. 41, fig. 6 – Kerremans, 1892a : 75 (synonyme de / synonym of *sparsuta*) ; 1894 : 341 – Alluaud, 1900b : 179 (synonyme de / synonym of *sparsuta*), 190 (synonyme de / synonym of *soror*) – Kerremans, 1900a : 292 (synonyme de / synonym of *sexfoveolata*) – *Psiloptera (Polybothris) auriventris* (Laporte de Castelnau et Gory) : Kerremans, 1903 : 99 – *Psiloptera auriventris* (Laporte de Castelnau et Gory) : Théry, 1905 : 19, 78 (Division II, Section V) – *Psiloptera (Polybothris) auriventris* (Laporte de Castelnau et Gory) : Kerremans, 1911b : 465 – Obenberger, 1926a : 183.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : Pays Antsianaka ; S.-P. de Moramanga, forêt de Sandrangato.

synonyme / synonym : *sexfoveolata* Spinola, 1837

Spinola, 1837 : 118 ; Gemminger et Harold, 1869 : 1362 (synonyme de / synonym of *auriventris*) – *Psiloptera sexfoveolata* (Spinola) : Saunders, 1871 : 29 – *Coccinellopsis sexfoveolata* (Spinola) : Thomson, 1878a : 320 – *Polybothris sexfoveolata* (Spinola) : Kerremans, 1892a : 75 (synonyme de / synonym of *sparsuta*) ; 1900a : 292 – Alluaud, 1900b : 180 (synonyme de / synonym of *sparsuta*), 190 (synonyme de / synonym of *soror*) – *Psiloptera (Polybothris) sexfoveolata* (Spinola) : Kerremans, 1903 : 99 – *Psiloptera sexfoveolata* (Spinola) : Théry, 1905 : 19 (synonyme de / synonym of *auriventris*) – *Psiloptera (Polybothris) sexfoveolata* (Spinola) : Kerremans, 1911b : 465 – Obenberger, 1926a : 183.

Holotype : MRSN.

• **sous-espèce / subspecies : *luteosignata* (Laporte de Castelnau et Gory, 1837)**

Buprestis (Psiloptera) luteosignata Laporte de Castelnau et Gory, 1837 : 69, pl. 17, fig. 90 – *Polybothris luteosignata* (Laporte de Castelnau et Gory) : Gemminger et Harold, 1869 : 1362 (synonyme de / synonym of *auriventris*) – *Psiloptera luteosignata* (Laporte de Castelnau et Gory) : Saunders, 1871 : 29 – *Coccinellopsis luteosignata* (Laporte de Castelnau et Gory) : Thomson, 1878a : 320 ; 1878b : 35 – *Polybothris luteosignata* (Laporte de Castelnau et Gory) : Kerremans, 1892a : 75 (synonyme de / synonym of *sparsuta*) ; 1900a : 292 (synonyme de / synonym of *sexfoveolata*) – Alluaud, 1900b : 179 (synonyme de / synonym of *sparsuta*), 190 (synonyme de / synonym of *soror*) – *Psiloptera (Polybothris) luteosignata* (Laporte de Castelnau et Gory) : Kerremans, 1903 : 99 – *Psiloptera luteosignata* (Laporte de Castelnau et Gory) : Théry, 1905 : 19 (synonyme de / synonym of *auriventris*) – *Psiloptera (Polybothris) luteosignata* (Laporte de Castelnau et Gory) : Kerremans, 1911b : 465 – Obenberger, 1926a : 183 (sous-espèce de / subspecies of *auriventris*).

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris (s. g. indef.) auroclavata* Coquerel, 1851**

Coquerel 1851 : 56 ; 1852 : 362 – Lacordaire, 1857 : 30 – Gemminger et Harold, 1869 : 1363 – *Psiloptera auroclavata* (Coquerel) : Saunders, 1871 : 29 – Kerremans, 1892a : 69 – Alluaud, 1900b : 181 – *Psiloptera (Polybothris) auroclavata* (Coquerel) : Kerremans, 1903 : 100 – *Psiloptera auroclavata* (Coquerel) : Théry, 1905 : 19, 69 (Division II, Section IV) – *Psiloptera (Polybothris) auroclavata* (Coquerel) : Kerremans, 1911b : 428 – Obenberger, 1926a : 183.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris (s. g. indef.) aurocyanea* Coquerel, 1848**

Coquerel 1848 : 276 – Lacordaire, 1857 : 30 – *Psiloptera aurocyanea* (Coquerel) : Gemminger et Harold, 1869 : 1363 – Künckel d'Herculais, 1890 : pl. 44, fig. 6 – Kerremans, 1892a : 69 – Alluaud, 1900b : 181 – *Psiloptera (Polybothris) aurocyanea* (Coquerel) : Kerremans, 1903 : 98 – *Psiloptera aurocyanea* (Coquerel) : Théry, 1905 : 18 (Division II, Section III), 63 (*aurocyanca*) – *Psiloptera (Polybothris) aurocyanea* (Coquerel) : Kerremans, 1911b : 436 – Obenberger, 1926a : 183.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris (Coccinellopsis) auropicta* (Laporte de Castelnau et Gory, 1836) (Pl. 4, fig. 31-32)**

Buprestis (Psiloptera) auropicta Laporte de Castelnau et Gory, 1836 : 61, pl. 15, fig. 79 – *Polybothris auropicta* (Laporte de Castelnau et Gory) : Gemminger et Harold, 1869 : 1363 – *Psiloptera auropicta* (Laporte de Castelnau et Gory) : Saunders, 1871 : 30 – *Coccinellopsis auropicta* (Laporte de Castelnau et Gory) : Thomson, 1878a : 320 ; 1878b : 35 – Waterhouse 1880 : 193 – *Polybothris auropicta* (Laporte de Castelnau et Gory) : Künckel d'Herculais, 1890 : pl. 42, fig. 1 – Kerremans, 1892a : 69 ; 1894 : 344 – Fairmaire, 1899b : 19 – Alluaud, 1900b : 181 – *Psiloptera (Polybothris) auropicta* (Laporte de Castelnau et Gory) : Kerremans, 1903 : 99 – *Psiloptera auropicta* (Laporte de Castelnau et Gory) : Théry, 1905 : 20, 85 (Division II, Section V) – *Psiloptera (Polybothris) auropicta* (Laporte de Castelnau et Gory) : Kerremans, 1911b : 507 – Marie et Lesne, 1917 : 97 – Obenberger, 1926a : 184 ; 1928b : 174.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : Perinet / Andasibe, forêt d'Analamazotra, Pays Antsianaka ; S.-P. de Moramanga, forêt de Sandrangato.

nom indisponible / unavailable name : *sulphurifera* Hope

Hope (*in litt.*) – Gemminger et Harold, 1869 : 1363 (synonyme de / synonym of *auropicta*) – Kerremans, 1892a : 69.

synonyme / synonym : *schoenherrii* Chevrolat, 1838

Chevrolat, 1838a : 67 – Gemminger et Harold, 1869 : 1363 (synonyme de / synonym of *auropicta*) – *Psiloptera schoenherri* (Chevrolat) : Saunders, 1871 : 30 – Thomson, 1878a : 320 – *Polybothris schoenherri* (Chevrolat) : Kerremans, 1892a : 69 – Alluaud, 1900b : 180 – *Psiloptera (Polybothris) schoenherri* (Chevrolat) : Kerremans, 1903 : 99 – *Psiloptera schoenherri* (Chevrolat) : Théry, 1905 : 20 – *Psiloptera (Polybothris) schoenherri* (Chevrolat) : Kerremans, 1911b : 507 – Obenberger, 1926a : 184.

Holotype : BMNH.

nom indisponible / unavailable name : *emarginaticollis* Künckel d'Herculais, 1890

Künckel d'Herculais, 1890 : pl. 42, fig. 2 – Kerremans, 1911b : 508 (synonyme de / synonym of *auropicta*) – Obenberger, 1926a : 184.

synonyme / synonym : *juno* (Théry, 1905)

Psiloptera auropicta var. *juno* Théry, 1905 : 20, 85 – *Psiloptera (Polybothris) juno* (Théry) : Kerremans, 1911b : 508 (synonyme de / synonym of *auropicta*) – Obenberger, 1926a : 183.

Holotype : MNHN.

• ***Polybothris* (s. g. indef.) *azurea* (Kerremans, 1903)**

Psiloptera (Polybothris) azurea Kerremans, 1903 : 98 – *Psiloptera azurea* (Kerremans) : Théry, 1905 : 18, 61 (Division II, Section III) – *Psiloptera (Polybothris) azurea* (Kerremans) : Kerremans, 1911b : 429 – Obenberger, 1926a : 184 – Griveaud, 1981 : pl. 25, fig. 53.

Holotype : BMNH.

Distribution : MADAGASCAR.


nom indisponible / unavailable name : *luculenta* Kolbe

Kolbe (*in litt.*) – *Psiloptera (Polybothris) luculenta* Kolbe : Kerremans, 1911b : 429 – Obenberger, 1926a : 184.

synonyme / synonym : *interundata* (Kerremans, 1911)

Psiloptera (Polybothris) interundata Kerremans, 1911b : 432 – Obenberger, 1926a : 191 – Théry, 1930d : 51 (synonyme de / synonym of *azurea*).

Holotype : MNHN.



Polybothris bernieri (Laporte de Castelnau et Gory, 1837)
(d'après/from Künckel d'Herculais in Grandidier, 1890).

• ***Polybothris* (s. g. indef.) *bernieri* (Laporte de Castelnau et Gory, 1837)**

Buprestis (Psiloptera) bernieri Laporte de Castelnau et Gory, 1837 : 65, pl. 16, fig. 84 – *Psiloptera bernieri* (Laporte de Castelnau et Gory) : Lacordaire, 1857 : 29 – *Polybothris bernieri* (Laporte de Castelnau et Gory) : Gemminger et Harold, 1869 : 1363 – *Psiloptera bernieri* (Laporte de Castelnau et Gory) : Saunders, 1871 : 29 – *Polybothris bernieri* (Laporte de Castelnau et Gory) : Künckel d'Herculais, 1890 : pl. 41, fig. 1 – Kerremans, 1892a : 69 – Alluaud, 1900b : 181 – *Psiloptera (Polybothris) bernieri* (Laporte de Castelnau et Gory) : Kerremans, 1903 : 99 – *Psiloptera bernieri* (Laporte de Castelnau et Gory) : Théry, 1905 : 19, 77 (Division II, Section V) – *Psiloptera (Polybothris) bernieri* (Laporte de Castelnau et Gory) : Kerremans, 1911b : 456 – Obenberger, 1926a : 184.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris* (s. g. indef.) *bilobata* Kerremans, 1894**

Kerremans, 1894 : 343 – Alluaud, 1900b : 181 – *Psiloptera* (*Polybothris*) *bilobata* (Kerremans) : Kerremans, 1903 : 99 – *Psiloptera bilobata* (Kerremans) : Théry, 1905 : 20, 82 (Division II, Section V) – *Psiloptera* (*Polybothris*) *bilobata* (Kerremans) : Kerremans, 1911b : 498, pl. 32, fig. 2 – Obenberger, 1926a : 184.

Holotype : BMNH.

Distribution : MADAGASCAR EST : forêt d'Isaka au N. O. de Fort-Dauphin / Tolanaro, Ampasimena.

synonyme / synonym : *alluaudi* Fairmaire, 1902

Fairmaire, 1902a : 77 – *Psiloptera alluaudi* (Fairmaire) : Théry, 1905 : 20 (synonyme de / synonym of *bilobata*) – *Psiloptera* (*Polybothris*) *alluaudi* (Fairmaire) : Kerremans, 1911b : 498 – Marie et Lesne, 1917 : 97 – Obenberger, 1926a : 184.

Holotype : MNHN.

synonyme / synonym : *frontalis* Fairmaire, 1903

Fairmaire, 1903a : 27 – *Psiloptera frontalis* (Fairmaire) : Théry, 1905 : 21, 93 (Division II, Section V) – *Psiloptera* (*Polybothris*) *frontalis* (Fairmaire) : Kerremans, 1911b : 498 (synonyme de / synonym of *bilobata*) – Marie et Lesne, 1917 : 97 – Obenberger, 1926a : 184.

Holotype : MNHN.

• ***Polybathris* (s. g. indef.) *bipustulata* Fairmaire, 1903**

Fairmaire, 1903c : 363 – *Psiloptera bipustulata* (Fairmaire) : Théry, 1905 : 19, 66 (Division II, Section III) – *Psiloptera* (*Polybothris*) *bipustulata* (Fairmaire) : Kerremans, 1911b : 420 – Obenberger, 1926a : 184.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybathris* (s. g. indef.) *blairi* Théry, 1930**

Théry, 1930b : 143.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : Fort-Dauphin / Tolanaro.

• ***Polybothris* (s. g. indef.) *blanchardi* (Kerremans, 1911)**

Psiloptera (*Polybothris*) *blanchardi* Kerremans, 1911b : 348 – Obenberger, 1926a : 184.


Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris* (s. g. indef.) *blucheaui* Fairmaire, 1899**

Fairmaire, 1899a : 110 – Alluaud, 1900b : 182 – *Psiloptera* (*Polybothris*) *blucheaui* (Fairmaire) : Kerremans, 1903 : 100 – *Psiloptera blucheaui* (Fairmaire) : Théry, 1905 : 21, 91 (Division II, Section V) – *Psiloptera* (*Polybothris*) *blucheaui* (Fairmaire) : Kerremans, 1911b : 478 – Marie et Lesne, 1917 : 97 – Obenberger, 1926a : 184 – Griveaud, 1981 : pl. 25, fig. 53.

Holotype : MNHN.



Polybothris bothripyga
(Fairmaire, 1869)
(d'après/from Künckel
d'Herculais in Grandidier,
1890).

Distribution : MADAGASCAR EST : Farafangana.

• ***Polybothris* (s. g. indef.) *bothripyga* (Fairmaire, 1869)**

Psiloptera bothripyga Fairmaire, 1869 : 222 – Saunders, 1871 : 29 – *Coccinellopsis bothripyga* (Fairmaire) : Thomson, 1878a : 320 ; 1878b : 35 (*bothripyga* sic) – *Psiloptera bothripyga* (Fairmaire) : Kerremans, 1885 : 132 – *Polybothris bothripyga* (Fairmaire) : Künckel d'Herculais, 1890 : pl. 43, fig. 11 (*botrypiga*) – Kerremans, 1892a : 69 – Alluaud, 1900b : 182 – *Psiloptera* (*Polybothris*) *bothripyga* (Fairmaire) : Kerremans, 1903 : 100 – *Psiloptera bothripyga* (Fairmaire) : Théry, 1905 : 22, 104 (Division II, Section VI) – *Psiloptera* (*Polybothris*) *bothripyga* (Fairmaire) : Kerremans, 1911b : 450 – Marie et Lesne, 1917 : 103 – Obenberger, 1926a : 184.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris* (*Cornelia*) *bourgoini* Obenberger, 1928**

Psiloptera (*Polybothris*) *bourgoini* Obenberger, 1928b : 173 ; 1942b : 43.

Holotype : NMPC.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris* (*Phobetodes*) *bouvieri* Théry, 1909**

Théry, 1909a : 445 – Obenberger, 1926a : 199 – Théry, 1928b : 130 – Obenberger, 1942b : 34.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR SUD : Ambovombe, région de l'Androy.

synonyme / synonym : *teuxia* (Obenberger, 1926)

Psiloptera teuxia Obenberger, 1926a : 199 (nom. superfl. de / for *bouvieri* Théry, 1909).

Holotype : NMPC.

• ***Polybothris* (*Cornelia*) *calypso* Obenberger, 1942**

Obenberger, 1942b : 45.

Holotype : NMPC.

Distribution : MADAGASCAR SAMBIRANO : haute vallée du Sambirano.

• ***Polybothris* (s. g. indef.) *carinifrons* (Kerremans, 1911)**

Psiloptera (*Polybothris*) *carinifrons* Kerremans, 1911b : 472 – Obenberger, 1926a : 184.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris (s. g. indef.) carreti* (Kerremans, 1903)**

Psiloptera (Polybothris) carreti Kerremans, 1903 : 99, pl. 1, fig. 12 – *Psiloptera carreti* (Kerremans) : Théry, 1905 : 21, 95 (Division II, Section VI) – *Psiloptera (Polybothris) carreti* (Kerremans) : Kerremans, 1911b : 528 – Obenberger, 1926a : 184.

Holotype : BMNH.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris (s. g. indef.) cassandra* (Obenberger, 1924)**

Psiloptera (Polybothris) cassandra Obenberger, 1924b : 66 ; 1926a : 184.

Holotype : NMPC-21013.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris (Coccinellopsis) cassidioides* (Guérin-Méneville, 1832)**

Buprestis cassidioides Guérin-Méneville, 1832g : N° 29 – *Buprestis (Psiloptera) cassidioides* Guérin-Méneville : Laporte de Castelnau et Gory, 1837 : 72, pl. 18, fig. 96 – *Polybothris cassidioides* (Guérin-Méneville) : Spinola, 1837 : 119 – *Polybothris cassidioides* (Guérin-Méneville) : Gemminger et Harold, 1869 : 1363 – *Psiloptera cassidioides* (Guérin-Méneville) : Saunders, 1871 : 29 – *Coccinellopsis cassidioides* (Guérin-Méneville) : Thomson, 1878a : 320 ; 1878b : 35 – *Polybothris cassidioides* (Guérin-Méneville) : Künckel d'Herculais, 1890 : pl. 42, fig. 5 – Kerremans, 1892a : 69 ; 1894 : 343 – Alluaud, 1900b : 182 – *Psiloptera (Polybothris) cassidioides* (Guérin-Méneville) : Kerremans, 1903 : 99 – *Psiloptera cassidioides* (Guérin-Méneville) : Théry, 1905 : 20, 82 (*cassidioides*, Division II, Section V) – *Psiloptera (Polybothris) cassidioides* (Guérin-Méneville) : Kerremans, 1911b : 470 – Obenberger, 1926a : 185 – Théry, 1927 : 255.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : Pays Antsianaka.

nom indisponible / unavailable name : *dalmasi* Petit, 1836

Petit, in Dejean, 1836 : 88 (*nom. nud.*) – Gemminger et Harold, 1869 : 1363 (synonyme de / synonym of *cassidioides*) – Thomson, 1878a : 320 (*dalmasi*) – Kerremans, 1892a : 69.

synonyme / synonym : *platessa* (Klug, 1833)

Buprestis platessa Klug, 1833 : 58, pl. 2, fig. 7 ; 1834 : 146 – *Polybothris platessa* (Klug) : Gemminger et Harold, 1869 : 1363 (synonyme de / synonym of *cassidioides*) – *Psiloptera platessa* (Klug) : Saunders, 1871 : 29 – *Coccinellopsis platessa* (Klug) : Thomson, 1878a : 320 – Kerremans, 1892a : 69 – Alluaud, 1900b : 180 (synonyme de / synonym of *cassidioides*) – *Psiloptera (Polybothris) platessa* (Klug) : Kerremans, 1903 : 99 – *Psiloptera platessa* (Klug) : Théry, 1905 : 20 (synonyme de / synonym of *cassidioides*) – *Psiloptera (Polybothris) platessa* (Klug) : Kerremans, 1911b : 470 – Obenberger, 1926a : 185.

Holotype : ZMHB.

synonyme / synonym : *chrysozona* Kerremans, 1898

Kerremans, 1898b : 81 – Alluaud, 1900b : 182 – *Psiloptera (Polybothris) chrysozona* (Kerremans) : Kerremans, 1903 : 99 – *Psiloptera chrysozona* (Kerremans) : Théry, 1905 : 20, 83 (Division II, Section V) – *Psiloptera (Polybothris) chrysozona* (Kerremans) : Kerremans, 1911b : 468 – Obenberger, 1926a : 185 – Théry, 1927 : 255 (synonyme de / synonym of *cassidioides*).

Holotype : BMNH.

• ***Polybothris (Coccinellopsis) caudatula* (Obenberger, 1917)**

Psiloptera caudatula Obenberger, 1917b : 282 – *Psiloptera (Polybothris) emarginata* var. *caudatula* Obenberger, 1924b : 65 ; 1926a : 188 – *Polybothris (Coccinellopsis) emarginata* var. *caudatula* (Obenberger) : 1942b : 41.

Holotype : NMPC

Distribution : MADAGASCAR EST : Pays Antsianaka.

synonyme / synonym : *emarginata* (Laporte de Castelnau et Gory, 1837)

Buprestis (Psiloptera) emarginata Laporte de Castelnau et Gory, 1837 : 71 (nom. *praeocc.* par / by *Buprestis emarginata* Olivier, 1790), pl. 18, fig. 94 – *Polybothris emarginata* (Laporte de Castelnau et Gory) : Gemminger et Harold, 1869 : 1363 – *Psiloptera emarginata* (Laporte de Castelnau et Gory) : Saunders, 1871 : 29 – *Coccinellopsis emarginata* (Laporte de Castelnau et Gory) : Thomson, 1878a : 320 ; 1878b : 35 – Waterhouse 1880 : 180 – *Polybothris emarginata* (Laporte de Castelnau et Gory) : Künckel d'Herculais, 1890 : pl. 41, fig. 7 – Kerremans, 1894 : 341 – Alluaud, 1900b : 184 – *Psiloptera (Polybothris) emarginata* (Laporte de Castelnau et Gory) : Kerremans, 1903 : 99 – *Psiloptera emarginata* (Laporte de Castelnau et Gory) : Théry, 1905 : 19, 77 (Division II, Section V) – *Psiloptera (Polybothris) emarginata* (Laporte de Castelnau et Gory) : Kerremans, 1911b : 475 – Obenberger, 1926a : 188 ; 1942b : 40.

Holotype : MNHN.

synonyme / synonym : *euchroa* (Obenberger, 1928)

Psiloptera (Polybothris) emarginata var. *euchroa* Obenberger, 1928b : 171.

Holotype : NMPC-21015.

synonyme / synonym : *lottei* Obenberger, 1942

Polybothris (Coccinellopsis) emarginata var. *lottei* Obenberger, 1942b : 41.

Holotype : NMPC-21021.

• ***Polybothris (s. g. indef.) ccierini* (Obenberger, 1928)**

Psiloptera (Polybothris) ccierini Obenberger, 1928b : 168, pl. III, fig. 3.

Holotype : NMPC-21009.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris (s. g. indef.) chalcochrysea* (Klug, 1833)**

Buprestis chalcochrysea Klug, 1833 : 60 ; 1834 : 148 – *Buprestis (Psiloptera) chalcochrysea* Klug : Laporte de Castelnau et Gory, 1837 : 76, pl. 19, fig. 101 – *Polybothris chalcochrysea* (Klug) : Spinola, 1837 : 118 – Mannerheim, 1837 : 60 – *Psiloptera chalcochrysea* (Klug) : Lacordaire, 1857 : 29 – *Polybothris chalcochrysea* (Klug) : Gemminger et Harold, 1869 : 1363 – *Psiloptera chalcochrysea* (Klug) : Saunders, 1871 : 30 – *Pycnbothris chalcochrysea* (Klug) : Thomson, 1878a : 320 – *Apatea chalcochrysea* (Klug) : 1878b : 34 – Künckel d'Herculais, 1890 : pl. 41, fig. 3 – *Polybothris chalcochrysea* (Klug) : Kerremans, 1892a : 69 ; 1894 : 347 – Fairmaire, 1899b : 19 – Alluaud, 1900b : 182 – *Psiloptera (Polybothris) chalcochrysea* (Klug) :

Kerremans, 1903 : 100 – *Psiloptera* Théry, 1905 : 22, 98 (Division II, Section VI) – Kerremans, 1911b : 543 – Marie et Lesne, 1917 : 97 – Obenberger, 1926a : 185.

Holotype : ZMHB.

Distribution : MADAGASCAR : de Tananarive / Antananarivo à Tamatave / Toamasina. MADAGASCAR EST : Pays Antsianaka.

nom indisponible / unavailable name : *chevrolati* Guérin-Méneville

Guérin-Méneville (*in litt.*) – Lacordaire, 1857 : 29 – Gemminger et Harold, 1869 : 1363 (synonyme de / synonym of *chalcochrysea*) – Kerremans, 1892a : 69.

nom indisponible / unavailable name : *madagascariensis* Dejean, 1833

Dejean, 1833 : 78 (*nom. nud.*) – Mannerheim, 1837 : 60 – Gemminger et Harold, 1869 : 1363 – *Polybothris madagascariensis* (Dejean) : Kerremans, 1892a : 69 – Obenberger, 1926a : 185.

nom indisponible / unavailable name : *klugi* Dejean, 1836

Dejean, 1836 : 88 (*nom. nud.*) – *Psiloptera chalcochrysea* var. *klugi* (Dejean) : Gemminger et Harold, 1869 : 1363 – *Polybothris klugi* (Dejean) : Kerremans, 1892a : 69.

• **sous-espèce / subspecies** : *humblotiana* (Descarpentries, 1978)

Psiloptera (Polybothris) chalcochrysea humblotiana Descarpentries, 1978 : 107.

Holotype ♂ MNHN.

Distribution : COMORES : Grande Comore / Ngazidja.

• ***Polybothris (Coccinellopsis) chalybeopicta* (Kerremans, 1898)**

Kerremans, 1898b : 80 – Alluaud, 1900b : 182 – *Psiloptera (Polybothris) chalybeopicta* (Kerremans) : Kerremans, 1903 : 99 – *Psiloptera chalybeopicta* (Kerremans) : Théry, 1905 : 19, 78 (Division II, Section V) – *Psiloptera (Polybothris) chalybeopicta* (Kerremans) : Kerremans, 1911b : 486 – Obenberger, 1926a : 185 ; 1942b : 41.

Holotype : BMNH.

Distribution : MADAGASCAR EST : Perinet.

synonyme / synonym : *hypsitropa* Obenberger, 1942

Polybothris (Coccinellopsis) chalybaeopicta var. *hypsitropa* Obenberger, 1942b : 41.

Holotype : NMPC.

• ***Polybothris (Laconides) chalybeoventralis* (Thomson, 1878)**

Laconides chalybeoventralis Thomson, 1878a : 326 – Waterhouse 1880 : 183 – *Polybothris chalybeoventralis* (Thomson) : Kerremans, 1885 : 130 ; 1892a : 69 – Alluaud, 1900b : 179 (synonyme de / synonym of *auropilosa*) – *Psiloptera (Polybothris) chalybeoventralis* (Thomson) : Kerremans, 1903 : 98 – *Psiloptera chalybeoventralis* (Thomson) : Théry, 1905 : 18 (synonyme de / synonym of *aureopilosa*) – *Psiloptera (Polybothris) chalybeoventralis* (Thomson) : Kerremans, 1911b : 433 – *Psiloptera (Polybothris) aureopilosa* var. *chalybaeovalis* Obenberger, 1926a : 183 ; 1942b : 36.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

synonyme / synonym : *pandus* (Théry, 1905)

Psiloptera pandus Théry, 1905 : 18, 60 (Division II, Section III) – *Psiloptera (Polybothris) pandus* (Théry) : Kerremans, 1911b : 438 (synonyme de / synonym of *chalybaeoventralis*) – Obenberger, 1926a : 194 (espèce valide / valid species) – *Polybothris (Laconides) chalybaeoventralis* var. *pandus* (Théry) : 1942b : 37.

Holotype : MNHN.

synonyme / synonym : *hildebrandti* (Kerremans, 1911)

Psiloptera (Polybothris) hildebrandti Kerremans, 1911b : 437, pl. 31, fig. 7 – Théry, 1930d : 51 (synonyme de / synonym of *chalybaeoventralis*) – Obenberger, 1926a : 190 (espèce valide / valid species) – *Polybothris (Laconides) chalybaeoventralis* var. *hildebrandti* (Kerremans) : 1942b : 36.

Holotype : MNHN.

synonyme / synonym : *cleo* Obenberger, 1942

Polybothris (Laconides) chalybaeoventralis var. *cleo* Obenberger, 1942b : 36.

Holotype : NMPC-21011

synonyme / synonym : *euterpe* Obenberger, 1942

Polybothris (Laconides) chalybaeoventralis var. *euterpe* Obenberger, 1942b : 36.

Holotype : NMPC-21010.

• ***Polybothris (s. g. indef.) chloe* (Obenberger, 1924)**

Psiloptera (Polybothris) chloe Obenberger, 1924b : 59, pl. III, fig. 1 ; 1926a : 185 ; 1928b : 169 – Théry, 1930d : 51.

Holotype : NMPC.

Distribution : MADAGASCAR CENTRE : Tananarive / Antananarivo.

• ***Polybothris (Coccinellopsis) circularis* (Laporte de Castelnau et Gory, 1837)**

Buprestis (Psiloptera) circularis Laporte de Castelnau et Gory, 1837 : 71, pl. 18, fig. 93 – *Polybothris circularis* (Laporte de Castelnau et Gory) : Gemminger et Harold, 1869 : 1363 – *Psiloptera circularis* (Laporte de Castelnau et Gory) : Saunders, 1871 : 29 – *Coccinellopsis circularis* (Laporte de Castelnau et Gory) : Thomson, 1878a : 320 ; 1878b : 35 – *Polybothris circularis* (Laporte de Castelnau et Gory) : Künckel d'Herculais, 1890 : pl. 42, fig. 4 – Kerremans, 1892a : 70 – Alluaud, 1900b : 182 – *Psiloptera (Polybothris) circularis* (Laporte de Castelnau et Gory) : Kerremans, 1903 : 99 – *Psiloptera circularis* (Laporte de Castelnau et Gory) : Théry, 1905 : 20, 83 (Division II, Section V) – *Psiloptera (Polybothris) circularis* (Laporte de Castelnau et Gory) : Kerremans, 1911b : 501 – Obenberger, 1926a : 185.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

erreur d'identification / misidentification : *rotundata* Künckel d'Herculais, 1890

Künckel d'Herculais, 1890 : pl. 42, fig. 3, nec *rotundata* (Guérin-Méneville, 1832) – Kerremans, 1911b : 501 – Obenberger, 1926a : 185.

• ***Polybothris (Coccinellopsis) circumum* (Thomson, 1878)**

Coccinellopsis circumum Thomson, 1878a : 345 – *Polybothris circumum* (Thomson) : Kerremans, 1885 : 130 ; 1892a : 70 – Alluaud, 1900b : 182 – *Psiloptera (Polybothris) circumum* (Thomson) : Kerremans, 1903 : 101 – *Psiloptera circumum* (Thomson) : Théry, 1905 : 21, 87 (Division II, Section V) – *Psiloptera (Polybothris) circumum* (Thomson) : Kerremans, 1911b : 451 – Obenberger, 1926a : 185.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris (s. g. indef.) circumdata* (Laporte de Castelnau et Gory, 1836)**

Buprestis (Psiloptera) circumdata Laporte de Castelnau et Gory, 1836 : 47, pl. 12, fig. 59 – *Psiloptera circumdata* (Laporte de Castelnau et Gory) : Lacordaire, 1857 : 29 – *Polybothris aeneomaculata* var. *circumdata* (Laporte de Castelnau et Gory) : Gemminger et Harold, 1869 : 1362 – *Psiloptera circumdata* (Laporte de Castelnau et Gory) : Saunders, 1871 : 27 – *Apateia circumdata* (Laporte de Castelnau et Gory) : Thomson, 1878b : 34 – *Polybothris circumdata* (Laporte de Castelnau et Gory) : Künckel d'Herculais, 1890 : pl. 38, fig. 5 – Kerremans, 1892a : 70 – Alluaud, 1900b : 182 – *Psiloptera (Polybothris) circumdata* (Laporte de Castelnau et Gory) : Kerremans, 1903 : 100 – *Psiloptera circumdata* (Laporte de Castelnau et Gory) : Théry, 1905 : 22, 100 (Division II, Section VI) – *Psiloptera (Polybothris) circumdata* (Laporte de Castelnau et Gory) : Kerremans, 1911b : 553 – Obenberger, 1926a : 185.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

synonyme / synonym : *simulatrix* (Thomson, 1878)

Alampetis simulatrix Thomson, 1878a : 336 – *Polybothris simulatrix* (Thomson) : Kerremans, 1885 : 131 ; 1892a : 75 ; 1900a : 292 (synonyme de / synonym of *circumdata*) – Alluaud, 1900b : 190 – *Psiloptera simulatrix* (Thomson) : Théry, 1905 : 22 – *Psiloptera (Polybothris) simulatrix* (Thomson) : Kerremans, 1911b : 553 – Obenberger, 1926a : 185.

Holotype : MNHN.

• ***Polybothris (Coccinellopsis) coccinella* (Laporte de Castelnau et Gory, 1837)**

Buprestis (Psiloptera) coccinella Laporte de Castelnau et Gory, 1837 : 70, pl. 17, fig. 92 – *Polybothris coccinella* (Laporte de Castelnau et Gory) : Gemminger et Harold, 1869 : 1363 – *Psiloptera coccinella* (Laporte de Castelnau et Gory) : Saunders, 1871 : 29 – *Coccinellopsis coccinella* (Laporte de Castelnau et Gory) : Thomson, 1878a : 320 ; 1878b : 35 – *Polybothris coccinella* (Laporte de Castelnau et Gory) : Künckel d'Herculais, 1890 : pl. 42, fig. 6 – Kerremans, 1892a : 70 ; 1894 : 343 – Alluaud, 1900b : 182 – *Psiloptera (Polybothris) coccinella* (Laporte de Castelnau et Gory) : Kerremans, 1903 : 99 – *Psiloptera coccinella* (Laporte de Castelnau et Gory) : Théry, 1905 : 20, 83 (Division II, Section V) – *Psiloptera (Polybothris) coccinella* (Laporte de Castelnau et Gory) : Kerremans, 1911b : 467 – Obenberger, 1926a : 185.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : Pays Antsianaka ; S.-P. de Moramanga, forêt de Sandrangato.

synonyme / synonym : *rotundipennis* Chevrolat, 1838

Chevrolat, 1838a : 68 – Gemminger et Harold, 1869 : 1363 (synonyme de / synonym of *coccinella*) – Saunders, 1871 : 29 – Thomson, 1878a : 320 – Kerremans, 1892a : 70 – Alluaud, 1900b : 180 – Kerremans, 1903 : 99 – Théry, 1905 : 20 (synonyme de / synonym of *coccinella*) – Kerremans, 1911b : 467 – Obenberger, 1926a : 185.

Holotype : BMNH.

• ***Polybothris* (s. g. indef.) *coelestis* (Kerremans, 1911)**

Psiloptera (*Polybothris*) *coelestis* Kerremans, 1911b : 444 – Obenberger, 1926a : 185.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris* (*Carcinias*) *coeruleipes* (Waterhouse, 1880)**

Carcinias coeruleipes Waterhouse, 1880 : 184 – *Polybothris coeruleipes* (Waterhouse) : Kerremans, 1885 : 130 ; 1892a : 70 – Alluaud, 1900b : 183 – *Psiloptera* (*Polybothris*) *coeruleipes* (Waterhouse) : Kerremans, 1903 : 101 – *Psiloptera coeruleipes* (Waterhouse) : Théry, 1905 : 19, 70 (Division II, Section IV) – *Psiloptera* (*Polybothris*) *coeruleipes* (Waterhouse) : Kerremans, 1911b : 405, pl. 31, fig. 4 – Obenberger, 1926a : 185 ; 1928b : 170, pl. III, fig. 2.

Holotype : BMNH.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris* (s. g. indef.) *coeruleiventris* (Kerremans, 1903)**

Psiloptera (*Polybothris*) *coeruleiventris* Kerremans, 1903 : 100 – *Psiloptera coeruleiventris* (Kerremans) : Théry, 1905 : 22, 98 (Division II, Section VI) – *Psiloptera* (*Polybothris*) *coeruleiventris* (Kerremans) : Kerremans, 1911b : 541 – Obenberger, 1926a : 186.

Holotype : BMNH.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris* (s. g. indef.) *coindardi* Fairmaire, 1902**

Fairmaire, 1902b : 347 – *Psiloptera coindardi* (Fairmaire) : Théry, 1905 : 22, 104 (Division II, Section VI) – *Psiloptera* (*Polybothris*) *coindardi* (Fairmaire) : Kerremans, 1911b : 542 (*coindardi*) – Marie et Lesne, 1917 : 97 – Obenberger, 1926a : 186.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : région de Fort-Dauphin / Tolanaro, Ampasimena, vallée d'Ambolo.

• ***Polybothris* (*Cassidiobothris*) *colliciata* (Guérin-Ménéville, 1832)**

Buprestis colliciata Guérin-Ménéville, 1832e : N° 27 – *Buprestis* (*Psiloptera*) *colliciata* Guérin-Ménéville : Laporte de Castelnau et Gory, 1836 : 59, pl. 15, fig. 76 – *Polybothris colliciata* (Guérin-Ménéville) : Mannerheim, 1837 : 59 – *Psiloptera colliciata* (Guérin-Ménéville) : Lacordaire, 1857 : 29 – *Polybothris colliciata* (Guérin-Ménéville) : Gemminger et Harold, 1869 : 1363 – *Psiloptera colliciata* (Guérin-Ménéville) : Saunders, 1871 : 27 – *Cassidiobothris colliciata* (Guérin-Ménéville) : Thomson, 1878a : 320 ; 1878b : 34 –

Waterhouse 1880 : 180 – *Polybothris colliciata* (Guérin-Ménéville) : Künckel d'Herculais, 1890 : pl. 41, fig. 4 – Kerremans, 1892a : 70 ; 1894 : 347 – Alluaud, 1900b : 183 – *Psiloptera (Polybothris) colliciata* (Guérin-Ménéville) : Kerremans, 1903 : 100 – *Psiloptera colliciata* (Guérin-Ménéville) : Théry, 1905 : 21, 86 (Division II, Section V) – *Psiloptera (Polybothris) colliciata* (Guérin-Ménéville) : Kerremans, 1911b : 545 – Obenberger, 1926a : 186 ; 1942b : 46.

Holotype : ISNB.

Distribution : MADAGASCAR EST : Pays Antsianaka.

nom indisponible / unavailable name : *quadrifoveolata* Dejean, 1836

Dejean, 1836 : 88 (*nom. nud.*) – Gemminger et Harold, 1869 : 1363 (synonyme de / synonym of *colliciata*) – Kerremans, 1892a : 70 – *Psiloptera (Polybothris) foveolata* Dejean, 1836 : Obenberger, 1926a : 186.

synonyme / synonym : *cassidea* (Klug, 1833)

Buprestis cassidea Klug, 1833 : 59 ; 1834 : 147 – *Polybothris cassidea* (Klug) : Spinola, 1837 : 118 – Mannerheim, 1837 : 59 – *Psiloptera cassidea* (Klug) : Lacordaire, 1857 : 29 – *Polybothris cassidea* (Klug) : Gemminger et Harold, 1869 : 1363 (synonyme de / synonym of *colliciata*) – *Psiloptera cassidea* (Klug) : Saunders, 1871 : 27 – Thomson, 1878a : 320 ; 1878b : 34 – *Polybothris cassidea* (Klug) : Kerremans, 1892a : 70 – Alluaud, 1900b : 179 – *Psiloptera (Polybothris) cassidea* (Klug) : Kerremans, 1903 : 100 – *Psiloptera cassidea* (Klug) : Théry, 1905 : 21 – *Psiloptera (Polybothris) cassidea* (Klug) : Kerremans, 1911b : 545 – Obenberger, 1926a : 186.

Holotype : ZMHB.

synonyme / synonym : *glyphoderes* Obenberger, 1942

Polybothris (Cassidiobothris) colliciata var. *glyphoderes* Obenberger, 1942b : 46.

Holotype : NMPC.

• ***Polybothris (Coccinellopsis) complanata* (Guérin-Ménéville, 1832)**

Buprestis complanata Guérin-Ménéville, 1832c : N° 25 – *Buprestis (Psiloptera) complanata* (Guérin-Ménéville) : Laporte de Castelnau et Gory, 1837 : 73, pl. 18, fig. 97 – *Polybothris complanata* (Guérin-Ménéville) : Spinola, 1837 : 119 – Gemminger et Harold, 1869 : 1363 – *Psiloptera complanata* (Guérin-Ménéville) : Saunders, 1871 : 30 – *Coccinellopsis complanata* (Guérin-Ménéville) : Thomson, 1878a : 320 ; 1878b : 35 (*camplanata*) – Waterhouse 1880 : 180 – *Polybothris complanata* (Guérin-Ménéville) : Kerremans, 1892a : 70 ; 1894 : 343 – Alluaud, 1900b : 183 – *Psiloptera (Polybothris) complanata* (Guérin-Ménéville) : Kerremans, 1903 : 99 – *Psiloptera complanata* (Guérin-Ménéville) : Théry, 1905 : 20, 80 (Division II, Section V) – *Psiloptera (Polybothris) complanata* (Guérin-Ménéville) : Kerremans, 1911b : 482 – Obenberger, 1926a : 186 – Théry, 1927 : 255.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : Pays Antsianaka. MADAGASCAR NORD : Diégo-Suarez / Antsiranana.

synonyme / synonym : *dejecta* (Waterhouse, 1882)

Pycnotheris dejecta Waterhouse, 1882 : 324 – *Psiloptera dejecta* (Waterhouse) – Théry, 1905 : 90 ; 1927 : 255 (synonyme de / synonym of *complanata*).

Holotype : BMNH.

synonyme / synonym : *pulchriventris* Fairmaire, 1904

Fairmaire, 1904 : 232 – Théry, 1905 : 28 – *Psiloptera (Polybothris) pulchriventris* (Fairmaire) : Kerremans, 1911b : 482 (synonyme de / synonym of *complanata*) – Marie et Lesne, 1917 : 98.

Holotype : MNHN.

synonyme / synonym : *nigrina* (Obenberger, 1924)

Psiloptera (Polybothris) complanata var. *nigrina* Obenberger, 1924b : 65 ; 1926a : 186.

Holotype : NMPC.

synonyme / synonym : *kyselyi* (Obenberger, 1924)

Psiloptera (Polybothris) complanata var. *kyselyi* Obenberger, 1924b : 65 ; 1926a : 186.

Holotype : NMPC.

synonyme / synonym : *aequalipennis* (Obenberger, 1924)

Psiloptera (Polybothris) complanata var. *aequalipennis* Obenberger, 1924b : 65 ; 1926a : 186.

Holotype : NMPC.

nom indisponible / unavailable name : *idae* (Obenberger, 1928)

Psiloptera (Polybothris) complanata ab. *idae* Obenberger, 1928b : 171 – Théry, 1930d : 51.

Holotype : NMPC.

• ***Polybothris (Coccinellopsis) cordiformis* (Thomson, 1878)**

Coccinellopsis cordiformis Thomson, 1878a : 346 – *Polybothris cordiformis* (Thomson) : Kerremans, 1885 : 130 ; 1892a : 70 – Alluaud, 1900b : 183 – *Psiloptera (Polybothris) cordiformis* (Thomson) : Kerremans, 1903 : 101 – *Psiloptera cordiformis* (Thomson) : Théry, 1905 : 21, 87 (Division II, Section V) – *Psiloptera (Polybothris) cordiformis* (Thomson) : Kerremans, 1911b : 459 – Obenberger, 1926a : 186.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris (s. g. indef.) corinna* (Obenberger, 1924)**

Psiloptera (Polybothris) corinna Obenberger, 1924b : 61 – *Psiloptera (Polybothris) corinna* Obenberger, 1926a : 186.

Holotype : NMPC-20919.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris (Cornelia) crassa* (Waterhouse, 1880)**

Pycnbothris crassa Waterhouse, 1880 : 196 – *Polybothris crassa* (Waterhouse) : Kerremans, 1885 : 130 ; 1892a : 70 – Alluaud, 1900b : 183 – *Psiloptera (Polybothris) crassa* (Waterhouse) : Kerremans, 1903 : 100 – *Psiloptera crassa* (Waterhouse) : Théry, 1905 : 21, 97 (Division II, Section VI) – *Psiloptera (Polybothris) crassa* (Waterhouse) : Kerremans, 1911b : 534, pl. 32, fig. 6 – Obenberger, 1926a : 186 ; 1942b : 42.

Holotype : BMNH.

Distribution : MADAGASCAR CENTRE : Tananarive / Antananarivo.

synonyme / synonym : *arion* Obenberger, 1942

Polybothris (Cornelia) crassa var. *arion* Obenberger, 1942b : 42.

Holotype : NMPC.

• ***Polybothris (Coccinelopsis) cribraria* (Waterhouse, 1880)**

Coccinelopsis cribraria Waterhouse, 1880 : 185 – *Polybothris cribraria* (Waterhouse) : Kerremans, 1892a : 70 (*cribraria*) ; 1894 : 341 – Alluaud, 1900b : 183 – *Psiloptera (Polybothris) cribraria* (Waterhouse) : Kerremans, 1903 : 98 – *Psiloptera cribraria* (Waterhouse) : Théry, 1905 : 19, 75 (*cribraria*, Division II, Section V) – *Psiloptera (Polybothris) cribraria* (Waterhouse) : Kerremans, 1911b : 448, pl. 32, fig. 1 – Obenberger, 1926a : 187 ; 1942b : 42.

Holotype : BMNH.

Distribution : MADAGASCAR NORD : Diégo-Suarez / Antsiranana.

synonyme / synonym : *ino* Obenberger, 1942

Polybothris (Coccinelopsis) cribraria var. *ino* Obenberger, 1942b : 42.

Holotype : NMPC.

• ***Polybothris (s. g. indef.) cribripennis* Théry, 1912**

Théry, 1912 : 116 – Obenberger, 1926a : 187.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris (s. g. indef.) cupreonitens* Kerremans, 1894**

Kerremans, 1894 : 346 – Alluaud, 1900b : 183 – Kerremans, 1903 : 100 – *Psiloptera cupreonitens* (Kerremans) : Théry, 1905 : 21, 96 (Division II, Section VI) – *Psiloptera (Polybothris) cupreonitens* (Kerremans) : Kerremans, 1911b : 528 – Obenberger, 1926a : 187 – Descarpentries, 1978 : 106.

Holotype : BMNH.

Distribution : COMORES : Mayotte.

• ***Polybothris (s. g. indef.) cupreovarica* Kerremans, 1894**

Kerremans, 1894 : 341 – Alluaud, 1900b : 184 – *Psiloptera (Polybothris) cupreovarica* (Kerremans) : Kerremans, 1903 : 99 – *Psiloptera cupreovarica* (Kerremans) : Théry, 1905 : 20, 79 (Division II, Section V) – *Psiloptera (Polybothris) cupreovarica* (Kerremans) : Kerremans, 1911b : 496 – Obenberger, 1926a : 187.

Holotype : BMNH.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris (Cornelia) cuprifera* (Laporte de Castelnau et Gory, 1836)**

Buprestis (Psiloptera) cuprifera Laporte de Castelnau et Gory, 1836 : 59, pl. 14, fig. 75 – *Polybothris cuprifera* (Laporte de Castelnau et Gory) : Gemminger et Harold, 1869 :

1363 – *Psiloptera cuprifera* (Laporte de Castelnau et Gory) : Saunders, 1871 : 30 – *Pycnotheris cuprifera* (Laporte de Castelnau et Gory) : Thomson, 1878a : 320 – Waterhouse 1880 : 195 – *Polybothris cuprifera* (Laporte de Castelnau et Gory) : Kerremans, 1892a : 70 – Alluaud, 1900b : 184 – *Psiloptera (Polybothris) cuprifera* (Laporte de Castelnau et Gory) : Kerremans, 1903 : 100 – *Psiloptera cuprifera* (Laporte de Castelnau et Gory) : Théry, 1905 : 21, 96 (Division II, Section VI) – *Psiloptera (Polybothris) cuprifera* (Laporte de Castelnau et Gory) : Kerremans, 1911b : 530 – Obenberger, 1926a : 187 ; 1942b : 42.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR CENTRE : Tananarive / Antananarivo, Fianarantsoa. MADAGASCAR EST : Perinet.

synonyme / synonym : *garnotii* Chevrolat, 1838

Chevrolat, 1838a : 67 – *Polybothris coccinella* var. *carnoti* (sic) (Chevrolat) : Gemminger et Harold, 1869 : 1363 (synonyme de / synonym of *coccinella*) – Saunders, 1871 : 30 (synonyme de / synonym of *mucronata*) – Thomson, 1878a : 320 (*carnotii* sic, synonyme de / synonym of *mucronata*) – Kerremans, 1892a : 71 ; 1900a : 291 (synonyme de / synonym of *cuprifera*) – Alluaud, 1900b : 185 – Kerremans, 1903 : 100 – *Psiloptera garnotii* (Chevrolat) : Théry, 1905 : 21 – *Psiloptera (Polybothris) garnotii* (Chevrolat) : Kerremans, 1911b : 530 – *Psiloptera (Polybothris) garnoti* (Chevrolat) : Obenberger, 1926a : 187 (synonyme de / synonym of *cuprifera*).

Holotype : BMNH.

synonyme / synonym : *obscura* (Thomson, 1878)

Pycnotheris obscura Thomson, 1878a : 341 – Waterhouse 1880 : 194 – *Polybothris obscura* (Thomson) : Kerremans, 1885 : 131 – Künckel d'Herculais, 1890 : pl. 43, fig. 6 – Kerremans, 1892a : 70 – Alluaud, 1900b : 180 (synonyme de / synonym of *cuprifera*) – Kerremans, 1903 : 100 – Théry, 1905 : 21 – *Psiloptera (Polybothris) obscura* (Thomson) : Kerremans, 1911b : 530 – Obenberger, 1926a : 187.

Holotype : MNHN.

synonyme / synonym : *adelpha* (Thomson, 1878)

Pycnotheris adelpha Thomson, 1878a : 342 – *Polybothris* Kerremans, 1885 : 130 ; 1892a : 68 ; 1900a : 291 (synonyme de / synonym of *cuprifera*) – Alluaud, 1900b : 179 (synonyme de / synonym of *cuprifera*) – Kerremans, 1903 : 100 – *Psiloptera adelpha* (Thomson) : Théry, 1905 : 21 – *Psiloptera (Polybothris) adelpha* (Thomson) : Kerremans, 1911b : 530 – Obenberger, 1926a : 187.

Holotype : MNHN.

nom indisponible / unavailable name : *cyaneoviridis* Künckel d'Herculais, 1890

Künckel d'Herculais, 1890 : pl. 43, fig. 2 – *Psiloptera (Polybothris)* Kerremans, 1911b : 530 (synonyme de / synonym of *cuprifera*) – Obenberger, 1926a : 187.

synonyme / synonym : *sikorai* Obenberger, 1942

Polybothris (Cornelia) cuprifera var. *sikorai* Obenberger, 1942b : 42.

Holotype : NMPC

• sous-espèce / subspecies : *ridens* (Obenberger, 1917)

Psiloptera (*Polybothrys*). *ridens* Obenberger, 1917b : 280 – *Psiloptera* (*Polybothris*) *ridens* Obenberger, 1924b : 65 ; 1926a : 187.

Holotype : NMPC.

Distribution : MADAGASCAR.

• *Polybothris* (*s. g. indef.*) *cyanella* (Obenberger, 1917)

Psiloptera (*Polybothrys*) *cyanella* Obenberger, 1917b : 281 ; 1926a : 187.

Holotype : NMPC-21022.

Distribution : MADAGASCAR.

• *Polybothris* (*s. g. indef.*) *cyclopyga* (Fairmaire, 1889)

Psiloptera *cyclopyga* Fairmaire, 1889a : viii – *Polybothris* Kerremans, 1892a : 70 – Alluaud, 1900b : 184 – Kerremans, 1903 : 100 – *Psiloptera* *cyclopyga* (Fairmaire) : Théry, 1905 : 21, 97 (Division II, Section VI) – *Psiloptera* (*Polybothris*) *cyclopyga* (Fairmaire) : Kerremans, 1911b : 532 – Marie et Lesne, 1917 : 103 – Obenberger, 1926a : 187.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• *Polybothris* (*s. g. indef.*) *darwini* Théry, 1912

Théry, 1912 : 114 – Obenberger, 1926a : 187.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• *Polybothris* (*Erebodes*) *deyrollei* (Thomson, 1878)

Erebodes *deyrollei* Thomson, 1878a : 331 – *Polybothris* *deyrollei* (Thomson) : Kerremans, 1885 : 130 ; 1892a : 71 – Alluaud, 1900b : 184 – Kerremans, 1903 : 101 – *Psiloptera* *deyrollei* (Thomson) : Théry, 1905 : 19, 70 (Division II, Section IV) – *Psiloptera* (*Polybothris*) *deyrollei* (Thomson) : Kerremans, 1911b : 403 – Obenberger, 1926a : 187.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• *Polybothris* (*s. g. indef.*) *diecki* (Théry, 1905)

Psiloptera (*Polybothris*) *diecki* Théry, 1905 : 22, 101 (Division II, Section VI), pl. II, fig. 11 – Kerremans, 1911b : 550 – Obenberger, 1926a : 188 – Descarpentries, 1979 : 106.

Holotype : MNHN.

Distribution : COMORES : Grande Comore / Ngazidja.

synonyme / synonym : *speculifera* (Kerremans, 1911)

Psiloptera (*Polybothris*) *speculifera* Kerremans, 1911b : 551 – Obenberger, 1926a : 198 – Descarpentries, 1978 : 106 (synonyme de / synonym of *diecki*).

Holotype : MNHN.

• ***Polybothris* (s. g. indef.) *diffinis* Kerremans, 1894**

Polybothris collicata var. *diffinis* Kerremans, 1894 : 347 ; 1900a : 292 – Alluaud, 1900b : 183 – *Psiloptera* (*Polybothris*) *diffinis* (Kerremans) : Kerremans, 1903 : 100 – *Psiloptera diffinis* (Kerremans) : Théry, 1905 : 21, 87 (Division II, Section V) – *Psiloptera* (*Polybothris*) *diffinis* (Kerremans) : Kerremans, 1911b : 546 – Obenberger, 1926a : 188.

Holotype : BMNH.

Distribution : MADAGASCAR EST : Pays Antsianaka.

• ***Polybothris* (*Phobetodes*) *dilatata* (Olivier, 1790)**

Buprestis dilatata Olivier, 1790a : 53 ; 1790b : N° 88 – Herbst, 1801 : 39 – Schönherr, 1817 : 253 – *Buprestis* (*Psiloptera*) *dilatata* Olivier : Laporte de Castelnau et Gory, 1836 : 54, pl. 13, fig. 68 – *Polycesta dilatata* (Olivier) : Chevrolat, 1838a : 56 – *Polybothris dilatata* (Olivier) : Gemminger et Harold, 1869 : 1363 – *Psiloptera dilatata* (Olivier) : Saunders, 1871 : 28 – *Phobetodes dilatata* (Olivier) : Thomson, 1878a : 319 ; 1878b : 36 – Künckel d'Herculais, 1890 : pl. 39, fig. 3 – *Polybothris dilatata* (Olivier) : Kerremans, 1892a : 71 – Alluaud, 1900b : 184 – *Psiloptera* (*Polybothris*) *dilatata* (Olivier) : Kerremans, 1903 : 98 – *Psiloptera dilatata* (Olivier) : Théry, 1905 : 18, 65 (Division II, Section III) – *Psiloptera* (*Polybothris*) Kerremans, 1911b : 415 – Obenberger, 1926a : 188 ; 1942b : 34.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris* (s. g. indef.) *diversicollis* (Kerremans, 1911)**

Psiloptera (*Polybothris*) *diversicollis* Kerremans, 1911b : 506 (nom. nov. de / for *Polybothris viridicollis* Kerremans, 1894) – Obenberger, 1926a : 188.

Distribution : MADAGASCAR NORD : Diégo-Suarez / Antsiranana.

synonyme / synonym : *viridicollis* Kerremans, 1894

Kerremans, 1894 : 344 (nom. praeocc. par / by *Polybothris viridicollis* Künckel d'Herculais, 1890, nom. superfl.) – Alluaud, 1900b : 192 – *Psiloptera* (*Polybothris*) *viridicollis* (Kerremans) : Kerremans, 1903 : 99 – *Psiloptera viridicollis* (Kerremans) : Théry, 1905 : 20, 84 (Division II, Section V) – *Psiloptera* (*Polybothris*) *viridicollis* (Kerremans) : Kerremans, 1911b : 506 – Obenberger, 1926a : 188.

Holotype : BMNH.

synonyme / synonym : *tchitcherini* (Obenberger, 1928)

Psiloptera sumptuosa var. *tchitcherini* Obenberger, 1928b : 168 – *Psiloptera sumptuosa* var. *tschitscherini* (sic) Obenberger : Théry, 1930d : 51 (synonyme de / synonym of *viridicollis*).

Holotype : NMPC.

• ***Polybothris* (*Laconides*) *dodone* Obenberger, 1942**

Obenberger, 1942b : 39.

Holotype : NMPC-21009.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris (s. g. indef.) dujardini* (Descarpentries, 1974)**

Psiloptera (Polybothris) Descarpentries, 1974 : 577, fig. 1, 3.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : route de Moramanga à Anosibe.

• ***Polybothris (Coccinelopsis) elliptica* (Waterhouse, 1880)**

Coccinelopsis elliptica Waterhouse, 1880 : 189 – *Polybothris elliptica* (Waterhouse) : Kerremans, 1885 : 130 ; 1892a : 71 – Alluaud, 1900b : 184 – *Psiloptera (Polybothris) elliptica* (Waterhouse) : Kerremans, 1903 : 101 – *Psiloptera elliptica* (Waterhouse) : Théry, 1905 : 21, 90 (Division II, Section V) – *Psiloptera (Polybothris) elliptica* (Waterhouse) : Kerremans, 1911b : 471 – Obenberger, 1926a : 188.

Holotype : BMNH.

Distribution : MADAGASCAR CENTRE : Fianarantsoa.

• ***Polybothris (Laconides) eros* Obenberger, 1942**

Obenberger, 1942b : 37.

Holotype : NMPC-21001.

Distribution : MADAGASCAR SAMBIRANO : haute vallée du Sambirano.

• ***Polybothris (s. g. indef.) errata* (Théry, 1905)**

Psiloptera errata Théry, 1905 : 22, 99 (Division II, Section VI) – *Psiloptera (Polybothris) errata* (Théry) : Kerremans, 1911b : 561 – Obenberger, 1926a : 188.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR SUD : région de l'Androy.

• ***Polybothris (s. g. indef.) eubrachea* (Obenberger, 1924)**

Psiloptera (Polybothris) eubrachea Obenberger, 1924b : 62 – *Psiloptera (Polybothris) eubrachea* Obenberger, 1926a : 188.

Holotype : NMPC-20916.

Distribution : MADAGASCAR NORD : Diégo-Suarez / Antsiranana.

synonyme / synonym : *diegana* (Obenberger, 1924)

Psiloptera (Polybothris) eubrachea var. *diegana* Obenberger, 1924b : 62 ; 1926a : 188.

Holotype : NMPC-20918.

• ***Polybothris (Phobetodes) expansicollis* (Fairmaire, 1869) (Pl. 5, fig. 35)**

Psiloptera (Polybothris) expansicollis Fairmaire, 1869 : 217 – Saunders, 1871 : 28 – *Polybothris expansicollis* (Fairmaire) : Kerremans, 1885 : 130 ; 1892a : 71 – Alluaud, 1900b : 185 – *Psiloptera (Polybothris) expansicollis* (Fairmaire) : Kerremans, 1903 : 98 – *Psiloptera expansicollis* (Fairmaire) : Théry, 1905 : 18, 64 (Division II, Section III) – *Psiloptera (Polybothris) expansicollis* (Fairmaire) : Kerremans, 1911b : 418 – Marie et Lesne, 1917 : 103 – Obenberger, 1926a : 189 ; 1942b : 36.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR SUD : S.-P. de Betioky Sud. Nord de Tuléar / Toliara, Ifaty.

synonyme / synonym : *elegans* Künckel d'Herculais, 1890

Künckel d'Herculais, 1890 : pl. 40, fig. 1 – *Psiloptera* (*Polybothris*) *elegans* Kerremans, 1911b : 418 (synonyme de / synonym of *expansicollis*) – Obenberger, 1926a : 189.

synonyme / synonym : *ignicollis* (Théry, 1905)

Psiloptera ignicollis Théry, 1905 : 65 – *Psiloptera* (*Polybothris*) *ignicollis* Théry : Kerremans, 1911b : 418 – Obenberger, 1926a : 189 – *Polybothris* (*Phobetodes*) *expansicollis* var. *ignicollis* (Théry) : 1942b : 36.

Holotype : MNHN.

• ***Polybothris* (s. g. indef.) *fairmairei* (Saunders, 1871)**

Psiloptera fairmairei Saunders, 1871 : 29 (nom. nov. de / for *Psiloptera oculicollis* Fairmaire, 1869) – *Polybothris fairmairei* (Saunders) : Kerremans, 1885 : 130 ; 1892a : 73 ; 1903 : 101 – *Psiloptera* Théry, 1905 : 22, 104 (Division II, Section VI) – *Psiloptera* (*Polybothris*) Kerremans, 1911b : 563 – Obenberger, 1926a : 189.

Distribution : MADAGASCAR.

synonyme / synonym : *oculicollis* (Fairmaire, 1869)

Psiloptera oculicollis Fairmaire, 1869 : 223 (nom. praeocc. par / by *Buprestis* (*Psiloptera*) *oculicollis* Laporte de Castelnau et Gory, 1836) – Saunders, 1871 : 29 – *Polybothris oculicollis* (Fairmaire) : Kerremans, 1885 : 131 ; 1892a : 73 – Alluaud, 1900b : 188 – Kerremans, 1903 : 101 – *Psiloptera oculicollis* (Fairmaire) : Théry, 1905 : 22, 104 – *Psiloptera* (*Polybothris*) *oculicollis* (Fairmaire) : Kerremans, 1911b : 563 – Marie et Lesne, 1917 : 103 – Obenberger, 1926a : 189.

Holotype : MNHN.

• ***Polybothris* (s. g. indef.) *faucherei* Théry, 1912**

Théry, 1912 : 115 – Obenberger, 1926a : 189.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : Pays Betsimisaraka.

• ***Polybothris* (s. g. indef.) *flesa* (Klug, 1833)**

Buprestis fleša Klug, 1833 : 57, pl. 2, fig. 10 ; 1834 : 145 – *Polybothris fleša* (Klug) : Spinola, 1837 : 119 – Mannerheim, 1837 : 59 – *Psiloptera fleša* (Klug) : Lacordaire, 1857 : 29 – *Polybothris flesus* (Klug) : Gemminger et Harold, 1869 : 1363 (synonyme de / synonym of *complanata*) – *Psiloptera fleša* (Klug) : Saunders, 1871 : 30 (synonyme de / synonym of *complanata*) – *Coccinellopsis fleša* (Klug) : Thomson, 1878a : 320 (synonyme de / synonym of *complanata*) – *Polybothris fleša* (Klug) : Kerremans, 1892a : 70 (synonyme de / synonym of *complanata*) – Alluaud, 1900b : 179 (synonyme de / synonym of *complanata*) – *Psiloptera* (*Polybothris*) *fleša* (Klug) : Kerremans, 1903 : 99 – *Psiloptera fleša* (Klug) : Théry, 1905 : 20, 80 (Division II, Section V) – *Psiloptera* (*Polybothris*) *fleša* (Klug) : Kerremans, 1911b : 483 – Obenberger, 1926a : 189.

Holotype : ZMHB.

Distribution : MADAGASCAR.

erreur d'identification / misidentification : *lamina* Spinola, 1837

Spinola, 1837 : 119 (nom. praeocc. par / by *lamina* Klug, 1833) – Mannerheim, 1837 : 59.

erreur d'identification / misidentification : *complanata* Künckel d'Herculais, 1890

Künckel d'Herculais, 1890 : pl. 42, fig. 11 (nom. praeocc. par / by *complanata* (Guérin-Méneville, 1832) – Kerremans, 1911b : 483 – Obenberger, 1926a : 189.

synonyme / synonym : *nigra* (Théry, 1905)

Psiloptera nigra Théry, 1905 : 20, 80 (Division II, Section V, nom. praeocc. par / by *nigra* Kerremans, 1898) – *Psiloptera (Polybothris) nigra* (Théry) : Kerremans, 1911b : 483 (synonyme de / synonym of *flesca*) – Obenberger, 1926a : 189.

Holotype : MNHN.

synonyme / synonym : *nigrior* (Obenberger, 1926)

Psiloptera nigrior Obenberger, 1926a : 189 (nom. nov. de / for *Psiloptera nigra* Théry, 1905).

• *Polybothris* (s. g. indef.) *francoiseae* Sainval, 2000

Sainval, 2000 : 339 (corrigendum : *francoisei* 2000 : 79)

Holotype : TNSC.

Distribution : MADAGASCAR SUD : Tulear / Toliara.

• *Polybothris* (*Erebodes*) *fulgidiventris* (Waterhouse, 1880)

Erebodes fulgidiventris Waterhouse, 1880 : 185 – *Polybothris fulgidiventris* (Waterhouse) : Kerremans, 1885 : 130 ; 1892a : 71 – Alluaud, 1900b : 185 – *Psiloptera (Polybothris) fulgidiventris* (Waterhouse) : Kerremans, 1903 : 101 – *Psiloptera fulgidiventris* (Waterhouse) : Théry, 1905 : 19, 71 (Division II, Section IV) – *Psiloptera (Polybothris) fulgidiventris* (Waterhouse) : Kerremans, 1911b : 401 – Obenberger, 1926a : 189.

Holotype : BMNH.

Distribution : MADAGASCAR CENTRE : Fianarantsoa.

• *Polybothris* (s. g. indef.) *geminata* (Kerremans, 1911)

Psiloptera (Polybothris) Kerremans, 1911b : 460 – Obenberger, 1926a : 189.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• *Polybothris* (*Phobetodes*) *goryi* (Guérin-Méneville, 1833) (Pl. 4, fig. 33-34)

Buprestis goryi Guérin-Méneville, 1833a : N° 62 – *Buprestis (Psiloptera) goryi* Guérin-Méneville : Laporte de Castelnau et Gory, 1836 : 52, pl. 13, fig. 66 – *Psiloptera goryi* (Guérin-Méneville) : Lacordaire, 1857 : 29 – *Polybothris goryi* (Guérin-Méneville) : Gemminger et Harold, 1869 : 1363 – *Psiloptera goryi* (Guérin-Méneville) : Saunders, 1871 : 28 – *Phobetodes goryi* (Guérin-Méneville) : Thomson, 1878a : 319 ; 1878b : 36 – Waterhouse 1880 : 180 – *Polybothris goryi* (Guérin-Méneville) : Künckel d'Herculais, 1890 : pl. 39, fig. 4 – Kerremans, 1892a : 71 ; 1894 : 341 – Alluaud, 1900b : 185 – *Psiloptera (Polybothris) goryi* (Guérin-Méneville) : Kerremans, 1903 : 98 – *Psiloptera goryi* (Guérin-Méneville) : Théry, 1905 : 18 (Division II, Section III), 65 (*goryi*) –

Psiloptera (Polybothris) goryi (Guérin-Ménéville) : Kerremans, 1911b : 416 – Obenberger, 1926a : 189 ; 1942b : 33.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : Pays Antsianaka.

synonyme / synonym : *zygaena* (Klug, 1833)

Buprestis zygaena Klug, 1833 : 55, pl. 2, fig. 3 ; 1834 : 143 – *Psiloptera zygaena* (Klug) : Lacordaire, 1857 : 29 – *Polybothris zygaena* (Klug) : Gemminger et Harold, 1869 : 1363 (synonyme de / synonym of *goryi*) – *Psiloptera zygaena* (Klug) : Saunders, 1871 : 28 – *Phobetodes zygaena* (Klug) : Thomson, 1878a : 319 ; 1878b : 36 – *Polybothris zygaena* (Klug) : Kerremans, 1892a : 71 – Alluaud, 1900b : 180 – *Psiloptera (Polybothris) zygaena* (Klug) : Kerremans, 1903 : 98 – Théry, 1905 : 18 (synonyme de / synonym of *goryi*) – *Psiloptera (Polybothris) zygaena* (Klug) : Kerremans, 1911b : 416 – Obenberger, 1926a : 189.

Holotype : ZMHB.

synonyme / synonym : *vespertilio* (Thomson, 1878)

Phobetodes vespertilio Thomson, 1878a : 327 – Waterhouse 1880 : 183 – *Polybothris vespertilio* (Thomson) : Kerremans, 1885 : 132 ; 1892a : 71 – Alluaud, 1900b : 180 (synonyme de / synonym of *goryi*) – *Psiloptera (Polybothris) vespertilio* (Thomson) : Kerremans, 1903 : 98 – *Psiloptera vespertilio* (Thomson) : Théry, 1905 : 18 (synonyme de / synonym of *goryi*) – *Psiloptera (Polybothris) vespertilio* (Thomson) : Kerremans, 1911b : 416 – Obenberger, 1926a : 189 – *Polybothris (Phobetodes) goryi* var. *vespertilio* (Thomson) : 1942b : 34.

Holotype : MNHN.

synonyme / synonym : *suspecta* (Théry, 1910)

Carcinias goryi var. *suspecta* Théry, 1910a : 2 – *Psiloptera (Polybothris) suspecta* (Théry) : Kerremans, 1911b : 417 – Obenberger, 1926a : 189 – *Polybothris (Phobetodes) goryi* var. *suspecta* (Théry) : 1942b : 34.

Holotype : MNHN.

synonyme / synonym : *paralispa* Obenberger, 1942

Polybothris (Phobetodes) goryi var. *paralispa* Obenberger, 1942b : 35.

Holotype : NMPC-20996.

synonyme / synonym : *opogona* Obenberger, 1942

Polybothris (Phobetodes) goryi var. *opogona* Obenberger, 1942b : 35.

Holotype : NMPC-20997.

synonyme / synonym : *galathaea* Obenberger, 1942

Polybothris (Phobetodes) goryi var. *galathaea* Obenberger, 1942b : 35.

Holotype : NMPC-20998.

synonyme / synonym : *calligastrea* Obenberger, 1942

Polybothris (Phobetodes) goryi var. *calligastrea* Obenberger, 1942b : 35.

Holotype : NMPC-20999.

• **sous-espèce / subspecies : *myops* (Gory, 1840)**

Buprestis myops Gory, 1840 : 98, pl. 17, fig. 96 – *Polybothris goryi* var. *myops* (Gory) : Gemminger et Harold, 1869 : 1363 – Saunders, 1871 : 28 – *Phobetodes myops* (Gory) : Thomson, 1878b : 36 – *Polybothris myops* (Gory) : Kerremans, 1892a : 71 – Alluaud, 1900b : 179 (synonyme de / synonym of *goryi*) – *Psiloptera (Polybothris) myops* (Gory) : Kerremans, 1903 : 98 – *Psiloptera myops* (Gory) : Théry, 1905 : 18 (synonyme de / synonym of *goryi*) – *Psiloptera (Polybothris) myops* (Gory) : Kerremans, 1911b : 416 – Obenberger, 1926a : 193 – *Polybothris (Phobetodes) goryi* var. *myops* (Gory) : 1942b : 35.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris (Phobetodes) grandidieri* (Théry, 1905)**

Psiloptera grandidieri Théry, 1905 : 18, 65 (Division II, Section III), pl. II, fig. 8 – *Psiloptera (Polybothris) grandidieri* (Théry) : Kerremans, 1911b : 19 – Obenberger, 1926a : 189 ; 1942b : 35.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

synonyme / synonym : *effractella* Obenberger, 1942

Polybothris (Phobetodes) grandidieri var. *effractella* Obenberger, 1942b : 35.

Holotype : NMPC-21000.

• ***Polybothris (s. g. indef.) gratiosa* (Kerremans, 1911)**

Psiloptera (Polybothris) gratiosa Kerremans, 1911b : 353, pl. 30, fig. 6 – Obenberger, 1926a : 190.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris (s. g. indef.) gueyraudii* Sainval, 2000**

Sainval, 2000 : 78.

Holotype : ISNB.

Distribution : COMORES : Mohéli.

• ***Polybothris (Cornelia) heliobia* Obenberger, 1942**

Obenberger, 1942b : 43.

Holotype : NMPC.

Distribution : MADAGASCAR EST : Befotaka. MADAGASCAR CENTRE : Mandritsara.

• ***Polybothris (s. g. indef.) heydeni* (Théry, 1905)**

Psiloptera heydeni Théry, 1905 : 22, 100 (Division II, Section VI), pl. II, fig. 10 – *Psiloptera (Polybothris) heydeni* (Théry) : Kerremans, 1911b : 555 – Obenberger, 1926a : 190.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : région de Fort-Dauphin / Taolanaro.

• ***Polybothris* (s. g. indef.) *hova* Künckel d'Herculais, 1890**

Künckel d'Herculais, 1890 : pl. 38, fig. 11 – *Psiloptera* (*Polybothris*) Kerremans, 1911b : 426 – Obenberger, 1926a : 190 (*hova*).

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris* (s. g. indef.) *humblotii* Fairmaire, 1893**

Fairmaire, 1893 : 523, 533 – Alluaud, 1900b : 185 – *Psiloptera* (*Psiloptera*) *humblotii* (Fairmaire) : Kerremans, 1903 : 101 – Théry, 1905 : 21, 91 (*humblotii*, Division II, Section V) – *Polybothris humbloti* (Fairmaire) : Marie et Lesne, 1917 : 97 – *Psiloptera* (*Psiloptera*) *humblotii* (Fairmaire) : Obenberger, 1926a : 190 – Descarpentries, 1978 : 107.

Holotype : MNHN.

Distribution : COMORES : Mayotte.

• ***Polybothris* (s. g. indef.) *hypocyana* Fairmaire, 1901**

Fairmaire, 1901 : 176 – *Psiloptera hypocyanea* (sic) (Fairmaire) : Théry, 1905 : 21, 92 (Division II, Section V) – *Psiloptera* (*Polybothris*) *hypocyanea* (Fairmaire) : Kerremans, 1911b : 515 – Marie et Lesne, 1917 : 97 – Obenberger, 1926a : 190.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris* (*Amphisbeta*) *impressipennis* (Laporte de Castelnau et Gory, 1836)**

Buprestis (*Psiloptera*) *impressipennis* Laporte de Castelnau et Gory, 1836 : 57, pl. 14, fig. 73 – *Polybothris impressipennis* (Laporte de Castelnau et Gory) : Gemminger et Harold, 1869 : 1363 – *Psiloptera impressipennis* (Laporte de Castelnau et Gory) : Saunders, 1871 : 28 – *Amphisbeta impressipennis* (Laporte de Castelnau et Gory) : Thomson, 1878a : 319 : 1878b : 35 – *Polybothris impressipennis* (Laporte de Castelnau et Gory) : Künckel d'Herculais, 1890 : pl. 38, fig. 3 – Kerremans, 1892a : 71 ; 1894 : 341 – Alluaud, 1900b : 185 – *Psiloptera* (*Polybothris*) *impressipennis* (Laporte de Castelnau et Gory) : Kerremans, 1903 : 97 – *Psiloptera impressipennis* (Laporte de Castelnau et Gory) : Théry, 1905 : 18, 57 (Division II, Section II) – *Psiloptera* (*Polybothris*) *impressipennis* (Laporte de Castelnau et Gory) : Kerremans, 1911b : 398 – Obenberger, 1926a : 190.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : Pays Antsianaka.

synonyme / synonym : *cuprea* (Théry, 1905)

Psiloptera cuprea Théry, 1905 : 18, 57 – *Psiloptera* (*Polybothris*) *cuprea* (Théry) : Kerremans, 1911b : 398 – *Psiloptera impressipennis* var. *cuprea* (Théry) : Obenberger, 1926a : 190 (variété de / variety of *impressipennis*).

Holotype : MNHN.

• ***Polybothris (s. g. indef.) incerticolor* (Kerremans, 1911)**

Psiloptera (Polybothris) incerticolor Kerremans, 1911b : 490 – *Polybothris incerticolor* Kerremans : Théry, 1912 : 116 – *Psiloptera (Polybothris) incerticolor* Kerremans : Obenberger, 1926a : 190.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : Betsimisaraka.

• ***Polybothris (s. g. indef.) inclyta* Fairmaire, 1902**

Fairmaire, 1902b : 346 – *Psiloptera inclytra* (Fairmaire) : Théry, 1905 : 19, 66 (Division II, Section III) – *Psiloptera (Polybothris) inclytra* (Fairmaire) : Kerremans, 1911b : 421 – Marie et Lesne, 1917 : 97 – Obenberger, 1926a : 190.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR OUEST : région de Maevatanana, cause de Hukaru (nec de l'Ankara).

• ***Polybothris (s. g. indef.) indigna* Fairmaire, 1899**

Fairmaire, 1899a : 113 – Alluaud, 1900b : 186 – *Psiloptera (Polybothris) indigna* (Fairmaire) : Kerremans, 1903 : 101 – *Psiloptera indigna* (Fairmaire) : Théry, 1905 : 22, 103 (Division II, Section VI) – *Psiloptera (Polybothris) indigna* (Fairmaire) : Kerremans, 1911b : 564 – Marie et Lesne, 1917 : 97 – Obenberger, 1926a : 190.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris (Coccinellopsis) indistincta* (Gory, 1840)**

Buprestis indistincta Gory, 1840 : 99, pl. 17, fig. 97 – *Polybothris indistincta* (Gory) : Gemminger et Harold, 1869 : 1363 – *Psiloptera indistincta* (Gory) : Saunders, 1871 : 30 – *Coccinellopsis indistincta* (Gory) : Thomson, 1878a : 320 ; 1878b : 35 – *Polybothris indistincta* (Gory) : Kerremans, 1892a : 72 – Alluaud, 1900b : 186 – *Psiloptera (Polybothris) indistincta* (Gory) : Kerremans, 1903 : 99 – *Psiloptera indistincta* (Gory) : Théry, 1905 : 20, 80 (Division II, Section V) – *Psiloptera (Polybothris) indistincta* (Gory) : Kerremans, 1911b : 480 – Obenberger, 1926a : 190.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris (s. g. indef.) indurata* (Obenberger, 1926)**


Psiloptera (Polybothris) indurata Obenberger, 1926a : 190 (nom. nov. de / for *Psiloptera inedita* Théry, 1912).

Distribution : MADAGASCAR.

synonyme / synonym : *inedita* Théry, 1912

Théry, 1912 : 115 (nom. praeocc. par / by *Buprestis (Psiloptera) inedita* Laporte de Castelnau et Gory, 1836) – Obenberger, 1926a : 190.

Holotype : MNHN.



Polybothris infrasplendens
(Thomson, 1878)
(d'après/from Künckel d'Herculais
in Grandidier, 1890).

• ***Polybothris (Laconides) infrasplendens* (Thomson, 1878)**

Hemisobothris infrasplendens Thomson, 1878a : 323 – *Polybothris infrasplendens* (Thomson) : Kerremans, 1885 : 130 – Künckel d'Herculais, 1890 : pl. 44, fig. 3 – Kerremans, 1892a : 72 – Alluaud, 1900b : 186 – *Psiloptera (Polybothris) infrasplendens* (Thomson) : Kerremans, 1903 : 98 – *Psiloptera infrasplendens* (Thomson) : Théry, 1905 : 18, 60 (Division II, Section III) – *Psiloptera (Polybothris) infrasplendens* (Thomson) : Kerremans, 1911b : 442 – Obenberger, 1926a : 190 ; 1942b : 38.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

synonyme / synonym : *alcyon* (Théry, 1905)

Psiloptera alcyon Théry, 1905 : 18, 59 (Division II, Section III), pl. I, fig. 6 – *Psiloptera (Polybothris) alcyon* (Théry) : Kerremans, 1911b : 442 – Obenberger, 1926a : 190 – *Polybothris (Laconides) infrasplendens* var. *alcyon* (Théry) : 1942b : 38.

Holotype : MNHN.

synonyme / synonym : *echidna* Obenberger, 1942

Polybothris (Laconides) infrasplendens var. *echidna* Obenberger, 1942b : 39.

Holotype : NMPC-21005.

• ***Polybothris (s. g. indef.) inornata* (Fairmaire, 1869)**

Psiloptera inornata Fairmaire, 1869 : 219 – Saunders, 1871 : 29 – Kerremans, 1885 : 133 ; 1892a : 72 (*Polybothris*) – Alluaud, 1900b : 186 – *Psiloptera (Polybothris) inornata* (Fairmaire) : Kerremans, 1903 : 101 – *Psiloptera inornata* (Fairmaire) : Théry, 1905 : 21, 91 (Division II, Section V) – *Psiloptera (Polybothris) inornata* (Fairmaire) : Kerremans, 1911b : 502 – Marie et Lesne, 1917 : 103 – Obenberger, 1926a : 191.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris (s. g. indef.) insignis* (Kerremans, 1899)**

Psiloptera insignis Kerremans, 1899 : 112 ; 1903 : 101 – Théry, 1905 : 22, 103 (Division II, Section VI) – *Psiloptera (Polybothris)* Kerremans, 1911b : 555 – Obenberger, 1926a : 191.

Holotype : BMNH.

Distribution : MADAGASCAR EST : Farafangana.

synonyme / synonym : *guttulata* Fairmaire, 1899

Fairmaire, 1899a : 112 – Alluaud, 1900b : 185 – *Psiloptera (Polybothris) guttulata* (Fairmaire) : Kerremans, 1903 : 101 – *Psiloptera guttulata* (Fairmaire) : Théry, 1905 : 22 (synonyme de / synonym of *guttulata*) – *Psiloptera (Polybothris) guttulata* (Fairmaire) : Kerremans, 1911b : 555 – Marie et Lesne, 1917 : 97 – Obenberger, 1926a : 191.

Holotype : MNHN.

• ***Polybothris (Erebodes) jansonii* (Thomson, 1878)**

Erebodes jansonii Thomson, 1878a : 330 – Waterhouse 1880 : 180 – *Polybothris jansonii* (Thomson) : Kerremans, 1885 : 130 ; 1892a : 72 – Alluaud, 1900b : 186 – *Psiloptera (Polybothris) jansonii* (Thomson) : Kerremans, 1903 : 101 – *Psiloptera jansonii* (Thomson) : Théry, 1905 : 19, 70 (Division II, Section IV) – *Psiloptera (Polybothris) jansonii* (Thomson) : Kerremans, 1911b : 401, pl. 31, fig. 3 – Obenberger, 1926a : 191 ; Théry, 1930d : 51.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris (Cornelia) klugii* (Laporte de Castelnau et Gory, 1837)**

Buprestis (Psiloptera) klugii Laporte de Castelnau et Gory, 1837 : 75, pl. 19, fig. 100 – *Polybothris* Gemminger et Harold, 1869 : 1363 – *Psiloptera* Saunders, 1871 : 30 – *Pycnbothris klugii* (Laporte de Castelnau et Gory) : Thomson, 1878a : 320 – *Apatea klugii* (Laporte de Castelnau et Gory) : 1878b : 34 – Waterhouse 1880 : 180 – *Polybothris klugii* (Laporte de Castelnau et Gory) : Künckel d'Herculais, 1890 : pl. 41, fig. 5 – Kerremans, 1892a : 72 ; 1894 : 347 – Alluaud, 1900b : 186 – *Psiloptera (Polybothris) klugii* (Laporte de Castelnau et Gory) : Kerremans, 1903 : 100 – *Psiloptera klugii* (Laporte de Castelnau et Gory) : Théry, 1905 : 22, 98 (Division II, Section VI) – *Psiloptera (Polybothris) klugii* (Laporte de Castelnau et Gory) : Kerremans, 1911b : 544 – Obenberger, 1926a : 191.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : Pays Antsianaka.

nom indisponible / unavailable name : *petiti* Dejean, 1836

Dejean, 1836 : 88 (*nom. nud.*) – *Polybothris* Gemminger et Harold, 1869 : 1363 (synonyme de / synonym of *klugii*) – Thomson, 1878a : 320 – Kerremans, 1892a : 72.

synonyme / synonym : *ancora* Spinola, 1837

Spinola, 1837 : 117 – Gemminger et Harold, 1869 : 1363 (synonyme de / synonym of *klugii*) – *Psiloptera ancora* (Spinola) : Saunders, 1871 : 30 – *Polybothris ancora* (Spinola) : Kerremans, 1892a : 72 – Alluaud, 1900b : 179 (synonyme de / synonym of *klugii*) – *Psiloptera (Polybothris) ancora* (Spinola) : Kerremans, 1903 : 100 ; 1911b : 544 – Obenberger, 1926a : 191.

Holotype : MRSN.

• ***Polybothris (s. g. indef.) lachesis* (Obenberger, 1924)**

Psiloptera (Polybothris) lachesis Obenberger, 1924b : 64 ; 1926a : 191.

Holotype : MRAC.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris (s. g. indef.) laeta* (Laporte de Castelnau et Gory, 1837)**

Buprestis (Halecia) laeta Laporte de Castelnau et Gory, 1837 : 111 – *Polybothris laeta* (Laporte de Castelnau et Gory) : Gemminger et Harold, 1869 : 1361 – *Psiloptera laeta* (Laporte de Castelnau et Gory) : Saunders, 1871 : 30 – *Polybothris laeta* (Laporte de Castelnau et Gory) : Kerremans, 1892a : 72 – Alluaud, 1900b : 186 – *Psiloptera laeta* (Laporte de Castelnau et Gory) : Kerremans, 1903 : 100 – *Psiloptera (Polybothris) laeta*

(Laporte de Castelnau et Gory) : Théry, 1905 : 22, 101 (Division II, Section VI) – Kerremans, 1911b : 346, 560 – Obenberger, 1926a : 191 – Descarpentries, 1978 : 105.

Holotype : MNHN.

Distribution : COMORES : Anjouan, Mayotte.

• ***Polybothris (Coccinellopsis) laeviventris* (Waterhouse, 1882)**

Coccinellopsis laeviventris Waterhouse, 1882e : 325 – *Polybothris laeviventris* (Waterhouse) : Kerremans, 1885 : 131 ; 1892a : 72 – Alluaud, 1900b : 186 – *Psiloptera (Polybothris) laeviventris* (Waterhouse) : Kerremans, 1903 : 101 – *Psiloptera laeviventris* (Waterhouse) : Théry, 1905 : 21, 87 (Division II, Section V) – *Psiloptera (Polybothris) laeviventris* (Waterhouse) : Kerremans, 1911b : 455 – Obenberger, 1926a : 191.

Holotype : BMNH.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris (s. g. indef.) lafertei* (Gory, 1840)**

Buprestis lafertei Gory, 1840 : 102, pl. 18, fig. 99 – *Polybothris lafertei* (Gory) : Gemminger et Harold, 1869 : 1363 – *Psiloptera lafertei* (Gory) : Saunders, 1871 : 29 – *Coccinellopsis lafertei* (Gory) : Thomson, 1878a : 320 – Waterhouse 1880 : 186 – *Polybothris lafertei* (Gory) : Künckel d'Herculais, 1890 : pl. 41, fig. 9 – Kerremans, 1892a : 72 – Alluaud, 1900b : 186 – *Psiloptera (Polybothris) lafertei* (Gory) : Kerremans, 1903 : 101 – *Psiloptera lafertei* (Gory) : Théry, 1905 : 19, 76 (Division II, Section V) – *Psiloptera (Polybothris) lafertei* (Gory) : Kerremans, 1911b : 462 (*lafertaei*) – Obenberger, 1926a : 191.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris (Coccinellopsis) lamina* (Klug, 1833)**

Buprestis lamina Klug, 1833 : 56, pl. 2, fig. 8 ; 1834 : 144 – *Buprestis (Psiloptera) lamina* Klug : Laporte de Castelnau et Gory, 1837 : 72, pl. 18, fig. 95 – *Polybothris lamina* (Klug) : Gemminger et Harold, 1869 : 1363 – *Psiloptera lamina* (Klug) : Saunders, 1871 : 29 – *Coccinellopsis lamina* (Klug) : Thomson, 1878a : 320 ; 1878b : 35 – *Polybothris lamina* (Klug) : Künckel d'Herculais, 1890 : pl. 42, fig. 7 – Kerremans, 1892a : 72 ; 1894 : 341 – Alluaud, 1900b : 186 – *Psiloptera (Polybothris) lamina* (Klug) : Kerremans, 1903 : 99 – *Psiloptera lamina* (Klug) : Théry, 1905 : 20, 81 (Division II, Section V) – *Psiloptera (Polybothris) lamina* (Klug) : Kerremans, 1911b : 495 – Obenberger, 1926a : 191.

Holotype : ZMHB.

Distribution : MADAGASCAR EST : Pays Antsianaka ; S.-P. de Moramanga, forêt de Sandrangato.

• ***Polybothris (s. g. indef.) laportedeana* Obenberger, 1942**

Obenberger, 1942b : 36 (nom. nov. de / for *Buprestis (Psiloptera) aureopilosa* Laporte de Castelnau et Gory, 1836).

Distribution : MADAGASCAR.

synonyme / synonym : *aureopilosa* (Laporte de Castelnau et Gory, 1836)

Buprestis (Psiloptera) aureopilosa Laporte de Castelnau et Gory, 1836 : 55 (nom. praecocc. par / by *Buprestis aureopilosa* Guérin-Méneville, 1832), pl. 14, fig. 70 – Obenberger, 1942b : 36.

Holotype : MNHN.

• ***Polybothris (Coccinelopsis) lateralis* (Waterhouse, 1880)**

Coccinelopsis lateralis Waterhouse, 1880 : 186 – *Polybothris lateralis* (Waterhouse) : Kerremans, 1885 : 131 ; 1892a : 72 – Alluaud, 1900b : 186 – *Psiloptera (Polybothris) lateralis* (Waterhouse) : Kerremans, 1903 : 102 – *Psiloptera lateralis* (Waterhouse) : Théry, 1905 : 21, 87 (Division II, Section V) – *Psiloptera (Polybothris) lateralis* (Waterhouse) : Kerremans, 1911b : 488 – Obenberger, 1926a : 191 – Théry, 1927 : 255.

Holotype : BMNH.

Distribution : MADAGASCAR EST : Farafangana. MADAGASCAR CENTRE : Fianarantsoa.

synonyme / synonym : ***kerremansi* Fairmaire, 1899**

Fairmaire, 1899a : 110 – Alluaud, 1900b : 186 – Kerremans, 1903 : 99 – *Psiloptera kerremansi* (Fairmaire) : Théry, 1905 : 20, 81 (Division II, Section V) – *Psiloptera (Polybothris) kerremansi* (Fairmaire) : Kerremans, 1911b : 487 – Marie et Lesne, 1917 : 97 – Obenberger, 1926a : 191 – Théry, 1927 : 255 (synonyme de / synonym of *lateralis*).

Holotype : MNHN.

synonyme / synonym : ***tetrops* (Fairmaire, 1869)**

Psiloptera tetrops Fairmaire, 1869 : 218 – Saunders, 1871 : 27 – Kerremans, 1885 : 134 – *Polybothris tetrops* (Fairmaire) : 1892a : 76 – Alluaud, 1900b : 191 – Kerremans, 1903 : 102 – *Psiloptera tetrops* (Fairmaire) : Théry, 1905 : 20, 81 (Division II, Section V) – *Psiloptera (Polybothris) tetrops* (Fairmaire) : Kerremans, 1911b : 485 – Marie et Lesne, 1917 : 103 – Obenberger, 1926a : 199 – Théry, 1927 : 255 (synonyme de / synonym of *lateralis*).

Holotype : MNHN.

• ***Polybothris (s. g. indef.) laticollis* (Kerremans, 1903)**

Psiloptera laticollis Kerremans, 1903 : 98 – Théry, 1905 : 18, 63 (Division II, Section III) – *Psiloptera (Polybothris) laticollis* (Kerremans) : Kerremans, 1911b : 435 – Obenberger, 1926a : 191.

Holotype : BMNH.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris (s. g. indef.) latissima* Meyer-Darcis, 1906**

Meyer-Darcis 1906 : 36 – Obenberger, 1926a : 191.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris (s. g. indef.) lelieurii* Buquet, 1854**

Buquet, 1854 : 75 – *Polybothris lelieurii* (Buquet) : Gemminger et Harold, 1869 : 1363 – *Psiloptera lelieurii* (Buquet) : Saunders, 1871 : 28 – *Laconides lelieuri* (Buquet) : Thomson, 1878a : 319 – *Polybothris lelieurii* (Buquet) : 1878b : 35 – Künckel d'Herculais, 1890 :

pl. 40, fig. 4 – Kerremans, 1892a : 72 – Alluaud, 1900b : 186 – *Psiloptera (Polybothris) lelieurii* (Buquet) : Kerremans, 1903 : 98 – *Psiloptera lelieurii* (Buquet) : Théry, 1905 : 18, 64 (Division II, Section III) – *Psiloptera (Polybothris) lelieurii* (Buquet) : Kerremans, 1911b : 421 – Obenberger, 1926a : 191.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

synonyme / synonym : *capnodiformis* (Kerremans, 1899)

Psiloptera capnodiformis Kerremans, 1899 : 260 – Alluaud, 1900b : 182 – *Psiloptera (Polybothris) capnodiformis* (Kerremans) : Kerremans, 1903 : 98 – *Psiloptera capnodiformis* (Kerremans) : Théry, 1905 : 18 (synonyme de / synonym of *lelieurii*) – *Psiloptera (Polybothris) capnodiformis* (Kerremans) : Kerremans, 1911b : 421 – Marie et Lesne, 1917 : 97 – Obenberger, 1926a : 192.

Holotype : BMNH.

synonyme / synonym : *confinis* (Théry, 1905)

Psiloptera lelieurii var. *confinis* (Théry) 1905 : 18, 64 (*nom. praeocc.* Kerremans, 1898) – *Psiloptera (Polybothris) confinis* (Théry) : Kerremans, 1911b : 421 – Obenberger, 1926a : 192.

Holotype : MNHN.

• ***Polybothris (Coccinellopsis) lepetitii* (Gory, 1840)**

Buprestis lepetitii Gory, 1840 : 103, pl. 18, fig. 100 – *Polybothris lepetitii* (Gory) : Gemminger et Harold, 1869 : 1363 – *Psiloptera lepetitii* (Gory) : Saunders, 1871 : 29 – *Coccinellopsis lepetitii* (Gory) : Thomson, 1878a : 320 ; 1878b : 35 – *Polybothris lepetitii* (Gory) : Kerremans, 1892a : 72 – Alluaud, 1900b : 187 – *Psiloptera (Polybothris) lepetitii* (Gory) : Kerremans, 1903 : 99 – *Psiloptera lepetitii* (Gory) : Théry, 1905 : 20, 81 (Division II, Section V) – *Psiloptera (Polybothris) lepetitii* (Gory) : Kerremans, 1911b : 477 – Obenberger, 1926a : 192 ; 1942b : 41 – Bellamy, 1999 : 5 (authorship note).

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

synonyme / synonym : *anthracicolor* Obenberger, 1942

Polybothris (Coccinellopsis) lepetitii var. *anthracicolor* Obenberger, 1942b : 41.

Holotype : NMPC.

• ***Polybothris (s. g. indef.) lesnei* Théry, 1926**

Théry, 1926 : 127, fig. 4.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : Befotaka.

• ***Polybothris (s. g. indef.) linearis* (Kerremans, 1911)**

Psiloptera (Polybothris) linearis Kerremans, 1911b : 534 – Obenberger, 1926a : 192.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris* (s. g. indef.) *luteopicta* (Kerremans, 1900)**

Psiloptera luteopicta Kerremans, 1900a : 293 ; 1903 : 100 – Théry, 1905 : 22, 100 (Division II, Section VI) – *Psiloptera (Polybothris) luteopicta* (Kerremans) : Kerremans, 1911b : 552 – Obenberger, 1926a : 192.

Holotype : BMNH.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris* (s. g. indef.) *maculiventris* (Laporte de Castelnau et Gory, 1837)**

Buprestis (Psiloptera) maculiventris Laporte de Castelnau et Gory, 1837 : 67, pl. 17, fig. 87 – *Polybothris maculiventris* (Laporte de Castelnau et Gory) : Gemminger et Harold, 1869 : 1363 – *Psiloptera maculiventris* (Laporte de Castelnau et Gory) : Saunders, 1871 : 29 – *Polybothris maculiventris* (Laporte de Castelnau et Gory) : Künckel d'Herculais, 1890 : pl. 41, fig. 2 – Kerremans, 1892a : 72 – Alluaud, 1900b : 187 – *Psiloptera (Polybothris) maculiventris* (Laporte de Castelnau et Gory) : Kerremans, 1903 : 99 – *Psiloptera maculiventris* (Laporte de Castelnau et Gory) : Théry, 1905 : 19, 76 (Division II, Section V) – *Psiloptera (Polybothris) maculiventris* (Laporte de Castelnau et Gory) : Kerremans, 1911b : 458 – Obenberger, 1926a : 192.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris* (s. g. indef.) *madoni* Théry, 1912**

Théry, 1912 : 110 – Obenberger, 1926a : 192.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris* (s. g. indef.) *marginalis* (Olivier, 1790)**

Buprestis marginalis Olivier, 1790b : 214 – 1790a : 15 – Herbst, 1801 : 187 – *Polybothris marginalis* (Olivier) : Gemminger et Harold, 1869 : 1364 – Kerremans, 1892a : 72 – Fairmaire, 1899 : 19 – Alluaud, 1900b : 187 – *Psiloptera (Polybothris)* (Olivier) : Kerremans, 1903 : 102 – *Psiloptera* (Olivier) : Théry, 1905 : 22, 104 (Division II, Section VI).

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris* (*Cornelia*) *mariae* Obenberger, 1942**

Obenberger, 1942b : 48.

Holotype : NMPC.

Distribution : MADAGASCAR OUEST : Sainte-Marie-de-Marovoay.

• ***Polybothris* (s. g. indef.) *marmorata* (Kerremans, 1911)**

Psiloptera (Polybothris) marmorata Kerremans, 1911b : 406 – Obenberger, 1926a : 192.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris (s. g. indef.) melitta* Obenberger, 1942**

Obenberger, 1942b : 39.

Holotype : NMPC-21006.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris (Laconides) miribella* Obenberger, 1942**

Obenberger, 1942b : 37.

Holotype : NMPC-21004.

Distribution : MADAGASCAR : région du Sambirano.

• ***Polybothris (s. g. indef.) mocquersyi* (Théry, 1905)**

Psiloptera mocquersyi Théry, 1905 : 19, 68 (Division II, Section IV) –

Psiloptera (Polybothris) mocquersyi (Théry) : Kerremans, 1903 : 98 ; 1911b : 410 – Obenberger, 1926a : 192.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Maroantsetra, baie d'Antongil.

synonyme / synonym : *fisheri* (Obenberger, 1928)

Psiloptera (Polybothris) fisheri Obenberger, 1928b : 169 – Théry, 1930d : 51 (synonyme de / synonym of *mocquersyi*).

Holotype : NMPC-20991.

• ***Polybothris (Cornelia) moesta* Thomson, 1878)**

Coccinellopsis moesta Thomson, 1878a : 348 – *Polybothris moesta* (Thomson) : Kerremans, 1885 : 131 – Kunckel d'Herculais, 1890 : pl. 43, fig. 8 – Kerremans, 1892a : 73 – Alluaud, 1900b : 187 – *Psiloptera (Polybothris) moesta* (Thomson) : Kerremans, 1903 : 99 – *Psiloptera moesta* (Thomson) : Théry, 1905 : 20, 85 (Division II, Section V) – *Psiloptera (Polybothris) moesta* (Thomson) : Kerremans, 1911b : 516 – Obenberger, 1926a : 192.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR CENTRE : Tananarive / Antananarivo.

synonyme / synonym : *compacta* (Waterhouse, 1880)

Pycnotheris compacta Waterhouse, 1880 : 194 – *Polybothris compacta* (Waterhouse) : Kerremans, 1885 : 130 ; 1892a : 73 – Alluaud, 1900b : 179 (synonyme de / synonym of *moesta*) – *Psiloptera (Polybothris) compacta* (Waterhouse) : Kerremans, 1903 : 99 – *Psiloptera compacta* (Waterhouse) : Théry, 1905 : 20 – *Psiloptera (Polybothris) compacta* (Waterhouse) : Kerremans, 1911b : 516 – Obenberger, 1926a : 192.

Holotype : BMNH.

• ***Polybothris (Cornelia) molesta* (Thomson, 1878)**

Pycnotheris molesta Thomson, 1878a : 339 – *Cassidabothris molesta* (Thomson) : 1878b : 34 – *Polybothris molesta* (Thomson) : Kerremans, 1885 : 131 ; 1892a : 73 – Alluaud, 1900b : 187 – *Psiloptera (Polybothris) molesta* (Thomson) : Kerremans, 1903 :

102 – *Psiloptera molesta* (Thomson) : Théry, 1905 : 22, 102 (Division II, Section VI) – *Psiloptera (Polybothris) molesta* (Thomson) : Kerremans, 1911b : 539 – Obenberger, 1926a : 192.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris (s. g. indef.) moralesi* (Théry, 1905)**

Psiloptera moralesi Théry, 1905 : 8, 62 (Division II, Section III), pl. II, fig. 7 – *Psiloptera (Polybothris) moralesi* (Théry) : Kerremans, 1911b : 439 – Obenberger, 1926a : 192.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR SUD : Ambovombe.

• ***Polybothris (Cornelia) mucronata* (Laporte de Castelnau et Gory, 1836)**

Buprestis (Psiloptera) mucronata Laporte de Castelnau et Gory, 1836 : 62, pl. 15, fig. 80 – *Polybothris mucronata* (Laporte de Castelnau et Gory) : Gemminger et Harold, 1869 : 1364 – *Psiloptera mucronata* (Laporte de Castelnau et Gory) : Saunders, 1871 : 30 – *Pycnotheris mucronata* (Laporte de Castelnau et Gory) : Thomson, 1878a : 320 – *Polybothris mucronata* (Laporte de Castelnau et Gory) : Künckel d'Herculais, 1890 : pl. 42, fig. 9 – Kerremans, 1892a : 73 ; 1894 : 347 – Alluaud, 1900b : 187 – *Psiloptera (Polybothris) mucronata* (Laporte de Castelnau et Gory) : Kerremans, 1903 : 99 – *Psiloptera mucronata* (Laporte de Castelnau et Gory) : Théry, 1905 : 20, 84 (Division II, Section V) – *Psiloptera (Polybothris) mucronata* (Laporte de Castelnau et Gory) : Kerremans, 1911b : 536 – Obenberger, 1926a : 192.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : Pays Antsianaka.

synonyme / synonym : *pseudopunctipennis* Obenberger, 1942

Polybothris (Cornelia) mucronata var. *pseudopunctipennis* Obenberger, 1942b : 45.

Holotype : NMPC.

• ***Polybothris (Polybothris) muhlbergi* (Kerremans, 1893)**

Psiloptera (Polybothris) muhlbergi Kerremans, 1893d : 508 ; 1903 : 98 – *Psiloptera muhlbergi* (Kerremans) : Théry, 1905 : 18, 55 (Division II, Section I) – *Psiloptera (Polybothris) muhlbergi* (Kerremans) : Kerremans, 1911b : 447, pl. 31, fig. 8 – Obenberger, 1926a : 193.

Holotype : BMNH.

Distribution : MADAGASCAR.

nom indisponible / unavailable name : *muhlbergi* Meyer-Darcis

Meyer-Darcis (*in litt.*) – Kerremans, 1893d : 508.

• ***Polybothris (Coccinellopsis) multiguttata* (Waterhouse, 1880)**

Coccinellopsis multiguttata Waterhouse, 1880 : 189 – *Polybothris multiguttata* (Waterhouse) : Kerremans, 1885 : 131 ; 1892a : 73 ; 1894 : 343 – Alluaud, 1900b : 187 – Kerremans, 1903 : 99 – *Psiloptera multiguttata* (Waterhouse) : Théry, 1905 : 20, 81 (Division II, Section V) – *Psiloptera (Polybothris) multiguttata* (Waterhouse) : Kerremans, 1911b : 489 – Obenberger, 1926a : 193.

Holotype : BMNH.

Distribution : MADAGASCAR EST : Pays Antsianaka.

erreur d'identification / misidentification : *circularis* Künckel d'Herculais, 1890

Künckel d'Herculais, 1890 : pl. 42 – *Psiloptera* (*Polybothris*) *circularis* (Künckel d'Herculais) : Kerremans, 1911b : 489 (synonyme de / synonym of *multiguttata*) – Obenberger, 1926a : 193.

erreur d'identification / misidentification : *alboplagiata* Künckel d'Herculais, 1890

Künckel d'Herculais, 1890 : pl. 42, fig. 8 – *Psiloptera* (*Polybothris*) *alboplagiata* (Künckel d'Herculais) : Kerremans, 1911b : 489 (synonyme de / synonym of *multiguttata*) – Obenberger, 1926a : 193.

synonyme / synonym : *aliena* (Obenberger, 1917)

Psiloptera (*Polybothris*) *multiguttata* var. *aliena* Obenberger, 1917b : 283 ; 1924b : 66 ; 1926a : 193.

Holotype : NMPC.

• ***Polybothris* (s. g. indef.) *myrmido* (Théry, 1905)**

Psiloptera myrmido Théry, 1905 : 21, 97 (nom. nov. de / for *Polybothris rugosa* Fairmaire, 1902, Division II, Section VI) – *Psiloptera* (*Polybothris*) *myrmido* Théry : Kerremans, 1911b : 535 – Obenberger, 1926a : 193.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : Ampasimena, vallée d'Ambolo.

synonyme / synonym : *rugosa* Fairmaire, 1902

Fairmaire, 1902b : 346 (nom. praeocc. in *Polybothris* par / by *Buprestis rugosa* Palisot de Beauvois, 1807) – Théry, 1905 : 21, 97 – *Psiloptera* (*Polybothris*) *rugosa* (Fairmaire) : Kerremans, 1911b : 535 – Marie et Lesne, 1917 : 98 – Obenberger, 1926a : 193.

Holotype : MNHN.

• ***Polybothris* (*Coccinellopsis*) *mystica* (Thomson, 1878)**

Coccinellopsis mystica Thomson, 1878a : 347 – *Polybothris mystica* (Thomson) : Kerremans, 1900a : 291 (synonyme de / synonym of *quadrispilota*) – Alluaud, 1900b : 179 (synonyme de / synonym of *europicta*) – *Psiloptera* (*Polybothris*) *mystica* (Thomson) : Kerremans, 1903 : 99 – *Psiloptera mystica* (Thomson) : Théry, 1905 : 85 (Division II, Section V) – *Psiloptera* (*Polybothris*) *mystica* (Thomson) : Kerremans, 1911b : 512 – Obenberger, 1926a : 193.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris* (*Amphisbeta*) *navicularis* (Laporte de Castelnau et Gory, 1836)**

Buprestis (*Psiloptera*) *navicularis* Laporte de Castelnau et Gory, 1836 : 57, pl. 14, fig. 72 – *Psiloptera* Lacordaire, 1857 : 29 – *Polybothris navicularis* (Laporte de Castelnau et Gory) : Gemminger et Harold, 1869 : 1364 – *Psiloptera navicularis* (Laporte de Castelnau et Gory) : Saunders, 1871 : 28 – *Amphisbeta navicularis* (Laporte de Castelnau et Gory) :

Thomson, 1878a : 319 – *Polybothris navicularis* (Laporte de Castelnau et Gory) : Thomson, 1878b : 35 (synonyme de / synonym of *quadraticollis*) – Waterhouse 1880 : 180 – Künckel d'Herculais, 1890 : pl. 38, fig. 9, pl. 44, fig. 10 – Kerremans, 1892a : 73 ; 1894 : 341 ; 1900a : 292 – Alluaud, 1900b : 180 (synonyme de / synonym of *quadracollis*) – *Psiloptera* (*Polybothris*) *navicularis* (Laporte de Castelnau et Gory) : Kerremans, 1903 : 98 – *Psiloptera navicularis* (Laporte de Castelnau et Gory) : Théry, 1905 : 18, 56 (Division II, Section II) – *Psiloptera* (*Polybothris*) *navicularis* (Laporte de Castelnau et Gory) : Kerremans, 1911b : 399 – Obenberger, 1926a : 193.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Maroantsetra, baie d'Antongil, Pays Antsianaka.

nom indisponible / unavailable name : *multifoveolata* Dejean, 1836

Dejean, 1836 : 88 (*nom. nud.*) – Gemminger et Harold, 1869 : 1364 (synonyme de / synonym of *navicularis*) – *Polybothris* Kerremans, 1892a : 73 – Théry, 1905 : 18.

synonyme / synonym : *spinolae* (Thomson, 1878)

Amphisbeta spinolae Thomson, 1878a : 325 ; 1878b : 17 – *Polybothris spinolae* (Thomson) : Kerremans, 1885 : 131 ; 1892a : 75 ; 1900a : 292 (synonyme de / synonym of *navicularis*) – Alluaud, 1900b : 191 – Kerremans, 1903 : 98 – Théry, 1905 : 18 – *Psiloptera* (*Polybothris*) *spinolae* (Thomson) : Kerremans, 1911b : 399 – Obenberger, 1926a : 193.

Holotype : MNHN.

synonyme / synonym : *fallax* (Théry, 1905)


Psiloptera fallax Théry, 1905 : 18, 57 (Division II, Section II) – *Psiloptera* (*Polybothris*) *fallax* (Théry) : Kerremans, 1911b : 399 – *Polybothris* (*Amphisbeta*) *navicularis* var. *fallax* Obenberger, 1926a : 193.

Holotype : MNHN.

synonyme / synonym : *longicollis* (Théry, 1905)

Psiloptera longicollis Théry, 1905 : 18, 57 (Division II, Section II) – *Psiloptera* (*Polybothris*) *longicollis* (Théry) : Kerremans, 1911b : 399 – *Polybothris* (*Amphisbeta*) *navicularis* var. *longicollis* Obenberger, 1926a : 193.

Holotype : MNHN.



Polybothris navicularis (Laporte de Castelnau et Gory, 1836)
(d'après/from Künckel d'Herculais in Grandidier, 1890).

• *Polybothris* (*s. g. indef.*) *nickerli* (Obenberger, 1924)

Psiloptera (*Polybothris*) *nickerli* Obenberger, 1924b : 59 ; 1926a : 193 ; 1928b : 170, pl. III, fig. 7 – Théry, 1930d : 51.

Holotype : NMPC-20993.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris (s. g. indef.) nigra* (Kerremans, 1898)**

Kerremans, 1898b : 80 – Alluaud, 1900b : 187 – *Psiloptera (Polybothris) nigra* (Kerremans) : Kerremans, 1903 : 99 – *Psiloptera nigra* (Kerremans) : Théry, 1905 : 83 – *Psiloptera (Polybothris) nigra* (Kerremans) : Kerremans, 1911b : 469 – Obenberger, 1926a : 193.

Holotype : BMNH.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris (s. g. indef.) nitidiventris* (Laporte de Castelnau et Gory, 1837)**

Buprestis (Psiloptera) nitidiventris Laporte de Castelnau et Gory, 1837 : 65, pl. 16, fig. 85 – *Polybothris nitidiventris* (Laporte de Castelnau et Gory) : Gemminger et Harold, 1869 : 1364 – *Psiloptera nitidiventris* (Laporte de Castelnau et Gory) : Saunders, 1871 : 29 – *Polybothris nitidiventris* (Laporte de Castelnau et Gory) : Künckel d'Herculais, 1890 : pl. 41, fig. 10 – Kerremans, 1892a : 73 – Alluaud, 1900b : 187 – *Psiloptera (Polybothris) nitidiventris* (Laporte de Castelnau et Gory) : Kerremans, 1903 : 98 – *Psiloptera nitidiventris* (Laporte de Castelnau et Gory) : Théry, 1905 : 19, 75 (Division II, Section V) – *Psiloptera (Polybothris) nitidiventris* (Laporte de Castelnau et Gory) : Kerremans, 1911b : 454 – Obenberger, 1926a : 193.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris (s. g. indef.) nivicineta* Fairmaire, 1902**

Psiloptera nivicineta Fairmaire, 1902a : 78 – Théry, 1905 : 22, 101 (Division II, Section VI) – Kerremans, 1911b : 562, pl. 32, fig. 7 – Marie et Lesne, 1917 : 103 – *Psiloptera (Polybothris) nivicineta* (Théry) : Obenberger, 1926a : 193.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR SUD : Amboasary Sud, entre Andrahomana et le lac d'Anony.

• ***Polybothris (s. g. indef.) nivifera* (Théry, 1905)**

Psiloptera nivifera Théry, 1905 : 20, 84 (Division II, Section V) – *Psiloptera (Polybothris) nivifera* (Théry) : Kerremans, 1911b : 509 – Obenberger, 1926a : 193.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR NORD : cap d'Ambre.

• ***Polybothris (Coccinellopsis) nossibiana* (Fairmaire, 1869)**

Psiloptera (Polybothris) nossibiana Fairmaire, 1869 : 221 – *Psiloptera nossibiana* (Fairmaire) : Saunders, 1871 : 29 – *Polybothris nossibiana* (Fairmaire) : Kerremans, 1885 : 131 – Künckel d'Herculais, 1890 : pl. 43, fig. 13 – Kerremans, 1892a : 73 – Alluaud, 1900b : 187 – *Psiloptera (Polybothris) nossibiana* (Fairmaire) : Kerremans, 1903 : 99 – *Psiloptera nossibiana* (Fairmaire) : Théry, 1905 : 20, 80 (Division II, Section V) – *Psiloptera (Polybothris) nossibiana* (Fairmaire) : Kerremans, 1911b : 479 – Marie et Lesne, 1917 : 103 – Obenberger, 1926a : 193 ; 1942b : 41.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

synonyme / synonym : *heraclea* Obenberger, 1942

Polybothris (Coccinellopsis) nossibana var. *heraclea* Obenberger, 1942b : 41.

Holotype : NMPC.

• ***Polybothris (s. g. indef.) oberthurii* (Fairmaire, 1893)**

Psiloptera oberthurii Fairmaire, 1893 : 523, 533 – *Polybothris oberthurii* (Fairmaire) : Alluaud, 1900b : 188 — *Psiloptera (Polybothris) oberthurii* (Fairmaire) : Kerremans, 1903 : 102 – *Psiloptera oberthurii* (Fairmaire) : Théry, 1905 : 22, 103 (Division II, Section VI) – *Psiloptera (Polybothris) oberthurii* (Fairmaire) : Kerremans, 1911b : 346, 560 – Marie et Lesne, 1917 : 103 – Obenberger, 1926a : 194 – Descarpentries, 1979 : 107.

Holotype : MNHN.

Distribution : COMORES : Mayotte.

• ***Polybothris (s. g. indef.) obesa* (Kerremans, 1911)**

Psiloptera (Polybothris) obesa Kerremans, 1911b : 553 – Obenberger, 1926a : 194 – Descarpentries, 1978 : 107.

Holotype : MNHN.

Distribution : COMORES : Grande Comore / Ngazidja.

• ***Polybothris (Polybothris) obscura* (Thomson, 1878)**

Aplox obscura Thomson, 1878a : 337 – Waterhouse, 1880 : 180 – *Polybothris obscura* (Thomson) : Kerremans, 1885 : 131 – Künckel d'Herculais, 1890 : pl. 43, fig. 12 – Kerremans, 1892a : 73 – Alluaud, 1900b : 188 – Kerremans, 1903 : 100 – *Psiloptera obscura* (Thomson) : Théry, 1905 : 21, 96 (Division II, Section VI) – *Psiloptera (Polybothris) obscura* (Thomson) : Kerremans, 1911b : 511 – Obenberger, 1926a : 189.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

synonyme / synonym : *fallaciosa* Kerremans, 1911

Psiloptera (Polybothris) fallaciosa Kerremans, 1911b : 511 (*nom. nov. de / for Aplox obscura* Thomson, 1878, *nom. superfl.*) – Obenberger, 1926a : 189.

Holotype : MNHN.

• ***Polybothris (Coccinellopsis) obsoleta* (Thomson, 1878)**

Coccinellopsis obsoleta Thomson, 1878a : 348 – *Polybothris obsoleta* (Thomson) : Kerremans, 1885 : 131 ; 1892a : 73 – *Psiloptera (Polybothris) obsoleta* (Thomson) : 1903 : 99 – *Psiloptera obsoleta* (Thomson) : Théry, 1905 : 20, 83 (Division II, Section V) – *Psiloptera (Polybothris) obsoleta* (Thomson) : Kerremans, 1911b : 500 – Obenberger, 1926a : 194.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

synonyme / synonym : decolor (Thomson, 1878)

Coccinellopsis decolor Thomson, 1878a : 349 – *Polybothris decolor* (Thomson) : Kerremans, 1885 : 130 ; 1892a : 71 ; 1900a : 291 (synonyme de / synonym of *obsoleta*) – Alluud, 1900b : 184 – *Psiloptera (Polybothris) decolor* (Thomson) : Kerremans, 1903 : 99 ; 1911b : 500 – Obenberger, 1926a : 194.

Holotype : MNHN.

synonyme / synonym : boreki (Obenberger, 1917)

Psiloptera (Polybothris) boreki Obenberger, 1917b : 280 – *Psiloptera (Polybothris) boreki* Obenberger, 1924b : 65 ; 1926a : 194 (synonyme de / synonym of *obsoleta*).

Holotype : NMPC.

• ***Polybothris* (s. g. indef.) obtusa (Laporte de Castelnau et Gory, 1836)**

Buprestis (Psiloptera) obtusa Laporte de Castelnau et Gory, 1836 : 55, pl. 13, fig. 69 – *Polybothris obtusa* (Laporte de Castelnau et Gory) : Gemminger et Harold, 1869 : 1364 – *Psiloptera obtusa* (Laporte de Castelnau et Gory) : Saunders, 1871 : 28 – *Polybothris obtusa* (Laporte de Castelnau et Gory) : Künckel d'Herculais, 1890 : pl. 39, fig. 6 – Kerremans, 1892a : 73 – Alluud, 1900b : 188 – *Psiloptera (Polybothris) obtusa* (Laporte de Castelnau et Gory) : Kerremans, 1903 : 102 – *Psiloptera obtusa* (Laporte de Castelnau et Gory) : Théry, 1905 : 18, 62 (Division II, Section III) – *Psiloptera (Polybothris) obtusa* (Laporte de Castelnau et Gory) : Kerremans, 1911b : 430 – Obenberger, 1926a : 194 – Théry, 1927 : 255.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

synonyme / synonym : aequalis (Waterhouse, 1880)

Laconides aequalis Waterhouse, 1880 : 182 – *Polybothris aequalis* (Waterhouse) : Kerremans, 1885 : 130 ; 1892a : 68 – Alluud, 1900b : 180 – *Psiloptera (Polybothris) aequalis* (Waterhouse) : Kerremans, 1903 : 98 – *Psiloptera aequalis* (Waterhouse) : Théry, 1905 : 18, 61 (Division II, Section III) – *Psiloptera (Polybothris) aequalis* (Waterhouse) : Kerremans, 1911b : 440 – Obenberger, 1926a : 182 – Théry, 1927 : 255 (synonyme de / synonym of *obtusa*).

Holotype : BMNH.

erreur d'identification / misidentification : sumptuosa Künckel d'Herculais, 1890

Künckel d'Herculais, 1890 : pl. 38, fig. 6 – *Psiloptera (Polybothris) sumptuosa* (Künckel d'Herculais) : Kerremans, 1911b : 430 (synonyme de / synonym of *obtusa*) – Obenberger, 1926a : 194.

erreur d'identification / misidentification : viridicollis Künckel d'Herculais, 1890

Künckel d'Herculais, 1890 : pl. 39, fig. 2 – *Psiloptera (Polybothris) viridicollis* (Künckel d'Herculais) : Kerremans, 1911b : 440 (synonyme de / synonym of *aequalis*) – Obenberger, 1926a : 182 (synonyme de / synonym of *aequalis*) – Théry, 1927 : 255 ; 1930d : 51.

synonyme / synonym : subobtusa (Kerremans, 1903)

Psiloptera Kerremans, 1903 : 98 – Théry, 1905 : 18, 62 (Division II, Section III) – *Psiloptera (Polybothris)* Kerremans, 1911b : 430 – Obenberger, 1926a : 194 (variété de / variety of

obtusa) – Théry, 1927 : 255 (synonyme de / synonym of *obtusa*) ; 1930d : 51 (variété de / variety of *aequalis*).

Holotype : BMNH.

• ***Polybothris (Palaeobothris) ochreata* (Olivier, 1790)**

Buprestis ochreata Olivier, 1790a : 59 – *Psiloptera ochreata* (Olivier) : Dejean, 1836 : 86 – *Buprestis (Psiloptera) ochreata* Olivier : Laporte de Castelnau et Gory, 1836 : 53, pl. 13, fig. 67 – Gemminger et Harold, 1869 : 1364 – Saunders, 1871 : 28 – *Palaeobothris ochreata* (Olivier) : Thomson, 1878a : 319 – *Polybothris ochreata* (Olivier) : 1878b : 35 – Waterhouse 1880 : 180 – Künckel d'Herculais, 1890 : pl. 39, fig. 5 – Kerremans, 1892a : 73 ; 1894 : 341 – Alluaud, 1900b : 188 – *Psiloptera (Polybothris) ochreata* (Olivier) : Kerremans, 1903 : 98 – *Psiloptera ochreata* (Olivier) : Théry, 1905 : 18, 62 (Division II, Section III) – *Psiloptera (Polybothris) ochreata* (Olivier) : Kerremans, 1911b : 425 – Obenberger, 1926a : 194.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : Pays Antsianaka.

synonyme / synonym : *lalandei* (Guérin-Méneville, 1832)

Buprestis lalandei Guérin-Méneville, 1832h : pl. 11 – *Polybothris lalandei* (Guérin-Méneville) : Gemminger et Harold, 1869 : 1364 (synonyme de / synonym of *ochreata*) – Saunders, 1871 : 28 – Thomson, 1878a : 319 – Kerremans, 1892a : 73 – Alluaud, 1900b : 179 (synonyme de / synonym of *ochreata*) – Kerremans, 1903 : 98 – Obenberger, 1926a : 194.

Holotype : MNHN.

nom indisponible / unavailable name : *sganzinii* Petit, 1836

Petit, in Dejean, 1836 : 86 (*nom. nud.*) – Gemminger et Harold, 1869 : 1364 (synonyme de / synonym of *ochreata*) – Kerremans, 1892a : 73.

nom indisponible / unavailable name : *stellata* Théry

Théry (*in litt.*) – Kerremans, 1911b : 425.

synonyme / synonym : *stellata* (Kerremans, 1911)

Psiloptera stellata Kerremans, 1911b : 426 – *Polybothris (Polybothris) ochreata* var. *stellata* Kerremans : Obenberger, 1926a : 194 ; 1928b : 168.

Holotype : MNHN.

• ***Polybothris (s. g. indef.) ogloblini* (Obenberger, 1928)**

Psiloptera (Polybothris) ogloblini Obenberger, 1928b : 176.

Holotype : NMPC.

Distribution : MADAGASCAR SAMBIRANO : Nossi-Bé / Nosy Be.

• ***Polybothris (Coccinellopsis) orbicularis* (Thomson, 1878)**

Coccinellopsis orbicularis Thomson, 1878a : 343 – *Polybothris orbicularis* (Thomson) : Kerremans, 1885 : 131 ; 1892a : 73 – Alluaud, 1900b : 188 – *Psiloptera orbicularis* (Thomson) : Théry, 1905 : 21, 92 (Division II, Section V) – *Psiloptera (Polybothris) orbicularis* (Thomson) : Kerremans, 1911b : 474 – Obenberger, 1926a : 194.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

synonyme / synonym : *aenea* (Thomson, 1878)

Coccinellopsis aenea Thomson, 1878a : 344 – *Polybothris aenea* (Thomson) : Kerremans, 1885 : 130 ; 1892a : 68 ; 1900a : 291 (synonyme de / synonym of *orbicularis*) – Alluaud, 1900b : 180 – Théry, 1905 : 21 – *Psiloptera aenea* (Thomson) : Kerremans, 1911b : 474 – Obenberger, 1926a : 194.

Holotype : MNHN.

• ***Polybothris (Coccinellopsis) ovalis* (Waterhouse, 1880)**

Coccinellopsis ovalis Waterhouse, 1880 : 188 – *Polybothris ovalis* (Waterhouse) : Kerremans, 1885 : 131 ; 1892a : 73 – Alluaud, 1900b : 188 – *Psiloptera (Polybothris) ovalis* (Waterhouse) : Kerremans, 1903 : 102 – *Psiloptera ovalis* (Waterhouse) : Théry, 1905 : 21, 88 (Division II, Section V) – *Psiloptera (Polybothris) ovalis* (Waterhouse) : Kerremans, 1911b : 538 – Obenberger, 1926a : 194.

Holotype : BMNH.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris (Cornelia) ovularis* (Thomson, 1878)**

Pycnbothris ovularis Thomson, 1878a : 342 – *Polybothris ovularis* (Thomson) : Kerremans, 1885 : 131 ; 1900a : 292 – Alluaud, 1900b : 180 (synonyme de / synonym of *quadripilota*) – *Psiloptera (Polybothris) ovularis* (Thomson) : Kerremans, 1903 : 99 – Théry, 1905 : 21, 86 (Division II, Section V) – *Psiloptera (Polybothris) ovularis* (Thomson) : Kerremans, 1911b : 523, pl. 32, fig. 4 – Obenberger, 1926a : 194.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris (Coccinellopsis) pandora* Obenberger, 1942**

Obenberger, 1942b : 41.

Holotype : NMPC.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris (Laconides) parallela* (Waterhouse, 1880)**

Hemisobothris parallela Waterhouse, 1880 : 182 – *Polybothris parallela* (Waterhouse) : Kerremans, 1885 : 131 ; 1892a : 74 – Alluaud, 1900b : 188 – *Psiloptera (Polybothris) parallela* (Waterhouse) : Kerremans, 1903 : 102 – *Psiloptera parallela* (Waterhouse) : Théry, 1905 : 22, 104 (Division II, Section VI) – *Psiloptera (Polybothris) parallela* (Waterhouse) : Kerremans, 1911b : 434 – Obenberger, 1926a : 194.

Holotype : BMNH.

Distribution : MADAGASCAR CENTRE : Tananarive / Antananarivo.

• ***Polybothris (s. g. indef.) parmulata* (Fairmaire, 1869)**

Psiloptera parmulata Fairmaire, 1869 : 220 – Saunders, 1871 : 29 – Kerremans, 1885 : 133 – *Polybothris parmulata* (Fairmaire) : 1892a : 74 – Alluaud, 1900b : 188 –

Psiloptera (Polybothris) parmula (Fairmaire) : Kerremans, 1903 : 102 – *Psiloptera parmula* (Fairmaire) : Théry, 1905 : 19, 79 (Division II, Section V) – *Psiloptera (Polybothris) parmula* (Fairmaire) : Kerremans, 1911b : 455 – Marie et Lesne, 1917 : 103 – Obenberger, 1926a : 194.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris (Cornelia) penelope* Obenberger, 1942**

Obenberger, 1942b : 47.

Holotype : NMPC.

Distribution : MADAGASCAR EST : Perinet / Andasibe.

• ***Polybothris (s. g. indef.) perrieri* Fairmaire, 1901**

Fairmaire, 1901 : 176 – *Psiloptera perrieri* (Fairmaire) : Théry, 1905 : 19, 65 (Division II, Section III) – *Psiloptera (Polybothris) perrieri* (Fairmaire) : Kerremans, 1911b : 423 – Marie et Lesne, 1917 : 98 – Obenberger, 1926a : 195.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR OUEST : environs de Suberbieville [= Maevatanana].

• ***Polybothris (s. g. indef.) petrequini* (Théry, 1910)**

Lampetis petrequini Théry, 1910 : 1 – *Psiloptera (Polybothris) petrequini* (Théry) : Kerremans, 1911b : 367 – Obenberger, 1926a : 195.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR NORD : Diégo-Suarez / Antsiranana.

• ***Polybothris (s. g. indef.) peyrierasi* (Descarpentries, 1974)**

Psiloptera peyrierasi Descarpentries, 1974 : 579, fig. 2, 4.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Mananara Nord, Antanambe.

• ***Polybothris (Cornelia) pfeifferae* Obenberger, 1942**

Obenberger, 1942b : 42.

Holotype : NMPC.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris (Cornelia) pisciformis* (Thomson, 1878)**

Alampetis pisciformis Thomson, 1878a : 335 – *Polybothris pisciformis* (Thomson) : Kerremans, 1885 : 131 – Künnel d'Herculais, 1890 : pl. 44, fig. 4 – Kerremans, 1892a : 74 ; 1894 : 340 – Alluaud, 1900b : 188 – *Psiloptera (Polybothris) pisciformis* (Thomson) : Kerremans, 1903 : 100 – *Psiloptera pisciformis* (Thomson) : Théry, 1905 : 22, 99 (Division II, Section VI) – *Psiloptera (Polybothris) pisciformis* (Thomson) : Kerremans, 1911b : 558 – Obenberger, 1926a : 195 ; 1942b : 47.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : pays Antsianaka.

nom indisponible / unavailable name : *pisciformis* Deyrolle

Deyrolle (*in litt.*) – Thomson, 1878a : 335.

synonyme / synonym : *arete* Obenberger, 1942

Polybothris (*Cornelia*) *pisciformis* var. *arete* Obenberger, 1942b : 47.

Holotype : NMPC.

synonyme / synonym : *brunneitarsis* Obenberger, 1942

Polybothris (*Cornelia*) *pisciformis* var. *brunneitarsis* Obenberger, 1942b : 47.

Holotype : NMPC.

synonyme / synonym : *geniculata* Obenberger, 1942

Polybothris (*Cornelia*) *pisciformis* var. *geniculata* Obenberger, 1942b : 47.

Holotype : NMPC.

synonyme / synonym : *purpurifera* Obenberger, 1942

Polybothris (*Cornelia*) *pisciformis* var. *purpurifera* Obenberger, 1942b : 48.

Holotype : NMPC.

• ***Polybothris* (*s. g. indef.*) *planula* (Obenberger, 1926)**

Psiloptera Obenberger, 1926a : 195 (*nom. nov. de / for Psiloptera platessa* Obenberger, 1917).

Distribution : MADAGASCAR.

synonyme / synonym : *platessa* (Obenberger, 1917)

Psiloptera (*Polybothrys*) *platessa* Obenberger, 1917b : 284 (*nom. praeocc. in Polybothris* par / by *Buprestis platessa* Klug 1833) ; 1926a : 195.

Holotype : NMPC-21011.

• ***Polybothris* (*Cornelia*) *psyche* Obenberger, 1942**

Obenberger, 1942b : 45.

Holotype : NMPC.

Distribution : MADAGASCAR EST : Perinet / Andasibe.

• ***Polybothris* (*s. g. indef.*) *pulverulenta* (Théry, 1905)**

Psiloptera pulverulenta Théry, 1905 : 20, 80 (Division II, Section V) – *Psiloptera* (*Polybothris*) *pulverulenta* (Théry) : Kerremans, 1911b : 484 – Obenberger, 1926a : 195.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Maroantsetra, baie d'Antongil.

• ***Polybothris (s. g. indef.) pulvifera* (Obenberger, 1926)**

Psiloptera pulvifera Obenberger, 1926a : 195 (nom. nov. de / for *pulverulenta* Kerremans, 1911).

Distribution : MADAGASCAR.

synonyme / synonym : *pulverulenta* (Kerremans, 1911)

Psiloptera (Polybothris) pulverulenta Kerremans, 1911b : 422 (nom. praeocc. par / by *pulverulenta* Théry, 1905) – Obenberger, 1926a : 195.

Holotype : MNHN.

• ***Polybothris (Coccinelopsis) puncticollis* (Thomson, 1878)**

Coccinelopsis puncticollis Thomson, 1878a : 343 – *Polybothris puncticollis* (Thomson) : Kerremans, 1885 : 131 – Künckel d'Herculais, 1890 : pl. 43, fig. 7 – Kerremans, 1892a : 74 – Alluaud, 1900b : 189 – *Psiloptera (Polybothris) puncticollis* (Thomson) : Kerremans, 1903 : 99 – *Psiloptera puncticollis* (Thomson) : Théry, 1905 : 20 (synonyme de / synonym of *propinqua*) – *Psiloptera (Polybothris) puncticollis* (Thomson) : Kerremans, 1911b : 473 – Obenberger, 1926a : 195 (synonyme de / synonym of *propinqua*).

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR CENTRE : Tananarive / Antananarivo.

synonyme / synonym : *propinqua* (Waterhouse, 1880)

Coccinelopsis propinqua Waterhouse, 1880 : 190 – *Polybothris propinqua* (Waterhouse) : Kerremans, 1885 : 131 – Kerremans, 1892a : 74 (synonyme de / synonym of *puncticollis*) – Alluaud, 1900b : 180 – *Psiloptera (Polybothris) propinqua* (Waterhouse) : Kerremans, 1903 : 99 – *Psiloptera propinqua* (Waterhouse) : Théry, 1905 : 20, 82 (Division II, Section V) – *Psiloptera (Polybothris) propinqua* (Waterhouse) : Kerremans, 1911b : 473 – Obenberger, 1926a : 195.

Holotype : BMNH.

• ***Polybothris (Coccinelopsis) punctipennis* Kerremans, 1894**

Kerremans, 1894 : 344 – Alluaud, 1900b : 189 – *Psiloptera (Polybothris) punctipennis* (Kerremans) : Kerremans, 1903 : 100 – *Psiloptera punctipennis* (Kerremans) : Théry, 1905 : 21, 97 (Division II, Section VI) – *Psiloptera (Polybothris) punctipennis* (Kerremans) : Kerremans, 1911b : 529 – Obenberger, 1926a : 195.

Holotype : BMNH.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris (Coccinelopsis) punctiventris* (Waterhouse, 1880)**

Coccinelopsis punctiventris Waterhouse, 1880 : 187 – *Polybothris punctiventris* (Waterhouse) : Kerremans, 1885 : 131 ; 1892a : 74 – Alluaud, 1900b : 189 – *Psiloptera (Polybothris) punctiventris* (Waterhouse) : Kerremans, 1903 : 102 – *Psiloptera punctiventris* (Waterhouse) : Théry, 1905 : 21, 88 (Division II, Section V) – *Psiloptera (Polybothris) punctiventris* (Waterhouse) : Kerremans, 1911b : 493 – Obenberger, 1926a : 195 ; 1942b : 41.

Holotype : BMNH.

Distribution : MADAGASCAR.

synonyme / synonym : *himera* Obenberger, 1942

Polybothris (Coccinellopsis) punctiventris var. *himera* Obenberger, 1942b : 41.

Holotype : NMPC.

• ***Polybothris (Cornelia) pygidialis* Fairmaire, 1904**

Fairmaire, 1904 : 232 – *Psiloptera pygidialis* (Fairmaire) : Théry, 1905 : 28, 176 – *Psiloptera (Polybothris) pygidialis* (Fairmaire) : Kerremans, 1911b : 522 (*pygidialis*) – Marie et Lesne, 1917 : 98 – Obenberger, 1926a : 195 ; 1942b : 43.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

synonyme / synonym : *ornix* Obenberger, 1942

Polybothris (Cornelia) pygidialis var. *ornix* Obenberger, 1942b : 43.

Holotype : NMPC.

• ***Polybothris (s. g. indef.) pyrogastra* Fairmaire, 1903**

Fairmaire, 1903b : 200 – *Psiloptera pyrogastra* (Fairmaire) : Théry, 1905 : 18, 63 (Division II, Section III) – *Psiloptera (Polybothris) pyrogastra* (Fairmaire) : Kerremans, 1911b : 427, pl. 31, fig. 6 – Marie et Lesne, 1917 : 98 – Obenberger, 1926a : 195.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris (Cornelia) pyropyga* Coquerel, 1851 (Pl. 5, fig. 36-37)**

Coquerel 1851 : 86 – Lacordaire, 1857 : 30 – Gemminger et Harold, 1869 : 1364 – *Psiloptera pyropyga* (Coquerel) : Saunders, 1871 : 30 – *Cornelia pyropyga* (Coquerel) : Thomson, 1878a : 320 – *Apate pyropyga* (Coquerel) : 1878b : 34 – Waterhouse 1880 : 180 – *Polybothris pyropyga* (Coquerel) : Künckel d'Herculais, 1890 : pl. 43, fig. 1 – Kerremans, 1892a : 74 – *Psiloptera (Polybothris) pyropyga* (Coquerel) : 1903 : 100 – *Psiloptera pyropyga* (Coquerel) : Théry, 1905 : 21, 96 (Division II, Section VI) – *Psiloptera (Polybothris) pyropyga* (Coquerel) : Kerremans, 1911b : 521 – Obenberger, 1926a : 196.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR CENTRE : Mandaratsy. MADAGASCAR EST : S.-P. de Moramanga, forêt de Sandrangato, Ifody.

nom indisponible / unavailable name : *ochromaculata* Reiche

Reiche (*in litt.*) – Kerremans, 1911b : 521 – Obenberger, 1926a : 196.

• ***Polybothris (Laconides) quadricollis* (Laporte de Castelnau et Gory, 1836) (Pl. 5, fig. 38-39)**

Buprestis (Psiloptera) quadricollis Laporte de Castelnau et Gory, 1836 : 56, pl. 14, fig. 71 – *Polybothris quadricollis* (Laporte de Castelnau et Gory) : Gemminger et Harold, 1869 : 1364 – *Psiloptera quadricollis* (Laporte de Castelnau et Gory) : Saunders, 1871 : 28 (synonyme de / synonym of *navicularis*) – *Hemisobothris quadricollis* (Laporte de Castelnau et Gory) : Thomson, 1878a : 319 ; 1878b : 35 (*quadraticollis* sic) – Waterhouse 1880 : 180 – *Polybothris quadricollis* (Laporte de Castelnau et Gory) : Kerremans, 1892a :

73 ; 1894 : 341 ; 1900a : 292 – Alluaud, 1900b : 189 – *Psiloptera (Polybothris) quadricollis* (Laporte de Castelnau et Gory) : Kerremans, 1903 : 98 – *Psiloptera quadricollis* (Laporte de Castelnau et Gory) : Théry, 1905 : 18, 59 (Division II, Section III) – *Psiloptera (Polybothris) quadricollis* (Laporte de Castelnau et Gory) : Kerremans, 1911b : 441 – Obenberger, 1926a : 196.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Moramanga, Ifody. Pays Antsianaka.

erreur d'identification / misidentification : *navicularis* Künckel d'Herculais, 1890

Künckel d'Herculais, 1890 : pl. 38, fig. 10 (*nom. praeocc.* par / by *navicularis* Laporte de Castelnau et Gory, 1836) – Kerremans, 1911b : 441 – Obenberger, 1926a : 196.

synonyme / synonym : *caeruleifinis* (Thomson, 1878)

Hemisobothris Thomson, 1878a : 324 – *Polybothris* Alluaud, 1900b : 179 (synonyme de / synonym of *quadricollis*) – *Psiloptera (Polybothris) coeruleipes (sic)* (Thomson) : Kerremans, 1903 : 98 – Théry, 1905 : 18 (*coeruleifinis* : synonyme de / synonym of *navicularis*, *coeruleipes* : synonyme de / synonym of *quadricollis*) – *Psiloptera (Polybothris) caeruleifinis* (Thomson) : Kerremans, 1911b : 441 – *Psiloptera (Polybothris) quadricollis* var. *caeruleifinis* (Thomson) : Obenberger, 1926a : 196.

Holotype : MNHN.

• ***Polybothris (Cornelia) quadrimaculata* (Waterhouse, 1882)**

Pycnbothris quadrimaculata Waterhouse, 1882 : 324 – *Polybothris quadrimaculata* (Waterhouse) : Kerremans, 1885 : 131 ; 1892a : 74 – Alluaud, 1900b : 189 – *Psiloptera (Polybothris) quadrimaculata* (Waterhouse) : Kerremans, 1903 : 99 – *Psiloptera quadrimaculata* (Waterhouse) : Théry, 1905 : 21, 86 (Division II, Section V) – *Psiloptera (Polybothris) quadrimaculata* (Waterhouse) : Kerremans, 1911b : 523 – Obenberger, 1926a : 196.

Holotype : BMNH.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris (s. g. indef.) quadripunctata* (Kerremans, 1911)**

Psiloptera (Polybothris) quadripunctata Kerremans, 1911b : 499 – Obenberger, 1926a : 196.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

nom indisponible / unavailable name : *quadripunctata* Kolbe

Kolbe (*in litt.*) – Kerremans, 1911b : 499 – Obenberger, 1926a : 196.

• ***Polybothris (Coccinellopsis) quadripilota* (Laporte de Castelnau et Gory, 1836)**

Buprestis (Psiloptera) quadripilota Laporte de Castelnau et Gory, 1836 : 61, pl. 15, fig. 78 – *Polybothris quadripilota* (Laporte de Castelnau et Gory) : Gemminger et Harold, 1869 : 1363 (synonyme de / synonym of *auropicta*) – *Psiloptera quadripilota* (Laporte de Castelnau et Gory) : Saunders, 1871 : 30 (variété de / variety of *auropicta*) – *Coccinellopsis quadripilota* (Laporte de Castelnau et Gory) : Thomson, 1878a : 320 ; 1878b : 35 – *Polybothris quadripilota* (Laporte de Castelnau et Gory) : Künckel

d'Herculais, 1890 : pl. 43, fig. 9 – Kerremans, 1892a : 74 ; 1900a : 292 – Alluaud, 1900b : 189 – *Psiloptera (Polybothris) quadrispilota* (Laporte de Castelnau et Gory) : Kerremans, 1903 : 99 – *Psiloptera quadrispilota* (Laporte de Castelnau et Gory) : Théry, 1905 : 20, 85 (Division II, Section V) – *Psiloptera (Polybothris) quadrispilota* (Laporte de Castelnau et Gory) : Kerremans, 1911b : 518 – Obenberger, 1926a : 196.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris (s. g. indef.) ranavalona* (Obenberger, 1928)**

Psiloptera (Polybothris) ranavalona Obenberger, 1928b : 175.

Holotype : NMPC-21025.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris (s. g. indef.) regalis* Théry, 1912**

Théry, 1912 : 113 – Obenberger, 1926a : 196.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR CENTRE : Ambositra.

• ***Polybothris (Phobetodes) renardi* Théry, 1912**

Polybothris renardi Théry, 1912 : 112 – Obenberger, 1926a : 196 –

Polybothris (Phobetodes) renardi Théry, 1942b : 35.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR CENTRE : Ambositra.

• ***Polybothris (s. g. indef.) republicana* (Théry, 1905)**

Psiloptera republicana Théry, 1905 : 19, 78 (Division II, Section V), pl. II, fig. 9 – *Psiloptera (Polybothris) republicana* (Théry) : Kerremans, 1911b : 474 – Obenberger, 1926a : 196.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris (Coccinellopsis) rotundata* (Guérin-Méneville, 1832)**

Buprestis rotundata Guérin-Méneville, 1832f : No. 28 – *Buprestis (Psiloptera) rotundata* (Guérin-Méneville) : Laporte de Castelnau et Gory, 1837 : 74, pl. 19, fig. 98 – *Polybothris rotundata* (Guérin-Méneville) : Gemminger et Harold, 1869 : 1364 – *Psiloptera rotundata* (Guérin-Méneville) : Saunders, 1871 : 29 – *Coccinellopsis rotundata* (Guérin-Méneville) : Thomson, 1878a : 320 ; 1878b : 35 – *Polybothris rotundata* (Guérin-Méneville) : Kerremans, 1892a : 74 – Alluaud, 1900b : 189 – *Psiloptera (Polybothris) rotundata* (Guérin-Méneville) : Kerremans, 1903 : 99 – *Psiloptera rotundata* (Guérin-Méneville) : Théry, 1905 : 20, 82 (Division II, Section V) – *Psiloptera (Polybothris) rotundata* (Guérin-Méneville) : Kerremans, 1911b : 490 – Obenberger, 1926a : 196 – Théry, 1927 : 255.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : Pays Antsianaka.

synonyme / synonym : *rhombus* (Klug, 1833)

Buprestis rhombus Klug, 1833 : 57, pl. 2, fig. 9 ; 1834 : 145 – *Polybothris rhombus* (Klug) : Gemminger et Harold, 1869 : 1364 (synonyme de / synonym of *rotundata*) – *Psiloptera rhombus* (Klug) : Saunders, 1871 : 29 – Thomson, 1878a : 320 – *Polybothris rhombus* (Klug) : Kerremans, 1892a : 74 – Alluaud, 1900b : 180 – *Psiloptera (Polybothris) rhombus* (Klug) : Kerremans, 1903 : 99 – *Psiloptera rhombus* (Klug) : Théry, 1905 : 20 – *Psiloptera (Polybothris) rhombus* (Klug) : Kerremans, 1911b : 490 – Obenberger, 1926a : 196.

Holotype : ZMHB.

synonyme / synonym : *striolata* (Kerremans, 1894)

Psiloptera striolata Kerremans, 1894 : 342 – Alluaud, 1900b : 191 – *Psiloptera (Polybothris) striolata* (Kerremans) : Kerremans, 1903 : 99 – *Psiloptera striolata* (Kerremans) : Théry, 1905 : 20 – *Psiloptera (Polybothris) striolata* (Kerremans) : Kerremans, 1911b : 491 – Obenberger, 1926a : 196 – Théry, 1927 : 255 (synonyme de / synonym of *rotundata*).

Holotype : BMNH.

• ***Polybothris* (s. g. *indef.*) *rubidipes* (Théry, 1905)**

Psiloptera rubidipes Théry, 1905 : 18, 57 (Division II, Section II) – *Psiloptera (Polybothris) rubidipes* (Théry) : Kerremans, 1911b : 397 – Obenberger, 1926a : 196.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris (Cornelia) ruficauda* (Thomson, 1878)**

Pycnotheris ruficauda Thomson, 1878a : 338 – *Polybothris ruficauda* (Thomson) : Kerremans, 1885 : 131 – Künckel d'Herculais, 1890 : pl. 43, fig. 10 – *Psiloptera (Polybothris) ruficauda* (Thomson) : Kerremans, 1892a : 74 – Alluaud, 1900b : 189 – Kerremans, 1903 : 100 – *Psiloptera ruficauda* (Thomson) : Théry, 1905 : 21, 95 (Division II, Section VI) – *Psiloptera (Polybothris) ruficauda* (Thomson) : Kerremans, 1911b : 525 – Obenberger, 1926a : 196.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR CENTRE : Fianarantsoa.

synonyme / synonym : *dejecta* (Waterhouse, 1880)

Coccinellopsis dejecta Waterhouse, 1880 : 188 – *Polybothris dejecta* (Waterhouse) : Kerremans, 1885 : 130 ; 1892a : 71 – Alluaud, 1900b : 184 – *Psiloptera (Polybothris) dejecta* (Waterhouse) : Kerremans, 1903 : 100 – *Psiloptera dejecta* (Waterhouse) : Théry, 1905 : 21, 90 (Division II, Section V) – *Psiloptera (Polybothris) dejecta* (Waterhouse) : Kerremans, 1911b : 525 – Obenberger, 1926a : 196.

Holotype : BMNH.

• ***Polybothris* (s. g. *indef.*) *rustica* (Théry, 1905)**

Psiloptera rustica Théry, 1905 : 19, 78 (Division II, Section V) – *Psiloptera (Polybothris) rustica* (Théry) : Kerremans, 1911b : 452 – Obenberger, 1926a : 196.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Maroantsetra, baie d'Antongil.

• ***Polybothris* (s. g. indef.) *salvazai* (Obenberger, 1924)**

Psiloptera (*Polybothris*) *salvazai* Obenberger, 1924b : 64 ; 1926a : 197.

Holotype : NMPC.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris* (*Laconides*) *sanguineotincta* Obenberger, 1942**

Obenberger, 1942b : 40.

Holotype : NMPC-21008.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris* (*Carcinias*) *scapularis* (Guérin-Méneville, 1832)**

Buprestis scapularis Guérin-Méneville, 1832b : N° 14 – *Buprestis* (*Psiloptera*) *scapularis* Guérin-Méneville : Laporte de Castelnau et Gory, 1836 : 51, pl. 13, fig. 64 – *Psiloptera scapularis* (Guérin-Méneville) : Lacordaire, 1857 : 28 – *Polybothris scapularis* (Guérin-Méneville) : Gemminger et Harold, 1869 : 1364 – *Psiloptera scapularis* (Guérin-Méneville) : Saunders, 1871 : 28 – *Carcinias scapularis* (Guérin-Méneville) : Thomson, 1878a : 319 ; 1878b : 34 – Waterhouse 1880 : 180 – *Polybothris scapularis* (Guérin-Méneville) : Künckel d'Herculais, 1890 : pl. 40, fig. 3 – Kerremans, 1892a : 74 – Alluaud, 1900b : 189 – *Psiloptera* (*Polybothris*) *scapularis* (Guérin-Méneville) : Kerremans, 1903 : 98 – *Psiloptera scapularis* (Guérin-Méneville) : Théry, 1905 : 19, 67 (Division II, Section IV) – *Psiloptera* (*Polybothris*) *scapularis* (Guérin-Méneville) : Kerremans, 1911b : 408 – Obenberger, 1926a : 197 ; 1928b : 169.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

synonyme / synonym : *carcharias* (Klug, 1833)

Buprestis carcharias Klug, 1833 : 54, pl. 2, fig. 2 ; 1834 : 142 – *Polybothris carcharias* (Klug) : Spinola, 1837 : 117 – *Polybothris carcharias* (Klug) : Gemminger et Harold, 1869 : 1364 (synonyme de / synonym of *scapularis*) – *Psiloptera carcharias* (Klug) : Saunders, 1871 : 28 – *Polybothris carcharias* (Klug) : Thomson, 1878a : 319 ; 1878b : 34 – *Polybothris carcharias* (Klug) : Kerremans, 1892a : 74 – Alluaud, 1900b : 179 – *Psiloptera* (*Polybothris*) *carcharias* (Klug) : Kerremans, 1903 : 98 – *Psiloptera carcharias* (Klug) : Théry, 1905 : 19 – *Psiloptera* (*Polybothris*) *carcharias* (Klug) : Kerremans, 1911b : 408 – Obenberger, 1926a : 197.

Holotype : ZMHB.

synonyme / synonym : *falligani* (Théry, 1910)

Carcinias falligani Théry, 1910a : 2 – *Psiloptera* (*Polybothris*) *falligani* (sic) (Théry) : Kerremans, 1911b : 411, pl. 31, fig. 5 – Obenberger, 1926a : 189.

Holotype : MNHN.

synonyme / synonym : *uvarovi* (Obenberger, 1928)

Psiloptera (*Polybothris*) *uvarovi* Obenberger, 1928b : 168 – *Psiloptera scapularis* var. *uvarovi* Obenberger : Théry, 1930d : 51.

Holotype : NMPC-20992.

• **sous-espèce / subspecies** : *spectralis* (Thomson, 1878)

Carcinias spectralis Thomson, 1878a : 329 – Waterhouse 1880 : 183 – *Polybothris spectabilis* (sic) Kerremans, 1885 : 131 ; 1892a : 74 ; 1900a : 292 (synonyme de / synonym of *scapularis*) – Alluaud, 1900b : 180 – *Psiloptera (Polybothris) spectralis* (Thomson) : Kerremans, 1903 : 98 – Théry, 1905 : 19 – *Psiloptera (Polybothris) spectralis* (Thomson) : Kerremans, 1911b : 408 – Obenberger, 1926a : 197 (? variété de / variety of *scapularis*).

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris* (s. g. indef.) *scenica* (Gory, 1840)**

Buprestis scenica Gory, 1840 : 97, pl. 17, fig. 95 – *Polybothris scenica* (Gory) : Gemminger et Harold, 1869 : 1364 – *Psiloptera scenica* (Gory) : Saunders, 1871 : 28 – *Polybothris scenica* (Gory) : Künckel d'Herculais, 1890 : pl. 40, fig. 7 – Kerremans, 1892a : 74 – Alluaud, 1900b : 190 – *Psiloptera (Polybothris) scenica* (Gory) : Kerremans, 1903 : 98 – *Psiloptera scenica* (Gory) : Théry, 1905 : 19, 68 (Division II, Section IV) – *Psiloptera (Polybothris) scenica* (Gory) : Kerremans, 1911b : 412 – Obenberger, 1926a : 197 ; 1928b : 170, pl. III, fig. 6.

Holotype : MNHN.


Distribution : MADAGASCAR.

• **sous-espèce / subspecies** : *viridiventris* (Obenberger, 1924)

Psiloptera (Polybothris) viridiventris Obenberger, 1924b : 60, pl. III, fig. 4 ; 1926a : 199 ; 1928b : 170 – Théry, 1930d : 51 (sous-espèce de / subspecies of *scenica*).

Holotype : NMPC-20995.

Distribution : MADAGASCAR.



Polybothris scenica (Gory, 1840) (d'après/from Künckel d'Herculais in Grandidier, 1890).

• ***Polybothris* (s. g. indef.) *sexmaculata* (Laporte de Castelnau et Gory, 1836)**

Buprestis (Psiloptera) sexmaculata Laporte de Castelnau et Gory, 1836 : 46 – Alluaud, 1900 : 190.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris* (Cornelia) *silphoides* (Thomson, 1878)**

Pycnotheris silphoides Thomson, 1878a : 340 – *Polybothris silphoides* (Thomson) : Kerremans, 1885 : 131 ; 1892a : 75 – Alluaud, 1900b : 190 – *Psiloptera (Polybothris) silphoides* (Thomson) : Kerremans, 1903 : 102 – *Psiloptera silphoides* (Thomson) : Théry, 1905 : 22, 102 (Division II, Section VI) – *Psiloptera (Polybothris) silphoides* (Thomson) : Kerremans, 1911b : 514, pl. 32, fig. 3 – Obenberger, 1926a : 197.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris (Coccinellopsis) sobrina* (Waterhouse, 1882)**

Coccinellopsis sobrina Waterhouse, 1882 : 325 – *Polybothris sobrina* (Waterhouse) : Kerremans, 1885 : 131 ; 1892a : 75 – Alluaud, 1900b : 190 – *Psiloptera (Polybothris) sobrina* (Waterhouse) : Kerremans, 1903 : 102 – *Psiloptera sobrina* (Waterhouse) : Théry, 1905 : 21, 89 (Division II, Section V) – *Psiloptera (Polybothris) sobrina* (Waterhouse) : Kerremans, 1911b : 466 – Obenberger, 1926a : 197.

Holotype : BMNH.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris (Coccinellopsis) sodalis* (Waterhouse, 1880)**

Coccinellopsis sodalis Waterhouse, 1880 : 190 – *Polybothris sodalis* (Waterhouse) : Kerremans, 1885 : 131 – Alluaud, 1900b : 190 – *Psiloptera (Polybothris) sodalis* (Waterhouse) : Kerremans, 1903 : 102 – *Psiloptera sodalis* (Waterhouse) : Théry, 1905 : 21, 89 (Division II, Section V) – *Psiloptera (Polybothris) sodalis* (Waterhouse) : Kerremans, 1911b : 505 – Obenberger, 1926a : 197.

Holotype : BMNH.

Distribution : MADAGASCAR CENTRE : Tananarive / Antananarivo.

• ***Polybothris (Coccinellopsis) solea* (Klug, 1833)**

Buprestis solea Klug, 1833 : 58, pl. 2, fig. 11 ; 1834 : 146 – *Buprestis (Psiloptera) solea* Klug : Laporte de Castelnau et Gory, 1836 : 64, pl. 16, fig. 83 – *Polybothris solea* (Klug) : Spinola, 1837 : 119 – Gemminger et Harold, 1869 : 1364 – *Psiloptera solea* (Klug) : Saunders, 1871 : 30 – *Coccinellopsis solea* (Klug) : Thomson, 1878a : 320 ; 1878b : 35 – Waterhouse 1880 : 180 – *Polybothris solea* (Klug) : Künckel d'Herculais, 1890 : pl. 42, fig. 10 – Kerremans, 1892a : 75 – Alluaud, 1900b : 190 – *Psiloptera (Polybothris) solea* (Klug) : Kerremans, 1903 : 99 – *Psiloptera solea* (Klug) : Théry, 1905 : 20, 82 (Division II, Section V) – *Psiloptera (Polybothris) solea* (Klug) : Kerremans, 1911b : 504 – Obenberger, 1926a : 197.

Holotype : ZMHB.

Distribution : MADAGASCAR CENTRE : Tananarive / Antananarivo.

synonyme / synonym : *cupreosignata* (Laporte de Castelnau et Gory, 1836)

Buprestis (Psiloptera) cupreosignata Laporte de Castelnau et Gory, 1836 : 63, pl. 16, fig. 82 – *Polybothris cupreosignata* (Laporte de Castelnau et Gory) : Gemminger et Harold, 1869 : 1364 (synonyme de / synonym of *solea*) – *Psiloptera cupreosignata* (Laporte de Castelnau et Gory) : Saunders, 1871 : 30 – *Coccinellopsis cupreosignata* (Laporte de Castelnau et Gory) : Thomson, 1878a : 320 – Kerremans, 1892a : 75 – Alluaud, 1900b : 179 (synonyme de / synonym of *solea*) – *Psiloptera (Polybothris) cupreosignata* (Laporte de Castelnau et Gory) : Kerremans, 1903 : 99 – *Psiloptera cupreosignata* (Laporte de Castelnau et Gory) : Théry, 1905 : 20 – *Psiloptera (Polybothris) cupreosignata* (Laporte de Castelnau et Gory) : Kerremans, 1911b : 504 – *Psiloptera (Polybothris) solea* var. *cupreosignata* (Laporte de Castelnau et Gory) : Obenberger, 1926a : 197.

Holotype : MNHN.

synonyme / synonym : *bistrigata* (Waterhouse, 1880)

Coccinellopsis bistriatga Waterhouse, 1880 : 192 – *Polybothris bistriatga* (Waterhouse) : Kerremans, 1885 : 130 ; 1892a : 69 – Alluaud, 1900b : 181 – *Psiloptera* (*Polybothris*) *bistriatga* (Waterhouse) : Kerremans, 1903 : 99 – *Psiloptera bistriatga* (Waterhouse) : Théry, 1905 : 20 (synonyme de / synonym of *solea*) – *Psiloptera* (*Polybothris*) *bistriatga* (Waterhouse) : Kerremans, 1911b : 504 – Obenberger, 1926a : 197.

Holotype : BMNH.

• ***Polybothris* (*Coccinellopsis*) *sparsuta* (Laporte de Castelnau et Gory, 1837)**

Buprestis (*Psiloptera*) *sparsuta* Laporte de Castelnau et Gory, 1837 : 66, pl. 16, fig. 86 – *Polybothris cupreonotata* var. *sparsuta* (Laporte de Castelnau et Gory) : Gemminger et Harold, 1869 : 1363 – *Psiloptera sparsuta* (Laporte de Castelnau et Gory) : Saunders, 1871 : 29 – *Coccinellopsis sparsuta* (Laporte de Castelnau et Gory) : Thomson, 1878a : 320 (synonyme de / synonym of *cupreonotata*) ; 1878b : 35 – *Polybothris sparsuta* (Laporte de Castelnau et Gory) : Künckel d'Herculais, 1890 : pl. 41, fig. 8 – Kerremans, 1892a : 75 ; 1900a : 292 – Alluaud, 1900b : 190 (synonyme de / synonym of *soror*) – *Psiloptera* (*Polybothris*) *sparsuta* (Laporte de Castelnau et Gory) : Kerremans, 1903 : 99 – *Psiloptera sparsuta* (Laporte de Castelnau et Gory) : Théry, 1905 : 19, 77 (Division II, Section V) – *Psiloptera* (*Polybothris*) *sparsuta* (Laporte de Castelnau et Gory) : Kerremans, 1911b : 457 – Obenberger, 1926a : 198.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : Pays Antsianaka.

• **sous-espèce / subspecies : *cupreonotata* (Laporte de Castelnau et Gory, 1837)**

Buprestis (*Psiloptera*) *cupreonotata* Laporte de Castelnau et Gory, 1837 : 67, pl. 17, fig. 88 – *Psiloptera cupreonotata* (Laporte de Castelnau et Gory) : Lacordaire, 1857 : 29 – *Polybothris cupreonotata* (Laporte de Castelnau et Gory) : Gemminger et Harold, 1869 : 1363 – *Psiloptera cupreonotata* (Laporte de Castelnau et Gory) : Saunders, 1871 : 29 – *Coccinellopsis cupreonotata* (Laporte de Castelnau et Gory) : Thomson, 1878a : 320 ; 1878b : 35 – *Polybothris cupreonotata* (Laporte de Castelnau et Gory) : Kerremans, 1900a : 292 (synonyme de / synonym of *sparsuta*) – Alluaud, 1900b : 179 (synonyme de / synonym of *sparsuta*), 190 (synonyme de / synonym of *soror*) – *Psiloptera* (*Polybothris*) *cupreonotata* (Laporte de Castelnau et Gory) : Kerremans, 1903 : 99 – *Psiloptera cupreonotata* (Laporte de Castelnau et Gory) : Théry, 1905 : 19 (synonyme de / synonym of *sparsuta*) – *Psiloptera* (*Polybothris*) *cupreonotata* (Laporte de Castelnau et Gory) : Kerremans, 1911b : 457 – Obenberger, 1926a : 198 (? sous-espèce de / subspecies of *sparsuta*).

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• **sous-espèce / subspecies : *testudinea* (Gory, 1840)**

Buprestis testudinea Gory, 1840 : 101, pl. 17, fig. 98 – *Polybothris cupreonotata* var. *testudinea* (Gory) : Gemminger et Harold, 1869 : 1363 – *Psiloptera testudinea* (Gory) : Saunders, 1871 : 29 – *Coccinellopsis testudinea* (Gory) : Thomson, 1878a : 320 (synonyme de / synonym of *cupreonotata*) ; 1878b : 35 – Kerremans, 1894 : 341 ; 1900a : 292 (synonyme de / synonym of *sparsuta*) – Alluaud, 1900b : 180 (synonyme de / synonym of *sparsuta*), 190 (synonyme de / synonym of *soror*) – *Psiloptera* (*Polybothris*) *testudinea* (Gory) : Kerremans, 1903 : 99 – *Psiloptera testudinea* (Gory) : Théry, 1905 : 19

(synonyme de / synonym of *sparsuta*) – *Psiloptera (Polybothris) testudinea* (Gory) : Kerremans, 1911b : 457 – Obenberger, 1926a : 198 (? sous-espèce de / subspecies of *sparsuta*).

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris (s. g. indef.) specialis* (Obenberger, 1924)**

Psiloptera (Polybothris) specialis Obenberger, 1924b : 63 ; 1926a : 198.

Holotype : NMPC.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris (s. g. indef.) spesivcevi* (Obenberger, 1928)**

Psiloptera (Polybothris) spesivcevi Obenberger, 1928b : 174.

Holotype : NMPC.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris (s. g. indef.) splendidiventris* (Laporte de Castelnau et Gory, 1837)**

Buprestis (Psiloptera) splendidiventris Laporte de Castelnau et Gory, 1837 : 69, pl. 17, fig. 91 – *Polybothris splendidiventris* (Laporte de Castelnau et Gory) : Gemminger et Harold, 1869 : 1364 – *Psiloptera splendidiventris* (Laporte de Castelnau et Gory) : Saunders, 1871 : 29 – *Polybothris splendidiventris* (Laporte de Castelnau et Gory) : Kerremans, 1892a : 75 – Alluaud, 1900b : 191 – *Psiloptera (Polybothris) splendidiventris* (Laporte de Castelnau et Gory) : Kerremans, 1903 : 102 – *Psiloptera splendidiventris* (Laporte de Castelnau et Gory) : Théry, 1905 : 21, 91 (Division II, Section V) – *Psiloptera (Polybothris) splendidiventris* (Laporte de Castelnau et Gory) : Kerremans, 1911b : 464 – Obenberger, 1926a : 198.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris (Erebodes) squalus* (Thomson, 1878)**

Erebodes squalus Thomson, 1878a : 331 – *Polybothris squalus* (Thomson) : Kerremans, 1885 : 131 ; 1892a : 75 – Alluaud, 1900b : 191 – *Psiloptera (Polybothris) squalus* (Thomson) : Kerremans, 1903 : 98 – *Psiloptera squalus* (Thomson) : Théry, 1905 : 19, 71 (Division II, Section IV) – *Psiloptera (Polybothris) squalus* (Thomson) : Kerremans, 1911b : 404 – Obenberger, 1926a : 198 ; 1928b : 170, pl. III, fig. 8 – Théry, 1930d : 51.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

nom indisponible / unavailable name : *proserpina* Künckel d'Herculais, 1890

Künckel d'Herculais, 1890 : pl. 44, fig. 1 – Kerremans, 1911b : 404 (synonyme de / synonym of *squalus*) – Obenberger, 1926a : 198.

• ***Polybothris (s. g. indef.) staudingeri* Théry, 1912**

Théry, 1912 : 111 – Obenberger, 1926a : 198.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris (s. g. indef.) strigithorax* (Obenberger, 1928)**

Psiloptera (Polybothris) strigithorax Obenberger, 1928b : 171.

Holotype : NMPC-21023.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris (Amphisbeta) stygia* Obenberger, 1942**

Polybothris (Amphisbeta) vitalisi var. *stygia* Obenberger, 1942b : 33 – Bellamy, 2003c : 60 (espèce valide / valid species).

Holotype : NMPC

Distribution : MADAGASCAR.

nom indisponible / unavailable name : *vitalisi* Obenberger

Obenberger (*nom. nud.*) – Bellamy, 2003c : 60.

• ***Polybothris (s. g. indef.) suarezina* (Obenberger, 1924)**

Psiloptera (Polybothris) suarezina Obenberger, 1924b : 62 – *Psiloptera (Polybothris) suarezina* Obenberger, 1926a : 198.

Holotype : NMPC-20932.

Distribution : MADAGASCAR NORD : Diégo-Suarez / Antsiranana.

• ***Polybothris (Cornelia) subelongata* (Thomson, 1878)**

Pycnobothis subelongata Thomson, 1878a : 342 – *Polybothris subelongata* (Thomson) : Kerremans, 1885 : 131 ; 1892a : 75 – Alluaud, 1900b : 191 – *Psiloptera (Polybothris) subelongata* (Thomson) : Kerremans, 1903 : 102 – *Psiloptera subelongata* (Thomson) : Théry, 1905 : 22, 102 (Division II, Section VI) – *Psiloptera (Polybothris) subelongata* (Thomson) : Kerremans, 1911b : 526, pl. 32, fig. 5 – Obenberger, 1926a : 198.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : Pays Antsianaka.

synonyme / synonym : *cyaneopyga* (Kerremans, 1894)

Psiloptera cyaneopyga Kerremans, 1894 : 345 – Alluaud, 1900b : 184 – *Psiloptera (Polybothris) cyaneopyga* (Kerremans) : Kerremans, 1903 : 100 – *Psiloptera cyaneopyga* (Kerremans) : Théry, 1905 : 21, 95 (Division II, Section VI) – *Psiloptera (Polybothris) cyaneopyga* (Kerremans) : Kerremans, 1911b : 526 – Obenberger, 1926a : 198.

Holotype : BMNH.

• ***Polybothris (s. g. indef.) subpropinqua* Théry, 1912**

Théry, 1912 : 116 – Obenberger, 1926a : 198.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris (Cornelia) subsilphoides* (Thomson, 1878)**

Pycnotheris subsilphoides Thomson, 1878a : 341 – Waterhouse 1880 : 194 – *Polybothris subsilphoides* (Thomson) : Kerremans, 1885 : 131 ; 1892a : 75 – Alluaud, 1900b : 191 – *Psiloptera (Polybothris) subsilphoides* (Thomson) : Kerremans, 1903 : 99 – *Psiloptera subsilphoides* (Thomson) : Théry, 1905 : 20, 86 (Division II, Section V) – *Psiloptera (Polybothris) subsilphoides* (Thomson) : Kerremans, 1911b : 517 – Obenberger, 1926a : 198.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris (s. g. indef.) sulcicollis* (Kerremans, 1903)**

Psiloptera sulcicollis Kerremans, 1903 : 95 (nom. nov. de / for *Polybothris cylindrica* Kerremans, 1899) – Théry, 1905 : 19, 71 (Division II, Section IV) – *Psiloptera (Polybothris) sulcicollis* (Kerremans) : Kerremans, 1911b : 548 – Obenberger, 1926a : 198.

Distribution : MADAGASCAR.

synonyme / synonym : *cylindrica* (Kerremans, 1899)

Polybothris cylindrica Kerremans, 1899 : 261 (nom. praeocc. par / by *Psiloptera cylindrica* Harold, 1878) – Alluaud, 1900b : 184 – Théry, 1905 : 19 (synonyme de / synonym of *sulcicollis*) – *Psiloptera (Polybothris) cylindrica* (Kerremans) : Kerremans, 1911b : 548 – Obenberger, 1926a : 198.

Holotype : BMNH.

• ***Polybothris (Polybothris) sumptuosa* (Klug, 1833)** (Pl. 6, fig. 41-44)

Buprestis sumptuosa Klug, 1833 : 52, pl. 2, fig. 1 ; 1834 : 140 – *Buprestis (Psiloptera) sumptuosa* Klug : Laporte de Castelnau et Gory, 1836 : 49, pl. 12, fig. 62 – *Polybothris sumptuosa* (Klug) : Spinola, 1837 : 117 – Gemminger et Harold, 1869 : 1364 – *Psiloptera sumptuosa* (Klug) : Saunders, 1871 : 28 – *Polybothris sumptuosa* (Klug) : Thomson, 1878a : 319 ; 1878b : 35 – Waterhouse 1880 : 180 – Künckel d'Herculais, 1890 : pl. 40, fig. 6 – Kerremans, 1892a : 76 ; 1894 : 341 – Alluaud, 1900b : 191 – *Psiloptera (Polybothris) sumptuosa* (Klug) : Kerremans, 1903 : 98 – *Psiloptera sumptuosa* (Klug) : Théry, 1905 : 18, 55 (Division II, Section I) – *Psiloptera (Polybothris) sumptuosa* (Klug) : Kerremans, 1911b : 445 – Obenberger, 1926a : 198 – Holyński, 1993a : 25.

Holotype : ZMHB.

Distribution : MADAGASCAR CENTRE : Antsirabe. MADAGASCAR EST : S.-P. de Moramanga, Andriaka. Pays Antsianaka.

synonyme / synonym : *croesus* (Dupont, 1833)

Buprestis croesus Dupont, 1833 : pl. 77 (nom. praeocc. par / by *Buprestis croesus* Villers 1789) – Spinola, 1837 : 117 – Gistel, 1848 : 128 – *Polybothris croesus* (Dupont) : Gemminger et Harold, 1869 : 1364 (synonyme de / synonym of *sumptuosa*) – *Psiloptera croesus* (Dupont) : Saunders, 1871 : 28 – *Polybothris croesus* (Dupont) : Kerremans, 1892a : 76 – Alluaud, 1900b : 179 – *Psiloptera (Polybothris) croesus* (Dupont) : Kerremans, 1903 : 98 – *Psiloptera croesus* (Dupont) : Théry, 1905 : 18 – *Psiloptera (Polybothris) croesus* (Dupont) : Kerremans, 1911b : 445 – Obenberger, 1926a : 198.

Holotype : MNHN.

synonyme / synonym : morosa (Gory, 1840)

Buprestis morosa Gory, 1840 : 96, pl. 17, fig. 94 – Gemminger et Harold, 1869 : 1364 (synonyme de / synonym of *sumptuosa*) – *Psiloptera sumptuosa* var. *morosa* (Gory) : Saunders, 1871 : 28 – *Polybothris morosa* (Gory) : Thomson, 1878a : 319 ; 1878b : 35 – Kerremans, 1892a : 76 – Alluaud, 1900b : 179 (synonyme de / synonym of *sumptuosa*) – *Psiloptera (Polybothris) morosa* (Gory) : Kerremans, 1903 : 98 – *Psiloptera morosa* (Gory) : Théry, 1905 : 18 – *Psiloptera (Polybothris) morosa* (Gory) : Kerremans, 1911b : 445 – Obenberger, 1926a : 198.

Holotype : MNHN.

synonyme / synonym : gloriosa Thomson, 1878

Thomson, 1878a : 321 – Kerremans, 1885 : 130 ; 1892a : 76 – Alluaud, 1900b : 179 (synonyme de / synonym of *sumptuosa*) – *Psiloptera (Polybothris) gloriosa* (Thomson) : Kerremans, 1903 : 98 – *Psiloptera gloriosa* (Thomson) : Théry, 1905 : 18 – *Psiloptera (Polybothris) gloriosa* (Thomson) : Kerremans, 1911b : 445 – *Psiloptera (Polybothris) sumptuosa* var. *gloriosa* (Thomson) : Obenberger, 1926a : 198.

Holotype : MNHN.

synonyme / synonym : superba Thomson, 1878

Thomson, 1878a : 322 – Kerremans, 1885 : 131 – Künckel d'Herculais, 1890 : pl. 44, fig. 12 – Kerremans, 1892a : 76 – Alluaud, 1900b : 180 (synonyme de / synonym of *sumptuosa*) – *Psiloptera (Polybothris) superba* (Thomson) : Kerremans, 1903 : 98 – *Psiloptera superba* (Thomson) : Théry, 1905 : 18 – *Psiloptera (Polybothris) superba* (Thomson) : Kerremans, 1911b : 445 – *Psiloptera (Polybothris) sumptuosa* var. *superba* (Thomson) : Obenberger, 1926a : 198.

Holotype : MNHN.

synonyme / synonym : gemma (Obenberger, 1928)

Psiloptera (Polybothris) sumptuosa var. *gemma* Obenberger, 1928b : 167 – Théry, 1930d : 50 (synonyme de / synonym of *gloriosa*).

Holotype : NMPC-20935.

synonyme / synonym : rutiliplaga (Obenberger, 1928)

Psiloptera (Polybothris) sumptuosa var. *rutiliplaga* Obenberger, 1928b : 167 – Théry, 1930d : 50 (synonyme de / synonym of *gloriosa*).


Holotype : NMPC-20937.

synonyme / synonym : iris Obenberger, 1942

Polybothris (s. str.) *sumptuosa* var. *iris* Obenberger, 1942b : 33.

Holotype : NMPC-20933.

synonyme / synonym : rubinifera Obenberger, 1942



Polybothris sumptuosa (Klug, 1833) (d'après/from Künckel d'Herculais in Grandidier, 1890).

Polybothris (s. str.) *sumptuosa* var. *ribinifera* Obenberger, 1942b : 33.

Holotype : NMPC-20934.

• ***Polybothris* (s. g. indef.) *surcoufi* Théry, 1912**

Théry, 1912 : 109 – Obenberger, 1926a : 198.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR NORD : Diégo-Suarez / Antsiranana.

• ***Polybothris* (s. g. indef.) *tacens* (Obenberger, 1917)**

Psiloptera (*Polybothrys*) *tacens* Obenberger, 1917b : 279 – *Psiloptera* (*Polybothris*) *tacens* Obenberger, 1926a : 199.

Holotype : NMPC.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris* (s. g. indef.) *tanamarivensis* (Obenberger, 1928)**

Psiloptera (*Polybothris*) *tanamarivensis* Obenberger, 1928b : 175.

Holotype : NMPC.

Distribution : MADAGASCAR CENTRE : Tananarive / Antananarivo.

• ***Polybothris* (*Coccinellopsis*) *terminalis* (Waterhouse, 1880)**

Coccinellopsis terminalis Waterhouse, 1880 : 192 – *Polybothris terminalis* (Waterhouse) : Kerremans, 1885 : 131 ; 1892a : 76 – Alluaud, 1900b : 191 – *Psiloptera* (*Polybothris*) *terminalis* (Waterhouse) : Kerremans, 1903 : 102 – *Psiloptera terminalis* (Waterhouse) : Théry, 1905 : 21, 89 (Division II, Section V) – *Psiloptera* (*Polybothris*) *terminalis* (Waterhouse) : Kerremans, 1911b : 510 – Obenberger, 1926a : 199.

Holotype : BMNH.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris* (s. g. indef.) *tetraleuca* Fairmaire, 1901**

Fairmaire, 1901 : 157 – *Psiloptera tetraleuca* (Fairmaire) : Théry, 1905 : 22, 104 (Division II, Section VI) – *Psiloptera* (*Polybothris*) *tetraleuca* (Fairmaire) : Kerremans, 1911b : 519 – Marie et Lesne, 1917 : 98 – Obenberger, 1926a : 199.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris* (s. g. indef.) *theryi* Meyer-Darcis, 1906**

Meyer-Darcis, 1906 : 36 – Obenberger, 1926a : 199.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris* (*Cornelia*) *thyris* Obenberger, 1942**

Obenberger, 1942b : 44.

Holotype : NMPC.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris (s. g. indef.) transversa* Fairmaire, 1902**

Fairmaire, 1902b : 345 – *Psiloptera transversa* (Fairmaire) : Théry, 1905 : 21, 92 (Division II, Section V) – *Psiloptera (Polybothris) transversa* (Fairmaire) : Kerremans, 1911b : 494 – Marie et Lesne, 1917 : 98 – Obenberger, 1926a : 199.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : Fort-Dauphin / Tolanaro.

• ***Polybothris (Cornelia) truncatella* (Waterhouse, 1880)**

Pycnotheris truncatella Waterhouse, 1880 : 195 – *Polybothris truncatella* (Waterhouse) : Kerremans, 1885 : 131 ; 1892a : 76 – Alluaud, 1900b : 191 – *Psiloptera (Polybothris) truncatella* (Waterhouse) : Kerremans, 1903 : 102 – *Psiloptera truncatella* (Waterhouse) : Théry, 1905 : 22, 102 (Division II, Section VI) – *Psiloptera (Polybothris) truncatella* (Waterhouse) : Kerremans, 1911b : 532 – Obenberger, 1926a : 199.

Holotype : BMNH.

Distribution : MADAGASCAR CENTRE : Tananarive / Antananarivo.

• ***Polybothris (s. g. indef.) truncatipennis* (Fairmaire, 1889)**

Psiloptera truncatipennis Fairmaire, 1889a : vii – *Polybothris truncatipennis* (Fairmaire) : Kerremans, 1892a : 76 – Alluaud, 1900b : 191 – *Psiloptera (Polybothris) truncatipennis* (Fairmaire) : Kerremans, 1903 : 100 – *Psiloptera truncatipennis* (Fairmaire) : Théry, 1905 : 21, 95 (Division II, Section VI) – *Psiloptera (Polybothris) truncatipennis* (Fairmaire) : Kerremans, 1911b : 524 – Marie et Lesne, 1917 : 103 – Obenberger, 1926a : 199.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris (s. g. indef.) vacheri* (Théry, 1909)**

Lampetis vacheri Théry, 1909 : 444 – *Psiloptera (Polybothris) vacheri* (Théry) : Obenberger, 1926a : 199.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR SUD : Androy septentrional, Imanombo.

• ***Polybothris (s. g. indef.) vermiculata* (Kerremans, 1911)**

Psiloptera (Polybothris) vermiculata Kerremans, 1911b : 463 – Obenberger, 1926a : 199.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris (Polybothris) videns* (Thomson, 1878)**

Pseudophthalma videns Thomson, 1878a : 325 – *Polybothris videns* (Thomson) : Kerremans, 1885 : 132 ; 1892a : 76 – Alluaud, 1900b : 191 – *Psiloptera (Polybothris) videns* (Thomson) : Kerremans, 1903 : 102 – *Psiloptera videns* (Thomson) :

Théry, 1905 : 22, 104 (Division II, Section VI) – *Psiloptera (Polybothris) videns* (Thomson) : Kerremans, 1911b : 566.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris (s. g. indef.) villettei* (Théry, 1926)**

Théry, 1926 : 129, fig. 5.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris (s. g. indef.) violaceiventris* (Kerremans, 1911)**

Psiloptera (Polybothris) violaceiventris Kerremans, 1911b : 513 – Obenberger, 1926a : 199.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris (Cornelia) viridichalybea* (Thomson, 1878)**

Pycnbothris viridichalybea Thomson, 1878a : 338 – *Polybothris viridichalybea* (Thomson) : Kerremans, 1885 : 132 ; 1892a : 76 – Alluaud, 1900b : 192 – *Psiloptera (Polybothris) viridichalybea* (Thomson) : Kerremans, 1903 : 102 – *Psiloptera viridichalybea* (Thomson) : Théry, 1905 : 22, 102 (Division II, Section VI) – *Psiloptera (Polybothris) viridichalybea* (Thomson) : Kerremans, 1911b : 539 – Obenberger, 1926a : 199.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Polybothris (Coccinellopsis) wautersi* (Théry, 1905)**

Psiloptera wautersi Théry, 1905 : 19, 75 (Division II, Section V) – *Psiloptera (Polybothris) wautersi* (Théry) : Kerremans, 1911b : 449 – Obenberger, 1926a : 200 – *Polybothris (Coccinellopsis) wautersi* (Théry) : 1942b : 42.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

synonyme / synonym : *haematurga* Obenberger, 1942

Polybothris (Coccinellopsis) wautersi var. *haematurga* Obenberger, 1942b : 42.

Holotype : NMPC.

synonyme / synonym : *metriostola* Obenberger, 1942

Polybothris (Coccinellopsis) wautersi var. *metriostola* Obenberger, 1942b : 42.

Holotype : NMPC.

• ***Polybothris (Coccinellopsis) zoufali* (Obenberger, 1928)**

Psiloptera (Polybothris) zoufali Obenberger, 1928b : 171 – *Polybothris (Coccinellopsis) zoufali* (Obenberger) : 1942b : 41.

Holotype : MRAC.

Distribution : MADAGASCAR.

synonyme / synonym : *actenia* Obenberger, 1942

Polybothris (Coccinellopsis) zoufali var. *actenia* Obenberger, 1942b : 41.

Holotype : NMPC.

Genre / Genus *Sororcula* Holyński, 1993

Sororcula Holyński, 1993b : 163 [Espèce type / Type species : *Sororcula gnomiphila* Holyński, 1993 (dénomination originale / original designation)] – Bellamy, 2003b : 48.

• *Sororcula gnomiphila* Holyński, 1993

Holyński, 1993b : 163.

Holotype : RHCP.

Distribution : MADAGASCAR SUD : S.-P. d'Ambovombe, Lavanono.

Genre / Genus *Icarina* Alluaud, 1896

Icarina Alluaud, 1896 : 34 (nom. nov. de / for *Icaria* Saunders, 1871) 1900 : 180 – Kerremans, 1903 : 103 – Théry, 1905 : 22, 104 – *Psiloptera (Polybothris)* Kerremans, 1911b : 567 – Obenberger, 1926a : 200 – Bellamy, 1985 : 417 – Kurosawa, 1993 : 581 – Bellamy, 1997 : 219 ; 2003b : 47.

Icaria Saunders, 1871 : 30 (nom. praeocc. par / by *Icaria* de Saussure 1853) [Espèce type / Type species : *Buprestis alata* Laporte de Castelnau et Gory, 1837 (monotypie / monotypy)] – Thomson, 1878a : 318 ; 1878b : 35 (*Apatea*, 3^e Division) – Kerremans, 1892a : 68 (*Polybothris*) – Alluaud, 1900b : 180 – Kerremans, 1903 : 103 ; 1911b : 567 – Obenberger, 1926a : 200 – Théry, 1943 : 149 – Bellamy, 1985 : 417 – Kurosawa, 1993 : 581 – Bellamy, 1997 : 219 ; 2003b : 47.

Icaria Deyrolle (*in litt.*) – Saunders, 1871 : 30.

Psiloptera (Icaria) : Kerremans, 1893c : 508 – Holyński, 1993a : 26.

• *Icarina alata* (Laporte de Castelnau et Gory, 1837)

Buprestis (Psiloptera) alata Laporte de Castelnau et Gory, 1837 : 74, pl. 19, fig. 99 – *Psiloptera alata* (Laporte de Castelnau et Gory) : Lacordaire, 1857 : 29 – *Polybothris alata* (Laporte de Castelnau et Gory) : Gemminger et Harold, 1869 : 1362 – *Psiloptera alata* (Laporte de Castelnau et Gory) : Saunders, 1871 : 30 – *Icaria alata* (Laporte de Castelnau et Gory) : Thomson, 1878a : 320 ; 1878b : 35 – Waterhouse 1880 : 180 – *Polybothris alata* (Laporte de Castelnau et Gory) : Künckel d'Herculais, 1890 : pl. 39, fig. 10 – *Polybothris alata* (Laporte de Castelnau et Gory) : Kerremans, 1892a : 68 – *Icarina alata* (Laporte de Castelnau et Gory) : Alluaud, 1900b : 180 – Kerremans, 1903 : 103 – Théry, 1905 : 22, 105 – Kerremans, 1911b : 570 – Obenberger, 1926a : 200 – Holyński, 1993a : 26.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

synonyme / synonym : *erosa* (Chevrolat, 1838)

Polybothris (?) *erosa* Chevrolat, 1838a : 68 – *Psiloptera erosa* (Chevrolat) : Lacordaire, 1857 : 29 – *Polybothris erosa* (Chevrolat) : Gemminger et Harold, 1869 : 1362 (synonyme de / synonym of *alata*) – *Psiloptera erosa* (Chevrolat) : Saunders, 1871 : 30 – *Icaria erosa* (Chevrolat) : Thomson, 1878a : 320 ; 1878b : 35 – *Polybothris erosa* (Chevrolat) : Kerremans, 1892a : 68 – Alluaud, 1900b : 179 ; 1903 : 103 – *Icarina erosa* (Chevrolat) : Théry, 1905 : 105 – Kerremans, 1911b : 570 – Obenberger, 1926a : 200.

Holotype : BMNH.

• *Icarina cottae* (Fairmaire, 1902)

Icaria cottae Fairmaire, 1902d : 346 – *Icarina cottae* (Fairmaire) : Théry, 1905 : 23, 105 – Kerremans, 1911b : 571, pl. 32, fig. 8 – Obenberger, 1926a : 200.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : Ampasimena, vallée d'Ambolo.

• *Icarina elongata* (Kerremans, 1893)

Psiloptera (*Icaria*) *elongata* Kerremans, 1893c : 508 ; 1903 : 103 – *Icarina elongata* (Kerremans) : Théry, 1905 : 23, 105 – Kerremans, 1911b : 569 – Obenberger, 1926a : 200.

Holotype : BMNH.

Distribution : MADAGASCAR.

Tribu / Tribe **Sphenopterini** Lacordaire, 1857

Sphenopterides (Buprestides vrais, Group IV) Lacordaire, 1857 : 68 – Obenberger, 1930 : 215 – Bellamy, 2003b : 42.

Sphenopterini Lacordaire, 1857 : 58 – Schaefer, 1949 : 95 – Cobos, 1986 : 195.

Sphenopterina Stein, 1868 : 62 ; – Jakobson 1912 : 773, 782 – Obenberger, 1930 : 215 – Holyński, 1988 : 51 – Bellamy, 2003b : 42.

Genre / Genus *Sphenoptera* Dejean, 1833

Sphenoptera Dejean, 1833 : 81 [Espèce type / Type species : *Buprestis antiqua* Illiger 1803 (dénomination ultérieure / subsequent designation : 102)] – Bellamy, 2003b : 42.

Sous-genre / Subgenus *Tropeopeltis* Jakovlev, 1902

Sphenoptera (*Tropeopeltis*) Jakovlev, 1902a : 283 [Espèce type / Type species : *Sphenoptera anthaxoides* Reitter 1895 (dénomination ultérieure / subsequent designation : 102)] – Bellamy, 2003b : 42.

Volkovitsh et Kalashian, 1994 : 104]] – Kerremans, 1903 : 111 ; 1912a : 7 ; 1913b : 1 – Obenberger, 1926b : 50 ; 1927 : 151 ; 1930 : 289 – Bellamy, 1985 : 418 – Volkovitsh et Kalashian, 1994 : 104 – Bellamy, 2003b : 44.

• ***Sphenoptera (Trobeopeltis) howa* Nonfried, 1892**

Nonfried, 1892 : 138 – Alluaud, 1900b : 192 (*hova*) – Kerremans, 1903 : 117 (*hova*) – Théry, 1905 : 23, 105 (*hova*) – Kerremans, 1913b : 44 – Obenberger, 1926b : 63 ; 1930 : 295. Obenberger, 1930 : 295.

Holotype : BMNH.

Distribution : MADAGASCAR.

synonyme / synonym : ***perrieri* Fairmaire, 1898**

Fairmaire, 1898 : 228 – Alluaud, 1900b : 192 – Kerremans, 1903 : 117 – Théry, 1905 : 23, 105 (synonyme de / synonym of *hova*) – Kerremans, 1913b : 44 – Obenberger, 1930 : 295.

Holotype : MNHN.

synonyme / synonym : ***madagascariensis* Jakovlev, 1900**

Jakovlev, 1900c : 437 – Kerremans, 1903 : 117 – Théry, 1905 : 23 – Kerremans, 1913b : 44 – Obenberger, 1930 : 295.

Holotype : ZMHB.

synonyme / synonym : ***insularis* Kerremans, 1898**

Kerremans, 1898b : 82 – Alluaud, 1900b : 192 – Jakovlev, 1902a : 296 – Kerremans, 1903 : 117 – Théry, 1905 : 23, 105 (variété de / variety of *hova*) – Kerremans, 1913b : 44 – Obenberger, 1930 : 295.

Holotype : ZINAS.

SOUS-FAMILLE / SUBFAMILY **BUPRESTINAE** LEACH, 1815

Bupresti Leach, 1815 : 85 – Bellamy, 2003b : 50.

Buprestides vrais (Group I) : Lacordaire, 1857 : 33 – Bellamy, 2003b : 50.

Buprestites Laporte de Castelnau, 1835 : 165 (part) – Kerremans, 1893a : 108 ; 1903 : 138 – Obenberger, 1930 : 36.

Buprestinae Cobos, 1980 : 21 – Kurosawa, 1985b : 3 – Bellamy, 1985 : 418 – Cobos, 1986 : 70, 111 – Tôyama, 1987 : 1 – Holyński, 1988 : 50 ; 1993a : 12 – Lawrence et Newton, 1995 : 842 – Bellamy, 2003b : 50.

Tribu / Tribe **Phrxiini** Cobos, 1975

Sous-tribu / Subtribe **Phrxiina** Cobos, 1975

Phrxiini Cobos, 1975 : 102 - Bellamy, 1985 : 414 - Levey, 1992 : 452 - Bellamy, 2003b : 55.

Phrxiina : Holyński, 1993a : 13, 27 - Bellamy, 1997 : 220 ; 2003b : 55.

Genre / Genus *Paraphrixia* Saunders, 1871

Paraphrixia Saunders, 1871 : 46 [Espèce type / Type species : *Buprestis purpurea* Olivier, 1790 (monotypie / monotypy)] - Kerremans, 1892a : 108 ; 1893a : 113 ; 1905 : 400 - Lesne, 1918 : 437 - Obenberger, 1926a : 37 - Théry, 1943 : 149 - Cobos, 1960 : 104 - Bellamy, 1985 : 414 - Levey, 1992 : 451 - Holyński, 1993a : 13, 27 - Bellamy, 2003b : 55.

Paraphrixia Cobos, 1955 : 4 (*lapsus*).

• ***Paraphrixia purpurea* (Olivier, 1790)**

Buprestis purpurea Olivier, 1790a : 23) - Herbst, 1801 : 195 - Schönherr, 1817 : 224 - *Apatura purpurea* (Olivier) : Laporte de Castelnau et Gory, 1837 : 7, pl. 2, fig. 11 - *Melanophila purpurea* (Olivier) : Gemminger et Harold, 1869 : 1385 - *Paraphrixia purpurea* (Olivier) : Saunders, 1871 : 46 - Kerremans, 1892a : 108 - Alluaud, 1900b : 194 - *Apatura purpurea* (Olivier) : Kerremans, 1902 : 20 - *Paraphrixia purpurea* (Olivier) : Kerremans, 1905 : 401, pl. 6, fig. 5 - Lesne, 1918 : 438 - Obenberger, 1926a : 37 - Théry, 1927 : 249 - Vinson, 1960 : 133 - Cobos, 1960 : 104 - Vinson, 1967 : 324 - Levey, 1992 : 451 - Gomy, 2000 : 61.

Holotype : MNHN.

Distribution : MASCAREIGNES : Maurice.

Tribu / Tribe **Thomassetiini** Bellamy, 1987

Thomassetiini Bellamy in Bellamy *et al.*, 1987 : 223.

Genre / Genus *Madassetia*, gen. nov.

Espèce type du genre / Genus type species : *Madassetia bicolor*, sp. nov. (nouvelle dénomination / new designation).

• ***Madassetia bicolor*, sp. nov.** (fig. 1-3)

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Vondrozo.

• *Madassetia unicolor*, sp. nov. (fig. 4, 5)

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : Perinet / Andasibe.

Tribu / Tribe **Anthaxiini** Gory et Laporte de Castelnau, 1839

Anthaxites Gory et Laporte de Castelnau, 1839 : 1 (6^e Groupe / 6th Group) – Kerremans, 1903 : 154 – Obenberger, 1930 : 423 – Théry, 1930e : 297 – Bellamy, 2003b : 66.

Anthaxiina Holyński, 1988 : 52 ; 1993a : 14 - Bellamy, 1997 : 220 - Bílý 2000 : 110 – Bellamy, 2003b : 66.

Genre / Genus *Anthaxia* Eschscholtz, 1829

Anthaxia Eschscholtz, 1829 : 9 [Espèce type / Type species : *Buprestis nitida* Rossi, 1793 (dénomination ultérieure / subsequent designation : Westwood, 1840 : 232)] – Descarpentries, 1967 : 31 (clé des espèces malgaches / Madagascan spp. key) – Bellamy, 2003b : 66.

Sous-genre / Subgenus *Haplanthaxia* Reitter, 1911

Haplanthaxia Reitter, 1911 : 187 [Espèce type / Type species : *Buprestis cichorii*, Olivier, 1790 (dénomination ultérieure / subsequent designation : Richter, 1949 : 66)] – Bellamy, 2003b : 67.

• *Anthaxia (Haplanthaxia) analabensis* Descarpentries, 1969

Descarpentries, 1969b : 925, fig. 16 – Bílý 1997 : 13, 44.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : forêt d'Analabe (42 km au nord de Sambava).

• *Anthaxia (Haplanthaxia) androyensis* Descarpentries, 1967

Descarpentries, 1967b : 40, fig. 12 – Bílý 1997 : 14, 45.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR SUD : Ambovombe.

• *Anthaxia (Haplanthaxia) antamponensis* Descarpentries, 1969

Descarpentries, 1969b : 923, fig. 15 – Bílý 1997 : 14, 46.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Mananara Nord, mont Antampona.

• ***Anthaxia (Haplanthaxia) bekilyensis* Descarpentries, 1967**

Descarpentries, 1967b : 37, fig. 9 - Bílý 1997 : 15, 51.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR CENTRE : Bekily.

• ***Anthaxia (Haplanthaxia) belalonensis* Descarpentries, 1969**

Descarpentries, 1969b : 922, fig. 13 - Bílý 1997 : 15, 51.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : Belalona (30 km au sud-ouest de Sambava).

• ***Anthaxia (Haplanthaxia) decorsei* Descarpentries, 1967**

Descarpentries, 1967b : 34, fig. 1, 4 - Bílý 1997 : 20, 64.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR CENTRE : Bekily. MADAGASCAR SUD : région d'Antanimora, Tsitevempoko.

• ***Anthaxia (Haplanthaxia) douquetteae* Descarpentries, 1969**

Descarpentries, 1969b : 924, fig. 14 - Bílý 1997 : 20, 66.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : Belalona (30 km au sud-ouest de Sambava).

• ***Anthaxia (Haplanthaxia) emmae* Descarpentries, 1967**

Descarpentries, 1967b : 47, fig. 23, 27 - Bílý 1997 : 21, 67.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Maroantsetra, Ambodivoany, Varingohitra ; S.-P. de Mananara Nord, Fahitrosy, mont Antampona, Antanambe.

• ***Anthaxia (Haplanthaxia) episcopalis* Théry, 1905**

Théry, 1905 : 108, pl. III, fig. 13 - Obenberger, 1917a : 184 ; 1930 : 541 - Descarpentries, 1967b : 45 - Bílý 1997 : 21, 68.

Holotype ♀ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR SUD : Ambovombe.

• ***Anthaxia (Haplanthaxia) fairmairella* Obenberger, 1928**

Obenberger, 1928b : 340 (nom. nov. de / for *Entomogaster cupriventris* Fairmaire, 1901) ; 1930 : 541 ; 1934b : 808 - Descarpentries, 1967 : 47, fig. 26 - Bílý 1997 : 21, 70.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR OUEST : région de Maevatanana, cause de Hukaru (nec de l'Ankara).

synonyme / synonym : *cupriventris* (Fairmaire, 1901)

Entomogaster cupriventris Fairmaire, 1901 : 162 (nom. praeocc. par / by *Anthaxia cupriventris* Marseul, 1865) - Kerremans, 1903 : 226 - Théry, 1905 : 24, 118 - Marie et

Lesne, 1917 : 46 – Obenberger, 1930 : 541 – *Anthaxia cupriventris* (Fairmaire), 1934b : 808 – Descarpentries, 1967 : 47 – Bílý 1997 : 62.

• ***Anthaxia (Haplanthaxia) hova* Théry, 1905**

Théry, 1905 : 23, 108, 178, pl. III, fig. 15 – Obenberger, 1917a : 184 ; 1930 : 542 – Descarpentries, 1967b : 45 (synonyme de / synonym of *episcopalis*) – Bílý 1997 : 24, 78 (howa).

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR SUD : Ambovombe.

• ***Anthaxia (Haplanthaxia) hydropica* Théry, 1905**

Théry, 1905 : 23, 107, pl. II, fig. 12 – Obenberger, 1917a : 184 ; 1930 : 542 – Descarpentries, 1967b : 40. – Bílý, 1997 : 25, 78.

Holotype ♀ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR SUD : S.-P. de Tuléar / Toliara, Andranolava.

• ***Anthaxia (Haplanthaxia) keiseri* Descarpentries, 1967**

Descarpentries, 1967b : 37, fig. 8 – Bílý 1997 : 26, 83.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR CENTRE : Ihosy.

• ***Anthaxia (Haplanthaxia) neocuris* (Fairmaire, 1901)**

Entomogaster neocuris Fairmaire, 1901 : 161 – Kerremans, 1903 : 226 – Théry, 1905 : 24, 119 – Marie et Lesne, 1917 : 46 – *Anthaxia neocuris* (Fairmaire) : Obenberger, 1928b : 340 ; 1930 : 543 ; 1934b : 808 – Descarpentries, 1967b : 42, fig. 14, 18 – Bílý 1997 : 96.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR OUEST : région de Maevatanana, cause de Hukaru (nec de l'Ankara).

• ***Anthaxia (Haplanthaxia) nitidiventris* Fairmaire, 1901**

Fairmaire, 1901 – Kerremans, 1903 : 177 – Théry, 1905 : 23, 106 – Marie et Lesne, 1917 : 9 – Obenberger, 1917a : 184 ; 1930 : 543 – Descarpentries, 1967b : 38, fig. 7, 10 – Bílý 1997 : 30, 97.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR OUEST : environs de Suberbieville [= Maevatanana], ouest d'Ambato-Boeni, Madirovalo.

• ***Anthaxia (Haplanthaxia) pauliani* Descarpentries, 1967**

Descarpentries, 1967b : 41, fig. 13 – Bílý 1997 : 31, 102.

Holotype ♀ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR OUEST : S.-P. de Morondava, forêt au sud de Befasy.

• ***Anthaxia (Haplanthaxia) perrieri* (Fairmaire, 1900)**

Entomogaster perrieri Fairmaire, 1900 : 243 – Kerremans, 1903 : 226 – Théry, 1905 : 24, 119 – Marie et Lesne, 1917 : 46 – *Anthaxia perrieri* (Fairmaire) : Obenberger, 1928b : 340 ; 1930 : 544 ; 1934b : 808 – Descarpentries, 1967b : 43, fig. 15, 19 – Bílý 1997 : 103.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR OUEST : environs de Suberbieville [= Maevatanana] ; S.-P. de Morondava, forêt au sud de Befasy. MADAGASCAR CENTRE : Bekily.

• ***Anthaxia (Haplanthaxia) peyrierasi* Descarpentries, 1967** (Pl. 5, fig. 40)

Descarpentries, 1967b : 49, fig. 24, 28 – Bílý 1997 : 32, 103.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Maroantsetra, Ambodivoangy ; S.-P. de Mananara Nord, Seranambe, Fahitrosy, mont Antampona, Antanambe ; S.-P. de Vondrozo, Vondrozo.

• ***Anthaxia (Haplanthaxia) raharizoninai* Descarpentries, 1967**

Descarpentries, 1967b : 39, fig. 11 – Bílý 1997 : 33, 108.

Holotype ♀ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR SUD : S.-P. d'Ambovombe, Antanimora.

• ***Anthaxia (Haplanthaxia) scabra* Théry, 1905**

Théry, 1905 : 23, 108, pl. III, fig. 14 – Obenberger, 1917a : 184 ; 1930 : 544 – Descarpentries, 1967b : 45, fig. 21 – Bílý 1997 : 35, 111.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR SUD : S.-P. d'Ambovombe, dunes d'Ambovombe à Betampy ; haut Manambovo, Ankoba.

• ***Anthaxia (Haplanthaxia) seyrigi* Descarpentries, 1967**

Descarpentries, 1967b : 44, fig. 16, 20 – Bílý 1997 : 35, 115.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR CENTRE : Bekily.

• ***Anthaxia (Haplanthaxia) sicardi* Descarpentries, 1967**

Descarpentries, 1967b : 36, fig. 3, 6 – Bílý 1997 : 35, 115.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR NORD : S.-P. de Diégo-Suarez / Antsiranana, montagne d'Ambre.

• ***Anthaxia (Haplanthaxia) succinicola* Descarpentries, 1967**

Descarpentries, 1967b : 46, fig. 17, 22 – Bílý 1997 : 36, 119.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR NORD : S.-P. de Diégo-Suarez / Antsiranana, montagne d'Ambre.

• ***Anthaxia (Haplanthaxia) vadoni* Descarpentries, 1967**

Descarpentries, 1967b : 50, fig. 25, 29 – Bílý 1997 : 38, 125.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Maroantsetra, Ankovana, Ambodivoangy, Varingohitra ; S.-P. de Mananara Nord, Seranambe, mont Antampona, Antanambe, Sahamadio.

• ***Anthaxia (Haplanthaxia) ventricosa* Théry, 1905**

Théry, 1905 : 23, 106 – Obenberger, 1917a : 184, 186 ; 1930 : 546 – Descarpentries, 1967b : 35, fig. 2, 5 – Bílý 1997 : 38, 125.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR SUD : Ambovombe.

Tribu / Tribe **Chrysobothrini** Gory et Laporte de Castelnau, 1838

« Chrysobothrites, Chrysobothridae » : Gory et Laporte de Castelnau, 1838 : 1 – Laporte de Castelnau, 1840 : 217 – Obenberger, 1934a : 571 – Schaefer, 1949 : 309 – Bellamy, 2003b : 71.

Chrysobothres LeConte, 1861 : 153 (Group IV) – Obenberger, 1934a : 572.

Chrysobothrites Kerremans, 1893a : 111 ; 1903 : 181 – Obenberger, 1934a : 572.

Chrysobothrini Stein, 1868 : 63 – Bellamy, 2003a : 71.

Chrysobothrina s. str. Jakobson, 1912 : 793 – Obenberger, 1934a : 572.

Chrysobothrina Holyński, 1993a : 14.

Actenodeidae Gistel, 1848b : cover-[3] – Bellamy, 2003b : 71.

Genre / Genus Chrysobothris Eschscholtz, 1829

Chrysobothris Eschscholtz, 1829 : 9 [Espèce type / Type species : *Buprestis chrysostigma* Linné 1758 (dénomination ultérieure / subsequent designation : Westwood, 1840 vide ICZN 1994 : 280)] – Bellamy, 2003b : 72.

Chrysobothris : Solier 1833 : 310 – Lesne, 1918 : 459 – Obenberger, 1928b : 287 ; 1934a : 578.

• ***Chrysobothris cyanicollis* Gory et Laporte de Castelnau, 1838**

Gory et Laporte de Castelnau, 1838 : 5, pl. 1, fig. 5 – Gemminger et Harold, 1869 : 1424 – Saunders, 1871 : 100 – Kerremans, 1892a : 210 ; 1893b : 255 – Alluaud,

1900b : 194 – Kerremans, 1903 : 189 – Théry, 1905 : 23, 109 – Obenberger, 1934a : 593 – Descarpentries, 1950 : 15, fig. 4b, 5d, e, f, pl. 2, fig. 4.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : environs de Tamatave / Toamasina ; environs de Maroantsetra, Andranofotsy, baie d'Antongil ; région de Soanierana.

• ***Chrysobothris dorsata* (Fabricius, 1787)**

Buprestis dorsata Fabricius, 1787 : 179 – *Chrysobothris dorsata* (Fabricius) : Gory et Laporte de Castelnau, 1838 : 6, pl. 1, fig. 7 – Gemminger et Harold, 1869 : 1425 – Saunders, 1871 : 100 – Kerremans, 1892a : 212 ; 1893b : 260 ; 1898a : 305 – Alluaud, 1900b : 194 – Kerremans, 1903 : 189 ; 1906b : 407 – Lesne, 1918 : 460 ; 1932 : 24 – Obenberger, 1934a : 593 – Descarpentries, 1950 : 13, fig. 4a, 5a, b, c – Vinson, 1960 : 141 – 1967 : 324 – Gomy, 2000 : 63.

Holotype : Fabricius catalogue 2522 HMUG.

Distribution : MADAGASCAR SAMBIRANO : Nossi-Bé / Nosy Be. MASCAREIGNES : Maurice, Port Louis, Mon Désert, Butte-à-l'herbe, Trou d'eau douce, Roches Noires ; la Réunion. SEYCHELLES. Largement répandu en Afrique subsaharienne et jusqu'au sud de la région paléarctique / Widely in sub-Saharan Africa et north into the southern Palaearctic region.

• ***Chrysobothris foveicollis* Kerremans, 1893**

Kerremans, 1893b : 257 – Alluaud, 1900b : 194 – Lesne, 1918 : 461 – Obenberger, 1934a : 594 – Descarpentries, 1950 : 18.

Holotype : BMNH.

Distribution : MASCAREIGNES : la Réunion.

• ***Chrysobothris guttata* (Olivier, 1790)**

Buprestis guttata Olivier, 1790a : 69 – *Chrysobothris guttata* (Olivier) : Dejean, 1833 : 79 ; 1836 : 90 – Gemminger et Harold, 1869 : 1425 – Saunders, 1871 : 100 – Kerremans, 1892c : 214 ; 1893b : 255 – Alluaud, 1900b : 194 – Kerremans, 1903a : 189 ; 1914h : 224 – Théry, 1926b : 165 – Obenberger, 1928a : 11 ; 1934 : 595 – Descarpentries, 1950 : 16, fig. 5g, l, pl. 2, fig. 6.

Holotype : inconnu / unknown.

Distribution : MADAGASCAR SUD : Tuléar / Toliara ; nord du pays Androy, Ambovombe, dans l'Androy ; bassin du Mandraré, Imanombo ; cap Andrahomana. MADAGASCAR EST : Fort-Dauphin / Tolanaro. Afrique orientale et méridionale / In Eastern and Southern Africa.

synonyme / synonym : *picticollis* Gory et Laporte de Castelnau, 1838

Gory et Laporte de Castelnau, 1838 : 4, pl. 1, fig. 4 – Gemminger et Harold, 1869 : 1425 – Saunders, 1871 : 100 – Kerremans, 1892c : 214 ; 1893b : 255 ; 1903a : 189 – Théry, 1926b : 165 – Obenberger, 1934a : 595.

Holotype : MNHN.

synonyme / synonym : *decorsei* Théry, 1905

Théry, 1905 : 23, 109, 179 – Obenberger, 1934a : 593 – Descarpentries, 1950 : 16.

Holotype : MNHN.

• **sous-espèce / subspecies** : *howas* Kerremans, 1893

Kerremans, 1893b : 255 – Alluaud, 1900b : 194 – Kerremans, 1903a : 189 – Théry, 1905 : 23, 109 (*hova*, variété de / variety of *cyanicollis*) – Obenberger, 1934a : 593 – Descarpentries, 1950 : 10 (sous-espèce de / subspecies of *guttata*), fig. 5j, pl. 2, fig. 1.

Holotype : MRAC.

Distribution : MADAGASCAR NORD : S.-P. de Diégo-Suarez / Antsiranana, montagne d'Ambre. MADAGASCAR OUEST : Maevatanana, Morondava. MADAGASCAR EST : massif de l'Antongonivitsika, pays Antsianaka.

Tribu / Tribe **Actenodini** Kerremans, 1890

Actenodites Kerremans, 1890 : cxxxv ; 1903 : 193 – Obenberger, 1934a : 658 – Bellamy, 2003b : 70.

Actenodina : Kerremans, 1893a : 111 – Obenberger, 1934a : 658 – Bellamy, 1985 : 422 – Holyński, 1993a : 14, 31.

Belionotina Jakobson, 1912 : 793 – Bellamy, 2003b : 70.

Genre / Genus Actenodes Dejean, 1833

Actenodes Dejean, 1833 : 80 [Espèce type / Type species : *Buprestis nobilis* Linné 1758 (par monotypie / by monotypy)] – Théry, 1905 : 23, 109 (révision des espèces malgaches / Madagascar spp. revision) – Descarpentries, 1950 : 18 (clé des espèces malgaches / Madagascar spp. key) – Bellamy, 2003b : 71.

• ***Actenodes acuminipennis* (Gory, 1841)**

Chrysobothris acuminipennis Gory, 1841 : 184, pl. 31, fig. 181 – Gemminger et Harold, 1869 : 1423 – Saunders, 1871 : 94 – Kerremans, 1892a : 200 ; 1893b : 244 – Alluaud, 1900b : 193 – Kerremans, 1903 : 194 – *Actenodes acuminipennis* (Gory) : Théry, 1905 : 23, 111 – Obenberger, 1934a : 665 – Descarpentries, 1950 : 34, fig. 6b, 11c-f, 12 ; 1974 : 582, fig. 5.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR NORD : S.-P. de Diégo-Suarez / Antsiranana, montagne d'Ambre. MADAGASCAR EST : forêt d'Antsianaka, Vohemar, forêts au nord de Fort-Dauphin / Tolanaro.

• ***Actenodes aeneus* (Gory, 1841)**

Chrysobothris aeneus Gory, 1841 : 185, pl. 31, fig. 182 – Gemminger et Harold, 1869 : 1423 – Saunders, 1871 : 93 – Kerremans, 1892a : 200 ; 1893b : 245 – Alluaud, 1900b : 193 – Kerremans, 1903 : 194 – *Actenodes aeneus* (Gory) : Théry, 1905 : 23, 111 ; –

Kerremans, 1914b : 351 – Obenberger, 1934a : 665 – Burgeon, 1941 : 203 – Descarpentries, 1950 : 35, fig. 13a-d.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : Andranofotsy, aux environs de Maroantsetra, massif de l'Antongonivitsika, baie d'Antongil, Fenerive / Feonarivo. République démocratique du Congo.

• ***Actenodes albifrons* Théry, 1905**

Théry, 1905 : 23, 111 – Obenberger, 1934a : 666 – Descarpentries, 1950 : 35 (synonyme de / synonym of *aenea*).

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Maroantsetra, baie d'Antongil.

• ***Actenodes alluaudi* Kerremans, 1894**

Kerremans, 1894 : 347 – Alluau, 1900b : 193 – Kerremans, 1903 : 195 – Théry, 1905 : 23, 110 – Obenberger, 1934a : 666 – Descarpentries, 1950 : 22, fig. 8a-d, pl. 2, fig. 8 ; 1958 : fig. 1f-j.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR NORD : S.-P. de Diégo-Suarez / Antsiranana, montagnes des Français.

• **sous-espèce / subspecies : *chloroderus* Alluau, 1900**

Alluau, 1900a : 18 – *Actenodes viridicollis* (sic) Alluau, 1900b : 193.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR OUEST : Bekodia.

synonyme / synonym : *chloroderus* Théry, 1905

Théry, 1905 : 23, 110 (variété de / variety of *alluaudi*, *nom. praeocc.* par / by *chloroderus* Alluau, 1900) – Obenberger, 1934a : 666 – Descarpentries, 1950 : 22 ; 1958 : 93.

Holotype : MNHN.

• **sous-espèce / subspecies : *vadoni* Descarpentries, 1950**

Descarpentries, 1950 : 22, 25.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR : sud, nord du Pays Androy, Port Faux Cap, Behara

nom indisponible / unavailable name : *androyensis* Descarpentries, 1950

Descarpentries, 1950 : fig. 8 (*nom. nud.*).

• ***Actenodes bourgini* Descarpentries, 1950**

Descarpentries, 1950 : 26, fig. 9a, b.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR CENTRE : Bekily.

• ***Actenodes circumdatus* (Gory, 1841)**

Chrysobothris circumdatus Gory, 1841 : 183, pl. 31, fig. 180 – Gemminger et Harold, 1869 : 1424 – Saunders, 1871 : 94 – Kerremans, 1892a : 201 – Alluaud, 1900b : 193 – Kerremans, 1903 : 194 – *Actenodes circumdatus* (Gory) : Théry, 1905 : 23, 111 – Obenberger, 1934a : 666 – Descarpentries, 1950 : 28, fig. 6a, 9g-j, pl. 2, fig. 7.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : baie d'Antongil, Antakotako, environs de Fenerive / Feonarivo et de Tamatave / Toamasina, Pays Antsianaka.

• ***Actenodes curvipes* (Gory, 1841)**

Chrysobothris curvipes Gory, 1841 : 179, pl. 30, fig. 174 – Gemminger et Harold, 1869 : 1424 – Saunders, 1871 : 94 – Kerremans, 1892a : 201 ; 1893b : 243 – Alluaud, 1900b : 193 – Kerremans, 1903 : 194 – *Actenodes curvipes* (Gory) : Théry, 1905 : 23, 111 – Obenberger, 1934a : 666 – Descarpentries, 1950 : 21, fig. 7e, f.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR CENTRE : Pays Antsianaka, Beloha.

• ***Actenodes frater* Théry, 1905**

Théry, 1905 : 23, 112, 179, pl. III, fig. 17 – Obenberger, 1934a : 666 – Descarpentries, 1950 : 31, fig. 10e-h.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR SUD : Behara, vallée de la rivière Mananhara, bas Mandrare dans l'Androy.

• ***Actenodes griveaudi* Descarpentries, 1958**

Descarpentries, 1958b : 93, fig. 2a-c ; 1966 : fig. 5.

Holotype ♀ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR OUEST : S.-P. d'Antsalova, forêt de l'Antsingy.

• ***Actenodes lemoulti* Théry, 1912**

Théry, 1912 : 117 – Obenberger, 1934a : 666 – Descarpentries, 1950 : 25, fig. 9c-f.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR NORD : Vohemar / Iharana.

• ***Actenodes milloti* Descarpentries, 1950**

Descarpentries, 1950 : 37, fig. 13e, f, 14a, pl. 2, fig. 3.

Holotype ♀ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR CENTRE : Bekily.

• ***Actenodes miribellus* Hoschek, 1927**

Hoschek, 1927 : 231 – Descarpentries, 1950 : 21, fig. 7a-d, pl. 2, fig. 2.

Holotype : ISNB.

Distribution : MADAGASCAR SUD : Befandriana-Nord. MADAGASCAR CENTRE : Bekily.

• ***Actenodes ornatcollis* Kerremans, 1893**

Kerremans, 1893b : 243 ; 1903 : 194 – Théry, 1905 : 23, 110 – Obenberger, 1934a : 666 – Descarpentries, 1950 : 29, fig. 10a-c, pl. 2, fig. 9.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : Pays Antsianaka, baie d'Antongil ; Antakotako, Fenerive / Feonarivo. MADAGASCAR CENTRE : Beloha, au nord de Tananarive / Antananarivo.

synonyme / synonym : *suavis* Brancsik, 1898

Brancsik, 1898 : 119 – Alluaud, 1900b : 193 – Kerremans, 1903 : 195 – Obenberger, 1934a : 666 – Descarpentries, 1950 : 29.

Holotype : MNHN (coll. R. Oberthür).

• ***Actenodes pauliani* Descarpentries, 1958**

Descarpentries, 1958b : 91, fig. 1a-e.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR OUEST : S.-P. d'Antsalova, forêt de l'Antsingy.

• ***Actenodes peyrierasi* Descarpentries, 1967**

Descarpentries, 1967 : 200, fig. 1-4.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Maroantsetra, Fampanambo.

• ***Actenodes pyropygus* Fairmaire, 1903**

Fairmaire, 1903b : 200 – Théry, 1905 : 23, 113 – Marie et Lesne, 1917 : 2 – Obenberger, 1934a : 667 – Descarpentries, 1950 : 32, fig. 11a, b, pl. 2, fig. 5.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Actenodes uniformis* Théry, 1905**

Théry, 1905 : 23, 112, pl. III, fig. 16 – Obenberger, 1934a : 667 – Descarpentries, 1950 : 38, fig. 13g, h, 14b.

Holotype ♀ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR SUD : Ambovombe, dans la partie méridionale de l'Androy.

• ***Actenodes viettei* Descarpentries, 1955**

Descarpentries, 1955 : 71.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : Fenerive / Fenoarivo.

• ***Actenodes viossati* Descarpentries, 1974**

Descarpentries, 1974 : 581, fig. 6.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : route de Moramanga à Anosibe / Anosibe-An'ala.

Genre / Genus *Belionota* Eschscholtz, 1829

Belionota Eschscholtz, 1829 : 9 [Espèce type / Type species : *Belionota sagittaria* Eschscholtz, 1829 (dénomination originale / original designation)] – Dejean, 1833 : 80 – Solier, 1833 : 306 – Laporte de Castelnau, 1835 : 165 – Dejean, 1836 : 90 – Gory et Laporte de Castelnau, 1838 : 1 – Laporte de Castelnau, 1840 : 217 – Imhoff, 1856 : 47 – Lacordaire, 1857 : 61 – Gemminger et Harold, 1869 : 1420 – Saunders, 1871 : 91 – Kerremans, 1890 : cxxxiv ; 1892a : 198 ; 1893a : 111 ; 1903 : 197 – Théry, 1905 : 23, 113 – Kerremans, 1909a : 33 – Lesne, 1918 : 462 – Théry, 1929a : 134 (révision / revision, clé des espèces / spp. key) – Obenberger, 1934a : 671 – Théry, 1934 : 250 – Descarpentries, 1950 : 39 (clé des espèces malgaches / Madagascan spp. key) – Bellamy, 1985 : 423 – Cobos, 1986 : 10 – Holyński, 1988 : 50 – Bellamy, 1991b : 343 – Holyński, 1993a : 14, 31 – Bellamy, 2003b : 71.

• *Belionota championi* Murray, 1862

Murray, 1862 : 451 – Gemminger et Harold, 1869 : 1420 – Saunders, 1871 : 92 – Kerremans, 1892a : 198 ; 1893b : 236 ; 1898a : 303 – Alluaud, 1900b : 193 (synonyme de / synonym of *canaliculata*) – Kerremans, 1903 : 197 – Théry, 1905 : 23, 113 (synonyme de / synonym of *canaliculata*) – Kerremans, 1909a : 33 – Théry, 1929a : 139 ; 1937b : 235 – Descarpentries, 1950 : 40 (synonyme de / synonym of *punctata*), fig. 16e, f – Bellamy, 1991b : 344.

Holotype : BMNH.

Distribution : MADAGASCAR EST : baie d'Antongil, région de Soanierana, environs de Tamatave / Toamasina, Pays Antsianaka. MADAGASCAR OUEST : Ankorika près de Port-Bergé, Maevatanana. Guinée. Congo Brazzaville. République démocratique du Congo. Angola. Mozambique. Afrique du Sud : Transvaal.

synonyme / synonym : *canaliculata* (Fabricius, 1787)

Buprestis canaliculata Fabricius, 1787 : 181 – Gmelin 1790 : 19 – 32 – Fabricius 1792 : 205 – Herbst, 1801 : 282 – Schönherr, 1817 : 251 – *Belionota canaliculata* (Fabricius) Gory et Laporte de Castelnau, 1838 : 7 – Lacordaire, 1857 : 62 – Gemminger et Harold, 1869 : 1420 – Saunders, 1871 : 92 (synonyme de / synonym of *championi*) – Kerremans, 1892a : 198 ; 1892b : 302 ; 1893b : 236 ; 1894 : 347 – Alluaud, 1900b : 193 – Kerremans, 1903 : 197 – Théry, 1905 : 23, 113 – Kerremans, 1906b : 407 ; 1909a : 33 ; 1911a : 89 ; 1913a : 444 ; 1913c : 579 – Lesne, 1918 : 464 – Théry, 1929a : 139 – Obenberger, 1934a : 672 – Théry, 1934 : 250 ; 1937b : 235 – Descarpentries, 1950 : 40 (synonyme de / synonym of *punctata*) – Bellamy, 1991b : 344.

Holotype : Fabricius catalogue 2545 BMNH.

erreur d'identification / misidentification : *canaliculata* Kerremans, 1898

Kerremans, 1898a : 303 – Théry, 1929a : 139 – Bellamy, 1991b : 344.

• **sous-espèce / subspecies** : *punctata* Silbermann, 1838

Silbermann, in Chevrolat, 1838 : 108 – Lacordaire, 1857 : 72 – Gemminger et Harold, 1869 : 1420 – Saunders, 1871 : 92 – Kerremans, 1892a : 198 ; 1893b : 239 (*Megactenodes*) ; 1898a : 303 (*Belionota*) – Alluaud, 1900b : 193 (synonyme de / synonym of *canaliculata*) – Kerremans, 1903 : 196 (*Megactenodes*) – Théry, 1905 : 23, 113 (synonyme de / synonym of *canaliculata*) – Kerremans, 1909a : 32 (*Belionota*) ; 1912b :

7 (*Megactenodes*) – Obenberger, 1918b : 14 ; 1934a : 669 – Théry, 1937b : 235 (*Belionota*) – Descarpentries, 1950 : 40, fig. 15, 16a-d.

Holotype : inconnu / unknown.

Distribution : République démocratique du Congo.

synonyme / synonym : *madagascariensis* Théry, 1898

Théry, 1898b : 58 (variété de / variety of *canaliculata*) – Alluaud, 1900b : 193 – Théry, 1905 : 23, 113 ; 1929a : 140 ; 1934 : 250 ; 1937b : 235 – Descarpentries, 1950 : 40 (synonyme de / synonym of *punctata*) – Bellamy, 1991b : 344.

Holotype : MNHN.

nom indisponible / unavailable name : *madagascariensis* Lesne

Belionota canaliculata var. *madagascariensis* Lesne – Bellamy, 1991b : 344.

nom indisponible / unavailable name : *aurata* Théry

Belionota canaliculata var. *aurata* Théry – Burgeon, 1941 : 208.

Holotype : MNHN.

• ***Belionota prasina* (Thunberg, 1789)**

Buprestis prasina Thunberg, 1789a : 90 – *Belionota prasina* (Thunberg) Lacordaire, 1857 : 72 – Gemminger et Harold, 1869 : 1420 – Saunders, 1871 : 92 – Kerremans, 1892a : 199 – Alluaud, 1900b : 193 – Kerremans, 1903 : 197 – Théry, 1905 : 113 – Jakobson 1912 : 794 – Kerremans, 1912a : 204 – Lesne, 1918 : 463 – Théry, 1929a : 141 – Obenberger, 1934a : 675 – Théry, 1934 : 250 – Descarpentries, 1950 : 43, fig. 16g-i – Vinson, 1960 : 141 ; 1967 : 324 – Bellamy, 1991b : 344 – Gomy, 2000 : 62.

Holotype : UZIU.

Distribution : MASCAREIGNES : Maurice, Mon Désert, Moka, Trou d'eau douce ; la Réunion, Saint-Denis. SEYCHELLES : Mahe, Praslin. Largement répandu en Asie tropicale et en Australasie / Widely in Tropical Asia and Australasia.

SOUS-FAMILLE / SUBFAMILY **AGRILINAE** LAPORTE DE CASTELNAU, 1835

Agrilites Laporte de Castelnau, 1835 : 165 – Gory et Laporte de Castelnau, 1837 : 1. (5^e Groupe / 5th Group) – Laporte de Castelnau, 1840 : 219 – Chevrolat, 1838a : 84 – Jacquelin du Val 1863 : 102, 106, 108 – Deyrolle, 1864 : 113 – Kerremans, 1903 : 217 – Théry, 1930e : 384 – Bellamy, 2003b : 73.

Agrilidae Laporte de Castelnau, 1835 : 165 – Gory et Laporte de Castelnau, 1837 : 1 – Bellamy, 2003b : 73.

Agrilinae Laporte de Castelnau, 1835 : 165 – Gory et Laporte de Castelnau, 1837 : 1 – Bellamy, 1985 : 423 – Cobos, 1986 : 72, 209 – Holyński, 1988 : 50 ; 1993a : 14 – Lawrence et Newton, 1995 : 843 – Bellamy, 2003b : 73.

Agrilides Lacordaire, 1857 : 165 – Bellamy, 2003b : 73.

Tribu / Tribe **Coraebini** Bedel, 1921

Coraebini Bedel, 1921 : 170 – Obenberger, 1924b : 18 – Portevin, 1931 : 325 – Obenberger, 1934b : 786 – Schaefer, 1949 : 318 – Bellamy, 1985 : 424 – Cobos, 1986 : 209 – Bellamy, 1988 : 110 ; 2001a : 57 ; 2003b : 73.

Sous-tribu / Subtribe **Toxoscelina** Majer, 2000

Toxoscelina Majer, in Kubáň et al., 2001 : 207 – Bellamy, 2003b : 73.

Genre / Genus **Brachydora** Obenberger, 1923

Brachydora Obenberger, 1923 : 30 [Espèce type / Type species : *Brachydora monstrum* Obenberger, (dénomination originale / original designation)] ; 1934b : 794 – Bellamy, 1985 : 423 ; 2001a : 59 ; 2003b : 75.

• ***Brachydora crassa* Théry, 1937**

Théry, 1937a : 87, fig. 3 – Bellamy, 2001a : 59.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR CENTRE : Mahatsinjo (nec Mahasingo).

• ***Brachydora deformis* (Fairmaire, 1901)**

Discoderes deformis Fairmaire, 1901 : 163 – Kerremans, 1903 : 223 – *Paradora deformis* (Fairmaire) : Théry, 1905 : 25, 125 – *Discoderes deformis* (Fairmaire) : Marie et Lesne, 1917 : 40 – *Brachydora deformis* (Fairmaire) : Obenberger, 1923 : 32 ; 1934b : 795 – Bellamy, 2001a : 59.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR OUEST : S.-P. de Maevatanana, cause de Hukaru (nec de l'Ankara).

• ***Brachydora granulum* (Fairmaire, 1902)**

Discoderes granulum Fairmaire, 1902d : 350 – Théry, 1905 : 24, 116 – Marie et Lesne, 1917 : 40 – *Brachydora granulum* (Fairmaire) : Obenberger, 1928b : 342 ; 1934b : 795 – Bellamy, 2001a : 59.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR OUEST : S.-P. d'Ambato-Boeni, Ankirihitra (nec Ankarahitra).

• ***Brachydora monstrum* Obenberger, 1923**

Obenberger, 1923 : 31 ; 1934b : 795 – Bellamy, 2001a : 59.

Holotype : NMPC-23588.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Brachydora sicardi* (Théry, 1912)**

Paradora sicardi Théry, 1912 : 118 – *Brachydora sicardi* (Théry) : Obenberger, 1923 : 31 ; 1934b : 795 – Bellamy, 2001a : 59.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR NORD : S.-P. de Diégo-Suarez / Antsiranana, montagne d'Ambre.

Genre / Genus *Compsoglypha* Fairmaire, 1904

Compsoglypha Fairmaire, 1904 : 233 [Espèce type / Type species : *Compsoglypha perrieri* Fairmaire, (monotypie / monotypy)] – Théry, 1905 : 28, 177 – Obenberger, 1934b : 75 – Bellamy, 1985 : 423.

Compsoglypta Kerremans, 1910 : 3 (synonym of *Psiloptera*), 347 – 1911b : 347 (synonym of *Polybothris*) – Marie et Lesne, 1917 : 30 – Obenberger, 1926a : 197 (synonym of *Polybothris*) ; 1928b : 339 ; 1934b : 795 – Bellamy, 1985 : 423 – Kurosawa, 1993 : 581 – Bellamy, 2001a : 59 ; 2003b : 75.

• ***Compsoglypha nigrocaerulea*, sp. nov.** (fig. 6-8)

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR OUEST : est de Sakaraha, rés. du Zombisy

• ***Compsoglypha perrieri* Fairmaire, 1904**

Fairmaire, 1904 : 233 – Théry, 1905 : 28, 177 – Marie et Lesne, 1917 : 30 – *Polybothris perrieri* (Fairmaire) : Obenberger, 1926a : 197 ; 1928b : 339 – *Compsoglypta* (sic) *perrieri* Fairmaire : Obenberger, 1934b : 795 – Bellamy, 2001a : 59.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR OUEST : région de l'Ambongo.

synonyme / synonym : *sculpticollis* (Kerremans, 1911)

Psiloptera (*Polybothris*) *sculpticollis* Kerremans, 1911b : 347 (nom. superfl. de / for *perrieri* Fairmaire, 1904) – *Polybothris sculpticollis* (Kerremans) : Obenberger, 1926a : 197 ; 1928b : 339 (synonyme de / synonym of *perrieri*) – *Compsoglypta* (sic) *sculpticollis* (Kerremans) : Obenberger, 1934b : 795 – Bellamy, 2001a : 59.

Holotype : MNHN.

Genre / Genus *Suarezia* Théry, 1912

Suarezia Théry, 1912 : 119 [Espèce type / Type species : *Suarezia albicollis* Théry (monotypie / monotypy)] – Obenberger, 1922 : 127 ; 1934b : 795 – Théry, 1936a : 60 – Bellamy, 1985 : 423 ; 2001a : 66 ; 2003b : 80.

Suarezina Théry, 1936a : 60 (nom. nov. de / for *Suarezia* Théry, 1912, nom. superfl.) – Bellamy, 1985 : 423 ; 2001a : 66 ; 2003b : 80.

• ***Suarezia albicollis* Théry, 1912**

Théry, 1912 : 120 – Obenberger, 1934b : 795 – Bellamy, 2001a : 66.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR NORD : S.-P. de Diégo-Suarez / Antsiranana.

Genre / Genus *Gigantocoraebus* Obenberger, 1942

Gigantocoraebus Obenberger, 1942a : 12 [Espèce type / Type species : *Buprestis lumbaris* Klug (dénomination originale / original designation)] – Bellamy, 1985 : 425 ; 2001a : 62 ; 2003b : 77.

• ***Gigantocoraebus lumbaris* (Klug, 1833)**

Buprestis lumbaris Klug, 1833 : 62, pl. 2, fig. 12 – Gemminger et Harold, 1869 : 1431 (*Coraebus*) – *Discoderes lumbaris* (Klug) : Saunders, 1871 : 109 – Kerremans, 1892a : 236 – Alluaud, 1900b : 197 – *Phlocteis lumbaris* (Klug) : Kerremans, 1903 : 257 – Théry, 1905 : 25, 125 – Obenberger, 1934b : 798 – *Gigantocoraebus lumbaris* (Klug) : 1942a : 13, fig. 5 – Bellamy, 2001a : 62.

Holotype : ZMHB.

Distribution : MADAGASCAR EST : Midongy du Sud / Midongy Atsimo.

Genre / Genus *Paradora* Kerremans, 1900

Paradora Kerremans, 1900a : 323 [Espèce type / Type species : *Buprestis pumicatus* Klug (dénomination ultérieure / subsequent designation : Bellamy, 1997b : 76)] ; 1903 : 248 – Théry, 1905 : 25, 124 – Obenberger, 1922 : 127 ; 1934b : 796 (synonyme de / synonym of *Phlocteis*) ; 1935d : 87 – Bellamy, 1985 : 424 ; 1986 : 128 ; 1991g : 5 ; 1997b : 76 ; 2001a : 63 ; 2003b : 78.

Sous-genre / Subgenus *Speophora* Théry, 1937

Paradora (*Speophora*) Théry, 1937a : 91 [Espèce type / Type species : *Paradora* (*Speophora*) *seyrigi* Théry (monotypie / monotypy)] – Bellamy, 1985 : 424 ; 1997b : 77 ; 2001a : 64 ; 2003b : 78.

• ***Paradora* (*Speophora*) *corinthia* (Fairmaire, 1901)**

Discoderes corinthia Fairmaire, 1901 : 162 – Kerremans, 1903 : 223 – Théry, 1905 : 24, 115 – Marie et Lesne, 1917 : 40 – *Phlocteis corynthius* (sic) (Fairmaire) : Obenberger, 1928b : 341 – Obenberger, 1934b : 796 (*corynthia*) – *Paradora corinthia* (Fairmaire) : Bellamy, 1997b : 77 – Bellamy, 2001a : 64.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR OUEST : région de Maevatanana ; Belombe. MADAGASCAR CENTRE : Bekily. MADAGASCAR SUD.

synonyme / synonym : *seyrigi* Théry, 1937

Théry, 1937a : 92, fig. 5 – Bellamy, 1997b : 77 ; 2001a : 64.

Holotype : MNHN.

• ***Paradora (s. str.) impetigiosus* (Gory, 1841)**

Coraeus impetigiosus Gory, 1841 : 277, pl. 46, fig. 269 – *Discoderes impetigiosus* (Gory) : Kerremans, 1892a : 236 – *Paradora impetigiosus* (Gory), 1900a : 323 ; 1903 : 248 – Obenberger, 1935d : 87 – Bellamy, 1997b : 76 ; 2001a : 64.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Paradora (s. str.) pumicatus* (Klug, 1833)**

Buprestis pumicatus Klug, 1833 : 62 – *Coraeus pumicatus* (Klug) : Gory et Laporte de Castelnau, 1839 : 6, pl. 1, fig. 6 – Gemminger et Harold, 1869 : 1431 – *Discoderes pumicatus* (Klug) : Saunders, 1871 : 109 – Kerremans, 1892a : 237 – Alluaud, 1900b : 197 – *Paradora pumicatus* (Klug) : Kerremans, 1900a : 323 ; 1903 : 248 – Théry, 1905 : 25, 124 – *Phlocteis pumicatus* (Klug) : Obenberger, 1934b : 799 ; 1935d : 87 – *Paradora pumicatus* (Klug) : Bellamy, 1997b : 76 ; 2001a : 64.

Holotype : ZMHB

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Paradora (s. str.) saxosicollis* (Fairmaire, 1897)**

Discoderes saxosicollis Fairmaire, 1897 : 381 – Alluaud, 1900b : 197 – *Paradora saxosicollis* (Fairmaire) : Kerremans, 1900a : 323 ; 1903 : 249 – Théry, 1905 : 25, 124 – *Discoderes saxosicollis* (Fairmaire) : Marie et Lesne, 1917 : 40 – *Phlocteis saxosicollis* (Fairmaire) : Obenberger, 1928b : 341 ; 1934b : 799 ; 1935d : 87 – *Paradora saxosicollis* (Fairmaire) : Bellamy, 1997b : 76 ; 2001a : 64.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR OUEST : Suberbieville [= Maevatanana].

• ***Paradora (s. str.) zonata* (Kerremans, 1899)**

Phlocteis zonata Kerremans, 1899 : 277 – Alluaud, 1900b : 198 – *Paradora zonata* (Kerremans) : Kerremans, 1900a : 323 ; 1903 : 249 – Théry, 1905 : 25, 124 – *Phlocteis zonata* (Kerremans) : Obenberger, 1934b : 799 ; 1935d : 87 – *Paradora zonata* (Kerremans) : Bellamy, 1997b : 76 ; 2001a : 64.

Holotype : BMNH.

Distribution : MADAGASCAR.

Genre / Genus *Paranastella* Obenberger, 1931

Paranastella Obenberger, 1931b : 198 [Espèce type / Type species : *Paranastella strandi* Obenberger, (dénomination originale / original designation)] ; 1934b : 808 – Descarpentries, 1984 : 57 – Bellamy, 1985 : 424 ; 2001a : 64 ; 2003b : 78.

• ***Paranastella strandi* Obenberger, 1931 (fig. 16, 17)**

Obenberger, 1931b : 198 ; 1934b : 808 – Descarpentries, 1984 : 58, fig. 3 – Bellamy, 2001a : 64.

Holotype : NMPC-23632.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Paranastella villiersi* Descarpentries, 1984** (fig. 18, 19)

Descarpentries, 1984 : 57, fig. 1, 2 – Bellamy, 2001a : 64.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : presqu'île de Masoala, massif de l'Ambohitsitondrona, Hiaraka.

• ***Paranastella viridis*, sp. nov.** (fig. 20, 21)

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : Perinet / Andasibe.

Genre / Genus *Entomogaster* Saunders, 1871

Entomogaster Saunders, 1871 : 102 [Espèce type / Type species : *Anthaxia sexpunctatus* Gory et Laporte de Castelnau, (monotypie / monotypy)] – Kerremans, 1892a : 223 ; 1893a : 122 – Fairmaire, 1899a : 114 (description) – Kerremans, 1900a : 319 ; 1903 : 225 – Théry, 1905 : 24, 117 – Obenberger, 1928b : 340 – Théry, 1930b : 168 – Obenberger, 1934b : 808 – Théry, 1943 : 149 – Bellamy, 1985 : 424 – Holyński, 1993a : 15 – Bellamy, 1997b : 78 ; 2001a : 60 ; 2003b : 76.

Entomoderes (sic) Fairmaire, 1903a : 30 (lapsus pour / for *Entomogaster*) ; 1903b : 201 – Marie et Lesne, 1917 : 45 ; 2003b : 76.

• ***Entomogaster aequalipennis* Obenberger, 1931**

Obenberger, 1931b : 197 ; 1934b : 808 – Bellamy, 2001a : 60.

Holotype : NMPC-23631.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Entomogaster amplicollis* Fairmaire, 1900**

Fairmaire, 1900 : 243 – Kerremans, 1900a : 319 ; 1903 : 226 – Théry, 1905 : 24, 118 – Marie et Lesne, 1917 : 46 – Obenberger, 1928b : 340 ; 1934b : 808 – Bellamy, 2001a : 60.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR OUEST : environs de Suberbieville [= Maevatanana].

• ***Entomogaster apollo* Obenberger, 1946**

Obenberger, 1946 : 160 – Bellamy, 2001a : 61.

Holotype : NMPC.

Distribution : MADAGASCAR SAMBIRANO : Ambanja.

• ***Entomogaster asperula* Théry, 1905**

Théry, 1905 : 24, 120, 179, pl. IV, fig. 20 – Obenberger, 1928b : 340 ; 1934b : 808 – Bellamy, 2001a : 61.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Entomogaster carli* Théry, 1936**

Théry, 1936b : 697, fig. 1 – Bellamy, 2001a : 61.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Entomogaster descarpentriesi* Théry, 1937**

Théry, 1937a : 95, fig. 6 – Bellamy, 2001a : 61.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR OUEST : Marovoay.

• ***Entomogaster funebris* Théry, 1937**

Théry, 1937a : 98, fig. 8 – Bellamy, 2001a : 61.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR CENTRE : Ambositra.

• ***Entomogaster grandis* Théry, 1937**

Théry, 1937a : 100, fig. 9 – Bellamy, 2001a : 61.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR CENTRE : Tananarive / Antananarivo.

• ***Entomogaster griseofasciata* Obenberger, 1946**

Obenberger, 1946 : 162 – Bellamy, 2001a : 61.

Holotype : NMPC.

Distribution : MADAGASCAR CENTRE : Tananarive / Antananarivo.

• ***Entomogaster hoschecki* Théry, 1937**

Théry, 1937a : 96, fig. 7 – Bellamy, 2001a : 61.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR : « Melou » ? « Belako » ?¹

• ***Entomogaster iris* Obenberger, 1946**

Obenberger, 1946 : 160 – Bellamy, 2001a : 61.

Holotype : NMPC

Distribution : MADAGASCAR EST : Perinet / Andasibe, forêt Analamazotra.

• ***Entomogaster kerremansi* Fairmaire, 1899**

Fairmaire, 1899a : 115 – Kerremans, 1900a : 319 – Alluaud, 1900b : 197 – Kerremans, 1903 : 225 – Théry, 1905 : 24, 118 – Marie et Lesne, 1917 : 46 – Obenberger, 1928b : 340 ; 1934b : 808 – Bellamy, 1997b : 78 ; 2001a : 61.

¹ Impossible à localiser / Impossible to find any locality on any map. « Un exemplaire donné par le Baron Hoscheck provenant des chasses de Melou ; un outre de Belako (Coll. Sicord → coll. du Museum) » (Théry, 1937). « Melou » et « Belako » pourraient être... les noms des collecteurs ! / « Melou » and « Belako » may be... the names of the collectors!

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : Fort-Dauphin / Tolanaro.

nom indisponible / unavailable name : *lantzi* Théry

Théry, teste Obenberger, 1928b : 340 – Obenberger, 1934b : 808 – Bellamy, 2001a : 61.

Holotype : inconnu / unknown.

• ***Entomogaster maculipicta* Obenberger, 1931**

Obenberger, 1931b : 197 ; 1934b : 808 – Bellamy, 2001a : 61.

Holotype : NMPC-23630.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Entomogaster mandrakana* Obenberger, 1946**

Obenberger, 1946 : 161 – Bellamy, 2001a : 61.

Holotype : NMPC.

Distribution : MADAGASCAR CENTRE : La Mandraka.

• ***Entomogaster mocquerysi* Théry, 1905**

Théry, 1905 : 24, 120 – Obenberger, 1928b : 340 ; 1934b : 808 – Bellamy, 2001a : 61.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Maroantsetra, baie d'Antongil.

• ***Entomogaster modestus* Fairmaire, 1899**

Fairmaire, 1899a : 115 – Kerremans, 1900a : 319 – Alluaud, 1900b : 198 – Kerremans, 1903 : 226 – Théry, 1905 : 24, 118 – Marie et Lesne, 1917 : 46 – Obenberger, 1928b : 340 ; 1934b : 808 – Bellamy, 1997b : 78 ; 2001a : 61.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Entomogaster octoguttata* (Kerremans, 1894)**

Agrilus octoguttatus Kerremans, 1894 : 353 – *Entomogaster octoguttatus* (Kerremans) : Fairmaire, 1899a : 116 – Kerremans, 1900a : 319 – Alluaud, 1900b : 198 – Kerremans, 1903 : 225 – Théry, 1905 : 24, 118 – *Agrilus octoguttatus* (Kerremans) : Marie et Lesne, 1917 : 4 – *Entomogaster octoguttatus* (Kerremans) : Obenberger, 1928b : 340 ; 1934b : 809 – Bellamy, 2001a : 61.

Holotype : BMNH.

Distribution : MADAGASCAR NORD : S.-P. de Diégo-Suarez / Antsiranana.

• ***Entomogaster posticalis* (Fairmaire, 1903)**

Entomoderes posticalis Fairmaire, 1903a : 29 – *Entomogaster posticalis* (Fairmaire) : 1903b : 201 – Théry, 1905 : 24, 119 – Marie et Lesne, 1917 : 45, 46 – Obenberger, 1928b : 340 ; 1934b : 809 – Bellamy, 2001a : 61.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR OUEST : S.-P. d'Ambato-Boeni, Ankirihitra (*nec* Ankarahitra).

• ***Entomogaster pumilio* Obenberger, 1946**

Obenberger, 1946 : 163 – Bellamy, 2001a : 61.

Holotype : NMPC.

Distribution : MADAGASCAR SAMBIRANO : Nossi-Bé / Nosy Be.

• ***Entomogaster sexpunctata* (Gory et Laporte de Castelnau, 1839)**

Anthaxia sexpunctata Gory et Laporte de Castelnau, 1839 : 36, pl. 8, fig. 51 – Gemminger et Harold, 1869 : 1391 – *Entomogaster sexpunctatus* (Gory et Laporte de Castelnau) : Saunders, 1871 : 102 – Kerremans, 1892a : 223 ; 1893a : 122 ; 1900a : 319 – Alluaud, 1900b : 198 – Kerremans, 1903 : 226 – Théry, 1905 : 24, 119 – Obenberger, 1928b : 340 ; 1934b : 809 – Bellamy, 1997b : 78 ; 2001a : 61.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

Genre / Genus *Eumorphocerus* Théry, 1930

Eumorphocerus Théry, 1930b : 166 [Espèce type / Type species : *Eumorphocerus laticornis* Théry, (monotypie / monotypy)] – Obenberger, 1934b : 809 – Descarpentries, 1968 : 934 (clé des sous-espèces / subspecies key) – Bellamy, 1985 : 424 ; 2001a : 61 ; 2003b : 77.

• ***Eumorphocerus costipennis* Descarpentries, 1968**

Descarpentries, 1968 : 935 – Bellamy, 2001a : 62.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : Vondrozo.

• ***Eumorphocerus laticornis* Théry, 1930**

Théry, 1930b : 167 – Obenberger, 1934b : 809 – Descarpentries, 1968 : 934, 935 – Bellamy, 2001a : 62.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR OUEST : S.-P. d'Analalava, forêt de Bejolo.

• ***Eumorphocerus peyrierasi* Descarpentries, 1968**

Descarpentries, 1968 : 935, fig. 15 – Bellamy, 2001a : 62.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Mananara Nord, Seranambe.

• ***Eumorphocerus vadoni* Descarpentries, 1968**

Descarpentries, 1968 : 935, fig. 14 – Bellamy, 2001a : 62.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Mananara Nord, Amboditavolo.

Genre / Genus *Coraebastus* Fairmaire, 1896

Coraebastus Fairmaire, 1896: 456 [Espèce type / Type species: *Coraebastus quinquepustulatus* Fairmaire, 1896 (monotypie / monotypy)] – Kerremans, 1903: 223 – Théry, 1905: 24, 116 – Marie et Lesne, 1917: 31 – Obenberger, 1934b: 809 – Descarpentries, 1979: 107 – Bellamy, 1985: 424 – Cobos, 1986: 71 – Bellamy, 2001a: 59; 2003b: 76.

Annietta Obenberger, 1931b: 184 [Espèce type / Type species: *Annietta imperatrix* Obenberger, (dénomination originale / original designation)]; 1934b: 809 – Descarpentries, 1978: 108 (synonyme de / synonym of *Coraebastus*) – Bellamy, 1985: 424; 2001a: 60; 2003b: 76.

• *Coraebastus imperatrix* (Obenberger, 1931)

Annietta imperatrix Obenberger, 1931b: 184; 1934b: 809 – Descarpentries, 1979: 108 (synonyme de / synonym of *Coraebastus quinquepustulatus*) – Bellamy, 2001a: 60 (stat. rev.).

Holotype : NMPC-22633

Distribution : MADAGASCAR.

• *Coraebastus quinquepustulatus* Fairmaire, 1896

Fairmaire, 1896: 456 – Alluaud, 1900b: 197 – Kerremans, 1903: 223 – Théry, 1905: 24, 116 – Marie et Lesne, 1917: 31 – Obenberger, 1934b: 809 – Descarpentries, 1979: 107 – Bellamy, 2001a: 60.

Holotype : MNHN.

Distribution : COMORES : Mayotte.

Genre / Genus *Evimantius* Deyrolle, 1864

Evimantius Deyrolle, 1864: 113 [Espèce type / Type species: *Evimantius rufopictus* Deyrolle 1864 (dénomination originale / original designation)] – Saunders, 1871: 137 – Kerremans, 1891: clxiii; 1892a: 237; 1893a: 118; 1903: 245 – Théry, 1905: 25, 123; 1930b: 168 – Obenberger, 1934b: 810 – Bellamy, 1985: 424 – Holyński, 1993a: 15 – Bellamy, 1997b: 77; 2001a: 62.

• *Evimantius curvicolis* Kerremans, 1891

Kerremans, 1891: clxiv; 1892a: 237 – Alluaud, 1900b: 198 – Kerremans, 1903: 245 – Théry, 1905: 25, 124 – Obenberger, 1934b: 810 – Bellamy, 1997b: 77; 2001a: 62.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• *Evimantius rufopictus* Deyrolle, 1864

Deyrolle, 1864: 113 – Kerremans, 1891: clxiv; 1892a: 237 – Alluaud, 1900b: 198 – Kerremans, 1903: 245 – Théry, 1905: 25, 123 – Obenberger, 1934b: 810 – Bellamy, 1997b: 77; 2001a: 62.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

nom indisponible / unavailable name : *rufopictus* La Férte

La Ferté (*in litt.*) – Deyrolle, 1864 : 113 – Bellamy, 2001a : 62.

synonyme / synonym : *olsufiewi* Hoschek, 1931

Hoschek, 1931b : 733 – Obenberger, 1934b : 810 – Bellamy, 1997b : 77 (synonyme de / synonym of *rufopictus*) ; 2001a : 62.

Holotype : NHMB

synonyme / synonym : *strandi* Obenberger, 1931

Obenberger, 1931b : 181 ; 1934b : 810 – Bellamy, 1997b : 77 (synonyme de / synonym of *rufopictus*) ; 2001a : 62.

Holotype : NMPC-22634.

synonyme / synonym : *embriki* Obenberger, 1936

Obenberger, 1936d : 139 – Bellamy, 1997b : 77 (synonyme de / synonym of *rufopictus*) ; 2001a : 62.

Holotype : NMPC-22635.

Genre / Genus *Pseudocoraebus* Théry, 1905

Pseudocoraebus Théry, 1905 : 24, 121 [Espèce type / Type species : *Pseudocoraebus mocquersyi* Théry, 1905 (monotypie / monotypy)] – Obenberger, 1934b : 813 – Bellamy, 1985 : 424 ; 2001a : 65 ; 2003b : 79.

• *Pseudocoraebus mocquersyi* Théry, 1905

Théry, 1905 : 24, 121, pl. III, fig. 18 – Obenberger, 1934b : 813 – Bellamy, 2001a : 65.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Maroantsetra, baie d'Antongil.

• *Pseudocoraebus strandi* Obenberger, 1931

Obenberger, 1931b : 183 ; 1934b : 813 – Bellamy, 2001a : 65.

Holotype : NMPC-22668

Distribution : MADAGASCAR.

Genre / Genus *Chloricala* Kerremans, 1893

Chloricala Kerremans, 1893a : 119 [Espèce type / Type species : *Chloricala gratiosa* Kerremans, 1893 (monotypie / monotypy)] – Théry, 1905 : 24, 120 – Obenberger, 1934b : 813 – Bellamy, 1985 : 424 ; 2001a : 59 ; 2003b : 75.

Chloricala (*sic*) Kerremans, 1900a : 319 (*lapsus*) ; 1903 : 231 – Holyński, 1993a : 15 – Bellamy, 2001a : 59 ; 2003b : 75.

• *Chloricala balachowskyi* Descarpentries, 1974

Descarpentries, 1974 : 582, fig. 7, 8 – Bellamy, 2001a : 59.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR OUEST : S.-P. de Sakaraha, réserve forestière du Zombitsy.

• ***Chloricala gratiosa* Kerremans, 1893**

Kerremans, 1893a : 120 ; 1900a : 319 ; 1903 : 231, pl. 2, fig. 11 – Théry, 1905 : 24, 120 – Obenberger, 1934b : 813 ; 1935b : 20 – Théry, 1936a : 59 – Bellamy, 2001a : 59.

Holotype : BMNH.

Distribution : MADAGASCAR.

synonyme / synonym : *octosticta* Obenberger, 1935

Chloricala gratiosa var. *octosticta* Obenberger, 1935b : 20 ; 1934b : 813 – Théry, 1936a : 59 – Bellamy, 2001a : 59 (synonyme de / synonym of *gratiosa*).

Holotype : NMPC-23675.

synonyme / synonym : *impunctata* Théry, 1936

Chloricala gratiosa var. *impunctata* Théry, 1936a : 60 – Bellamy, 2001a : 59 (synonyme de / synonym of *gratiosa*).

Holotype : MNHN.

Genre / Genus *Gracilocala*, gen. nov.

Espèce type du genre / Genus type species : *Gracilocala bicolor*, sp. nov. (nouvelle dénomination / new designation).

• ***Gracilocala bicolor*, sp. nov.** (fig. 9-11)

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Maroantsetra, base de la presqu'île Masoala, Hiaraka, 1000m.

Genre / Genus *Jaroslavia* Obenberger, 1942

Jaroslavia Obenberger, 1942a : 11 [Espèce type / Type species : *Jaroslavia ianthinipennis* Obenberger, 1942 (dénomination originale / original designation)] – Bellamy, 1985 : 424 ; 2001a : 62 ; 2003b : 77.

• ***Jaroslavia ianthinipennis* Obenberger, 1942**

Obenberger, 1942a : 12, fig. 3 – Bellamy, 2001a : 62.

Holotype : NMPC.

Distribution : MADAGASCAR EST : Midongy.

Genre / Genus *Ivalouwayneia*, gen. nov.

Espèce type du genre / Genus type species : *Ivalouwayneia ruficapiticauda*, sp. nov. (nouvelle dénomination / new designation).

• ***Ivalouwayneia ruficapiticauda*, sp. nov.** (fig. 12, 13)

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Mananara Nord, Antananambe.

Genre / Genus *Seranambia* Descarpentries, 1974

Seranambia Descarpentries, 1974 : 584 [Espèce type / Type species : *Seranambia nodosa* Descarpentries, 1974 (dénomination originale / original designation)] – Bellamy, 1985 : 424 ; 2001a : 66 ; 2003b : 79.

• ***Seranambia nodosa* Descarpentries, 1974**

Descarpentries, 1974 : 585, fig. 9, 10 – Bellamy, 2001a : 66.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Mananara-Nord, Antananambe ; route d'Anosibe ; Mananara.

• **sous-espèce / subspecies : *vondrozensis* Descarpentries, 1974**

Descarpentries, 1974 : 586, fig. 11 – Bellamy, 2001a : 66.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : Vondrozo.

• ***Seranambia succinicola* Descarpentries, 1974**

Descarpentries, 1974 : 586 – Bellamy, 2001a : 66.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR NORD : S.-P. de Diégo-Suarez / Antsiranana, montagne d'Ambre.

Genre / Genus *Phlocteis* Kerremans, 1893

Phlocteis Kerremans, 1893a/ Type species : *Buprestis exasperata* Swartz, in Schönherr, 1817 (dénomination originale / original designation)] ; 1903 : 257 – Théry, 1905 : 10, 125 – Obenberger, 1922 : 127 ; 1928b : 341 ; 1934b : 795 ; 1935d : 87 – Bellamy, 1985 : 423 ; 1986 : 128 (révision / revision), 130 (clé des espèces / spp. key) ; 1988b : 112 ; 1991g : 5 – Hołyński, 1993a : 15 – Bellamy, 2001a : 64 ; 2003b : 79.

• ***Phlocteis hova* Théry, 1937**

Théry, 1937a : 89, fig. 4 – Bellamy, 2001a : 65.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR CENTRE : Tananarive / Antananarivo.

• ***Phlocteis humeralis* (Waterhouse, 1887)**

Discoderes humeralis Waterhouse, 1887 : 293 – Kerremans, 1892a : 236 – *Phlocteis humeralis* (Waterhouse) : 1903 : 257 – Théry, 1905 : 25, 125 – Obenberger, 1928b : 341 ; 1934b : 797 – Bellamy, 2001a : 65.

Holotype : BMNH.

Distribution : MADAGASCAR.

Genre / Genus *Discoderopsis* Théry, 1899

Discoderopsis Théry, 1930b : 168 [Espèce type / Type species : *Discoderopsis incurvata* Théry, 1930 (monotypie / monotypy)] – Obenberger, 1934b : 795 – Bellamy, 1985 : 423 ; 2001a : 60 ; 2003b : 76.

• ***Discoderopsis nigrovirens* (Fairmaire, 1899)**

Discoderes nigrovirens Fairmaire, 1899a : 116 – Alluaud, 1900b : 197 – Kerremans, 1903 : 223 – Théry, 1905 : 24, 114 – Marie et Lesne, 1917 : 40 – *Phlocteis nigrovirens* (Fairmaire) : Obenberger, 1928b : 341 ; 1934b : 798 – *Discoderopsis nigrovirens* (Fairmaire) : Théry, 1936a : 60 – Bellamy, 2001a : 60.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR OUEST : Suberbieville [= Maevatanana].

synonyme / synonym : *incurvatus* Théry, 1930

Théry, 1930b : 169 – Obenberger, 1934b : 795 – Théry, 1936a : 60 (synonyme de / synonym of *nigrovirens*) – Bellamy, 2001a : 60.

Holotype : MNHN.

Genre / Genus *Sambirania* Obenberger, 1942

Sambirania Obenberger, 1942a : 8 [Espèce type / Type species : *Sambirania brachysoma* Obenberger, 1942 (dénomination originale / original designation)] – Descarpentries, 1968 : 929 (clé des espèces / spp. key) – Bellamy, 1985 : 425 ; 2001a : 65 ; 2003b : 79.

• ***Sambirania aeneicollis* Descarpentries, 1968**

Descarpentries, 1968 : 930, 932 – Bellamy, 2001a : 65.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Vondrozo ; S.-P. de Mananara Nord, mont Antampona, Seranambe, Antanambe, Fahitrosy ; S.-P. de Maroantsetra, Ambodivoangy.

• ***Sambirania brachysoma* Obenberger, 1942**

Obenberger, 1942a : 8, fig. 1, 6 – Descarpentries, 1968 : 929, 930, fig. 5 – Bellamy, 2001a : 65.

Holotype : NMPC.

Distribution : MADAGASCAR SAMBIRANO.

• ***Sambirania dubia* Descarpentries, 1968**

Descarpentries, 1968 : 930, 931, fig. 9 – Bellamy, 2001a : 65.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Vondrozo.

• ***Sambirania impedita* Descarpentries, 1968**

Descarpentries, 1968 : 929, 930, fig. 4, 8 – Bellamy, 2001a : 65.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Mananara Nord, mont Antampona, Seranambe ; S.-P. de Maroantsetra, Ambodivoania ; S.-P. de Vondrozo, Vondrozo.

• ***Sambirania incerta* Descarpentries, 1968**

Descarpentries, 1968 : 930, 931, fig. 10 – Bellamy, 2001a : 65.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Vondrozo, Vondrozo.

• ***Sambirania inflata* Descarpentries, 1968** (Pl. 6, fig. 45)

Descarpentries, 1968 : 929, 930, fig. 6, 7 – Bellamy, 2001a : 65.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Mananara Nord, Antanambe, Seranambe ; S.-P. de Sambava, Belalono ; S.-P. de Vondrozo. MADAGASCAR NORD : S.-P. de Diégo-Suarez / Antsiranana, montagne d'Ambre.

• ***Sambirania plagicollis* Descarpentries, 1968**

Descarpentries, 1968 : 930, 932 – Bellamy, 2001a : 65.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Mananara Nord, mont Antampona, Seranambe, Antanambe, Fahitrosy ; S.-P. de Maroantsetra, Ambodivoangy, Ambodivoania, Fampanambo ; S.-P. de Vondrozo.

• ***Sambirania rotundipennis* Descarpentries, 1968**

Descarpentries, 1968 : 930, 932 – Bellamy, 2001a : 65.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Mananara Nord, mont Antampona, Seranambe, Antanambe, Fahitrosy ; S.-P. de Maroantsetra, Ambodivoangy, Varingohitra-Ambodivoania ; S.-P. de Vondrozo, Vondrozo ; sud de Moramanga, route d'Anosibe.

• ***Sambirania suspecta* Descarpentries, 1968**

Descarpentries, 1968 : 930, fig. 11 – Bellamy, 2001a : 65.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Vondrozo, Vondrozo.

Genre / Genus *Mandritsaria* Obenberger, 1942

Mandritsaria Obenberger, 1942a : 7 [Espèce type / Type species : *Amorphosoma inaequale* Gory et Laporte de Castelnau, 1839 (dénomination originale / original designation)] – Descarpentries, 1968 : 932 (clé des espèces / spp. key) – Bellamy, 1985 : 425 ; 2001a : 62 ; 2003b : 78.

• *Mandritsaria ambositrensis* Descarpentries, 1968

Descarpentries, 1968 : 933, 934 – Bellamy, 2001a : 62.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR CENTRE : S.-P. d'Ambositra.

• *Mandritsaria antamponensis* Descarpentries, 1968

Descarpentries, 1968 : 932, 933 – Bellamy, 2001a : 62.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Mananara Nord, mont Antampona.

• *Mandritsaria catalai* Descarpentries, 1968

Descarpentries, 1968 : 933, fig. 13 – Bellamy, 2001a : 62.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Vondrozo. MADAGASCAR CENTRE : S.-P. d'Ihosy, mont Ambohipanja, Sahambana.

• *Mandritsaria inaequalis* (Gory et Laporte de Castelnau, 1839)

Amorphosoma inaequale Gory et Laporte de Castelnau, 1839 : 11, pl. 3, fig. 14 – *Discoderes inaequalis* (Gory et Laporte de Castelnau) : Gemminger et Harold, 1869 : 1433 – Saunders, 1871 : 109 – Kerremans, 1892a : 236 – Alluaud, 1900b : 196 – Kerremans, 1903 : 223 – Théry, 1905 : 24, 114 – *Phlocteis inaequalis* (Gory et Laporte de Castelnau) : Obenberger, 1934b : 798 – *Mandritsaria inaequalis* (Gory et Laporte de Castelnau) : 1942a : 7, fig. 4 – Descarpentries, 1968 : 933 – Bellamy, 2001a : 63.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Mananara Nord, Antanambe ; S.-P. de Vondrozo ; S.-P. de Moramanga, 9 km au sud de Moramanga.

• *Mandritsaria peyrierasi* Descarpentries, 1968

Descarpentries, 1968 : 933 – Bellamy, 2001a : 63.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Vondrozo, Vondrozo.

• *Mandritsaria sicardi* Descarpentries, 1968

Descarpentries, 1968 : 933 – Bellamy, 2001a : 63.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR NORD : S.-P. de Diégo-Suarez / Antsiranana, montagne d'Ambre.

• ***Mandritsaria vadoni* Descarpentries, 1968**

Descarpentries, 1968 : 932, 933, fig. 12 – Bellamy, 2001a : 63.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Vondrozo.

Genre / Genus *Midongya* Obenberger, 1942

Midongya Obenberger, 1942a : 9 [Espèce type / Type species : *Midongya mirabilis* Obenberger, 1942 (dénomination originale / original designation)] – Bellamy, 1985 : 425 ; 2001a : 63 ; 2003b : 78.

• ***Midongya mirabilis* Obenberger, 1942**

Obenberger, 1942a : 10, fig. 2 – Bellamy, 2001a : 63.

Holotype : NMPC.

Distribution : MADAGASCAR EST : région de Midongy du Sud.

Genre / Genus *Angatra* Descarpentries, 1969

Angatra Descarpentries, 1969a : 599 [Espèce type / Type species : *Angatra magna* Descarpentries, 1969 (dénomination originale / original designation)] – Bellamy, 1985 : 424 ; 2001a : 58 ; 2003b : 75.

• ***Angatra magna* Descarpentries, 1969**

Descarpentries, 1969a : 600, fig. 1 – Bellamy, 2001a : 58.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : Seranambe.

• ***Angatra parva* Descarpentries, 1969** (Pl. 6, fig. 46)

Descarpentries, 1969a : 601, fig. 2 – Bellamy, 2001a : 58.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : Seranambe.

Genre / Genus *Antanambia* Descarpentries, 1975

Antanambia Descarpentries, 1975a : 19 [Espèce type / Type species : *Antanambia nigricans* Descarpentries, 1975 (dénomination originale / original designation)] – Bellamy, 1985 : 425 ; 2001a : 58 ; 2003b : 75.

• ***Antanambia nigricans* Descarpentries, 1975**

Descarpentries, 1975a : 21, fig. 1, 3-5 – Bellamy, 2001a : 59.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Mananara-Nord, Antanambe, Fahitrosy, Perinet / Andasibe ; S.-P. de Vondrozo.

Genre / Genus *Falliellus* Bellamy, 2001

Falliellus Bellamy, 2001b : 167 [Espèce type / Type species : *Falliellus richardi* Bellamy, 2001 (dénomination originale / original designation)].

- ***Falliellus richardi* Bellamy, 2001** (Pl. 7, fig. 47)
Bellamy, 2001b : 168.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : Perinet / Andasibe.

Genre / Genus *Peyrierasina* Descarpentries, 1975

Peyrierasina Descarpentries, 1975a : 22 [Espèce type / Type species : *Peyrierasina complanata* Descarpentries, 1975 (dénomination originale / original designation)] – Bellamy, 1985 : 424 ; 2001a : 64 ; 2003b : 77.

- ***Peyrierasina complanata* Descarpentries, 1975**
Descarpentries, 1975 : 24, fig. 2, 6-8 – Bellamy, 2001a : 64.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Vondrozo.

Genre / Genus *Maroantsetra* Théry, 1937

Maroantsetra Théry, 1937a : 102 [Espèce type / Type species : *Maroantsetra superba* Théry, 1937 (monotypie / monotypy)] – Bellamy, 1985 : 425 ; 2001a : 63 ; 2003b : 78.

- ***Maroantsetra superba* Théry, 1937**
Théry, 1937a : 103, fig. 10 – Bellamy, 2001a : 63.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : Maroantsetra, baie d'Antongil.

Genre / Genus *Seyrigia* Théry, 1937

Seyrigia Théry, 1937a : 104 [Espèce type / Type species : *Seyrigia albopunctata* Théry, 1937 (dénomination originale / original designation)] – Bellamy, 1985 : 424 ; 2001a : 66 ; 2003b : 79.

- ***Seyrigia albopunctata* Théry, 1937**
Théry, 1937a : 106, fig. 11 – Bellamy, 2001a : 66.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR CENTRE : Bekily.

Genre / Genus *Dejongiella* Bellamy, 2003

Dejongiella Bellamy, 2003a : 3 [Espèce type / Type species : *Discoderes cavifrons* Fairmaire, 1904 (dénomination originale / original designation)].

- ***Dejongiella cavifrons* (Fairmaire, 1904) (Pl. 7, fig. 48)**

Discoderes cavifrons Fairmaire, 1904 : 234 – Théry, 1905 : 28, 178 – Marie et Lesne, 1917 : 40 – *Phlocteis cavifrons* (Fairmaire) : Obenberger, 1928b : 341 ; 1934b : 796 – Bellamy, 2001a : 66; *Dejongiella cavifrons* (Fairmaire) : 2003a : 4.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR OUEST : Soalala. MADAGASCAR CENTRE : Bekily.

Genre / Genus *Neefia* Bellamy, 2003

Neefia Bellamy, 2003a : 4 [Espèce type / Type species : *Neefia semivestita* Bellamy, 2003 (dénomination originale / original designation)].

- ***Neefia gracilis* Bellamy, 2003**

Bellamy, 2003a : 11.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : district Maroantsetra, mont Antampona ; S.-P. Mananara Nord, Fahitrosy.

- ***Neefia humeralis* Bellamy, 2003**

Bellamy, 2003a : 13.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : Perinet.

- ***Neefia magna* Bellamy, 2003 (Pl. 7, fig. 49)**

Bellamy, 2003a : 7.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : Perinet.

- ***Neefia montana* Bellamy, 2003**

Bellamy, 2003a : 8.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR NORD : S.-P. de Diégo-Suarez / Antsiranana, montagne d'Ambre.

- ***Neefia rufofascia* Bellamy, 2003**

Bellamy, 2003a : 14.

Holotype ♀ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : Perinet.

• ***Neefia rufovestita* Bellamy, 2003**

Bellamy, 2003a : 15.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : Belalona.

• ***Neefia semivestita* Bellamy, 2003** (Pl. 7, fig. 50)

Bellamy, 2003a : 6.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. Mananara Nord, Antanambe, Seranambe, Fampanambo, district Maroantsetra, Ambodivoangy, mont Antampona, Antakataka, Condrozo, Belalona.

Genre / Genus *Neefioides* Bellamy, 2003

Neefioides Bellamy, 2003a : 16 [Espèce type / Type species : *Cisseis rufobasalis* Fairmaire, 1897 (dénomination originale / original designation)].

• ***Neefioides rufobasalis* (Fairmaire, 1897)** (Pl. 7, fig. 51)

Cisseis rufobasalis Fairmaire, 1897 : 380 – Alluaud, 1900b : 197 – *Entomogaster rufobasalis* (Fairmaire) : Kerremans, 1903a : 226 – Théry, 1905 : 24, 118 – *Cisseis rufobasalis* Fairmaire : Marie et Lesne, 1917 : 27 – *Entomogaster rufobasalis* (Fairmaire) : Obenberger, 1928 : 340 ; 1934 : 809 – Bellamy, 2001b : 61 – *Neefioides rufobasalis* (Fairmaire) : Bellamy, 2003a : 17.

Holotype ♀ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR OUEST : Suberbieville [= Maevatanana].

Genre / Genus *Malagascoderes*, gen. nov.

Espèce type du genre / Genus type species : *Discoderes goudotii* Thomson, 1878 (nouvelle dénomination / new designation).

• ***Malagascoderes goudotii* (Thomson, 1878), comb. nov.**

Discoderes goudotii Thomson, 1878b : 82 – Kerremans, 1885 : 151 ; 1892a : 236 – Alluaud, 1900b : 196 ; 1903 : 223 – Théry, 1905 : 23, 114 – *Phlocteis goudotii* (Thomson) : Obenberger, 1934b : 797 – *Discoderes goudotii* (Thomson) : Théry, 1936a : 60 – Bellamy, 2001a : 67.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Malagascoderes scriptus* Théry, 1937, comb. nov.** (fig. 14)

Théry, 1937a : 85, fig. 2 – Bellamy, 2001a : 67.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR CENTRE : Mahatsinjo (nec Mahasingo).

Genre / Genus *Madaphlocteis*, gen. nov.

Espèce type du genre / Genus type species : *Discoderes perrieri* Fairmaire, 1900 (nouvelle dénomination / new designation).

• ***Madaphlocteis ambanjana* (Obenberger, 1944), comb. nov.**

Phlocteis ambanjana Obenberger, 1944a : 421 – Bellamy, 2001a : 66.

Holotype : NMPC.

Distribution : MADAGASCAR SAMBIRANO : S.-P. d'Ambanja, Ambanja.

• ***Madaphlocteis ampliata* (Fairmaire, 1905), comb. nov.**

Discoderes ampliata Fairmaire, 1905 : 124 – Théry, 1905 : 178 – Marie et Lesne, 1917 : 40 – *Phlocteis ampliata* (Fairmaire) : Obenberger, 1928b : 341 ; 1934b : 796 – Bellamy, 2001a : 66.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR NORD : S.-P. de Diégo-Suarez / Antsiranana.

• ***Madaphlocteis iridipennis* (Obenberger, 1944), comb. nov.**

Phlocteis iridipennis Obenberger, 1944a : 420 – Bellamy, 2001a : 67.

Holotype : NMPC.

Distribution : MADAGASCAR EST : Midongy du sud.

• ***Madaphlocteis mucorea* (Fairmaire, 1902), comb. nov.**

Discoderes mucorea Fairmaire, 1902b : 80 – Kerremans, 1903 : 223 – Théry, 1905 : 24, 116 – Marie et Lesne, 1917 : 40 – Obenberger, 1928b : 341 (« nouveau genre / new genus ») – *Phlocteis mucorea* (Fairmaire) : 1934b : 798 – Bellamy, 2001a : 67.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR SUD : sur des arbustes épineux du sud du Pays Androy, à Ambovombe.

• ***Madaphlocteis ochraceopicta* (Fairmaire, 1888), comb. nov.**

Discoderes ochraceopicta Fairmaire, 1888 : 56 – Kerremans, 1892a : 237 – Alluaud, 1900b : 197 – Kerremans, 1903 : 223 – Théry, 1905 : 24, 114, pl. IV, fig. 19 – Marie et Lesne, 1917 : 40 – *Phlocteis ochraceopicta* (Fairmaire) : Obenberger, 1934b : 798 – Bellamy, 2001a : 67.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Madaphlocteis perrieri* (Fairmaire, 1900), comb. nov. (fig. 15)**

Discoderes perrieri Fairmaire, 1900 : 244 – Kerremans, 1903 : 223 – Théry, 1905 : 24, 115 – Marie et Lesne, 1917 : 40 – *Phlocteis perrieri* (Fairmaire) : Obenberger, 1928b : 341 ; 1934b : 798 – Bellamy, 2001a : 67.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR OUEST : environs de Suberbieville [= Maevatanana].

• ***Madaphlocteis polychroa* (Fairmaire, 1904), comb. nov.**

Discoderes polychroa Fairmaire, 1904 : 234 – Théry, 1905 : 28, 177 – Marie et Lesne, 1917 : 40 – *Phlocteis polychroa* (Fairmaire) : Obenberger, 1928b : 341 ; 1934b : 798 – Bellamy, 2001a : 67.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR OUEST : région de l'Ambongo.

• ***Madaphlocteis purpureosignata* (Hoschek, 1931), comb. nov.**

Paradora purpureosignata Hoschek, 1931b : 735 – *Phlocteis purpureosignata* (Hoschek) : Obenberger, 1934b : 799 – Bellamy, 2001a : 67.

Holotype : ISNB.

Distribution : MADAGASCAR NORD : cap d'Ambre.

• ***Madaphlocteis simplicifrons* (Fairmaire, 1901), comb. nov.**

Discoderes simplicifrons Fairmaire, 1901 : 163 – Kerremans, 1903 : 223 – Théry, 1905 : 24, 115 – Marie et Lesne, 1917 : 40 – *Phlocteis simplicifrons* (Fairmaire) : Obenberger, 1934b : 799 – Bellamy, 2001a : 67.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR OUEST : environs de Suberbieville [= Maevatanana].

Sous-tribu / Subtribe **Coraebina** Bedel, 1921

Coraebina : Holyński, 1993a : 15 – Bellamy et Westcott, 1995a : 203 ; 2003b : 82.

Genre / Genus *Coraebus* Gory et Laporte de Castelnau, 1839

Coraebus Gory et Laporte de Castelnau, 1839 : 1 [Espèce type / Type species : *Buprestis undatus* Fabricius 1775 (dénomination ultérieure / subsequent designation : Descarpentries et Villiers, 1967 : 471)] – Bellamy, 2003b : 82.

• ***Coraebus insignis* Kerremans, 1898**

Kerremans, 1898b : 83 – Alluaud, 1900b : 197 – Kerremans, 1903 : 233 – Théry, 1905 : 24, 122 – Obenberger, 1934b : 830 – Bellamy, 2001a : 60.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

Sous-tribu / Subtribe **Meliboeina** Majer, 2001

Meliboeina Majer, in Kubáň et al., 2001 : 213 – Bellamy, 2003b : 83.

Genre / Genus *Meliboeus* Deyrolle, 1864

Meliboeus Deyrolle, 1864 : 132 [Espèce type / Type species : *Agrilus episcopalis* Mannerheim, 1837 (dénomination ultérieure / subsequent designation: 333)] – Bellamy, 2003b : 84.

• *Meliboeus albomaculatus* Théry, 1937

Théry, 1937a : 108, fig. 14 – Bellamy, 2001a : 63.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR NORD : S.-P. de Diégo-Suarez / Antsiranana, montagne d'Ambre.

• *Meliboeus bipustulatus* (Fairmaire, 1901)

Entomogaster bipustulatus Fairmaire, 1901 : 161 – Kerremans, 1903 : 226 – *Meliboeus bipustulatus* (Fairmaire) : Théry, 1905 : 24, 118 – Marie et Lesne, 1917 : 46 – *Entomogaster bipustulatus* (Fairmaire) : Obenberger, 1928b : 340 – Théry, 1930b : 168 – *Meliboeus bipustulatus* (Fairmaire) : Obenberger, 1934b : 808, 899 – Bellamy, 2001a : 63.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR OUEST : région de Maevatanana, cause de Hukaru (nec de l'Ankara).

• *Meliboeus cyanipennis* (Fairmaire, 1903)

(Fairmaire) 1903b : 201 (*Entomogaster*) – Théry, 1905 : 24, 119 – Marie et Lesne, 1917 : 46 – Théry, 1930b : 168 – Obenberger, 1928b : 340 ; 1934b : 808, 901 (*Meliboeus*) – Bellamy, 2001a : 63.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR OUEST : S.-P. d'Ambato-Boeni, Ankirihitra (nec Ankarahitra).

• *Meliboeus insipidus* Théry, 1905

Théry, 1905 : 25, 123, pl. IV, fig. 21 – Obenberger, 1934b : 902 – Bellamy, 2001a : 63.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR SUD : région de l'Androy.

• *Meliboeus miliaris* (Gory et Laporte de Castelnau, 1839)

Agrilus miliaris Gory et Laporte de Castelnau, 1839 : 32, pl. 7, fig. 40 – Gemminger et Harold, 1869 : 1442 – *Meliboeus miliaris* (Gory et Laporte de Castelnau) : Saunders, 1871 : 105 – Kerremans, 1892a : 232 – Alluaud, 1900b : 198 – Kerremans, 1903 : 236 – Théry, 1905 : 25, 123 – Obenberger, 1934b : 903 – Bellamy, 2001a : 63.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR CENTRE : Tananarive / Antananarivo.

synonyme / synonym : *hovanus* Théry, 1937 *syn. nov.*

Théry, 1937a : 107, fig. 12 – Bellamy, 2001a : 63.

Holotype : MNHN.

• ***Meliboeus vagecostatus* Théry, 1937**

Théry, 1937a : 108, fig. 13 – Bellamy, 2001a : 63.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

Tribu / Tribe **Agrilini** Laporte de Castelnau, 1835

Agrilites Laporte de Castelnau, 1835 : 165 – Bellamy, 2003b : 85.

Agrilini Kerremans, 1893a : 116 – Bellamy, 1985 : 423 – Cobos, 1986 : 210, 225 – Bellamy, 1990 : 575 – Holyński, 1993a : 14 – Bellamy, 2003b : 85.

Genre / Genus *Sambus* Deyrolle, 1864

Sambus Deyrolle, 1864 : 210 [Espèce type / Type species : *Sambus laferiei* Deyrolle 1864 (dénomination ultérieure / subsequent designation : Tôyama, 1986 : 58)] – Descarpentries, 1968 : 927 (clé des espèces malgaches / Madagascan spp. key) – Bellamy, 2003b : 86.

• ***Sambus douquetteae* Descarpentries, 1968**

Descarpentries, 1968 : 928 – Bellamy, 2001a : 66.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR NORD : S.-P. de Diégo-Suarez / Antsiranana, montagne d'Ambre.

• ***Sambus madagascariensis* Descarpentries, 1968**

Descarpentries, 1968 : 928 – Bellamy, 2001a : 66.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Mananara Nord, Seranambe.

• ***Sambus peyrierasi* Descarpentries, 1968**

Descarpentries, 1968 : 927, 928, fig. 3 – Bellamy, 2001a : 66.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Mananara Nord, mont Antampona.

• ***Sambus seyrigi* Descarpentries, 1968**

Descarpentries, 1968 : 928, fig. 2 – Bellamy, 2001a : 66.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR CENTRE : région de Bekily, Ampandrandava.

• ***Sambus vadoni* Descarpentries, 1968 (Pl. 7, fig. 52)**

Descarpentries, 1968 : 927, 928, fig. 1 – Bellamy, 2001a : 66.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Maroantsetra, Ambodivoangy ; S.-P. de Mananara-Nord, Seranambe ; S.-P. d'Andapa, Andapa.

Genre / Genus *Pseudagrilus* Laporte de Castelnau, 1835

Pseudagrilus Laporte de Castelnau, 1835 : 165 [Espèce type / Type species : *Pseudagrilus splendidus* Laporte de Castelnau, 1835 (monotypie / monotypy)] – Bellamy, 2003b : 86.

Entomoderes (sic) Fairmaire, 1903a : 30 (part, lapsus for *Entomogaster*) – Marie et Lesne, 1917 : 45 – Obenberger, 1934b : 874 – Théry, 1955 : 397 – Bellamy, 2001a : 64.

• *Pseudagrilus scintillans* (Fairmaire, 1903)

Entomoderes scintillans Fairmaire, 1903a : 30 – *Entomogaster scintillans* (Fairmaire), 1903b : 201 – Théry, 1905 : 24, 119 – Marie et Lesne, 1917 : 45, 46 – Théry, 1930a : 132 – Obenberger, 1934b : 874 – *Pseudagrilus scintillans* (Fairmaire) : Théry, 1955 : 397 – Bellamy, 2001a : 65.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR OUEST : S.-P. d'Ambato-Boeni, Ankirihitra (nec Ankarahitra).

synonyme / synonym : *madegassus* Obenberger, 1924

Obenberger, 1924b : 112 – Théry, 1930a : 132 (synonyme de / synonym of *scintillans*) – Obenberger, 1934b : 874.

Holotype : NMPC.

Genre / Genus *Agrilus* Curtis, 1825

Agrilus Curtis, 1825 : No. 67 [Espèce type / Type species : *Buprestis viridis* Linné 1758 (dénomination originale / original designation)] – Eschscholtz, 1829 : 9 – Théry, 1905 : 9, 12, 26, 130, 140 – Lesne, 1918 : 464 – Obenberger, 1936a : 935 – Curletti, 1993 : 422 – Bellamy, 2003b : 88.

Sous-genre / Subgenus *Diplophotus* Abeille de Perrin, 1897

Diplophotus Abeille de Perrin, 1897 : 2 [Espèce type / Type species : *Buprestis desertus* Klug (dénomination ultérieure / subsequent designation : Bellamy, 1998b : 13)] – Kerremans, 1900a : 324 ; 1903 : 265 – Théry, 1905 : 25, 125 – Kerremans, 1908b : 91, 109 ; 1909a : 38 – Jakobson, 1912 : 794, 796 – Kerremans, 1913a : 446 – Obenberger, 1924b : 13 – Théry, 1930e : 10 – Obenberger, 1931d : 55 ; 1936a : 939 – Bellamy, 1985 : 427 ; 1990 : 575 – Curletti, 1993 : 422 – Holyński, 1993a : 14 – Bellamy, 1996 : 83 – Curletti, 1998 : 127, 130 – Bellamy, 2003b : 90.

Sous-genre / Subgenus *Duttus* Curletti, 1993

Agrilus (*Duttus*) Curletti, 1993 : 436 [Espèce type / Type species : *Agrilus purpuratus* Klug (dénomination originale / original designation)] – Bellamy, 1996 : 83 – Curletti, 1998 : 128, 130 – Bellamy, 2003b : 90.

• ***Agrilus (Diplolophotus) abeillei* (Théry, 1905)**

Diplolophotus abeillei Théry, 1905 : 26, 137, pl. IV, fig. 26 – *Agrilus abeillei* (Théry) : Obenberger, 1936a : 1108 – Curletti, 1993 : 423.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR SUD : région de l'Androy.

• ***Agrilus (Diplolophotus) acroneus* Obenberger, 1942**

Obenberger, 1942c : 75 – Curletti, 1993 : 423.

Holotype : NMPC.

Distribution : MADAGASCAR SAMBIRANO : Nossi-Bé / Nosy Be.

• ***Agrilus (Diplolophotus) ambodimanganus* Obenberger, 1931**

Obenberger, 1931a : 95 ; 1936a : 1108 (*abodimanganus*, *lapsus*) – Curletti, 1993 : 423.

Holotype : NMPC.

Distribution : MADAGASCAR NORD : Vohemar / Vohimara.

synonyme / synonym : *vohemarensis* Obenberger, 1942

Obenberger, 1942c : 76 – Curletti, 1993 : 434 (synonyme de / synonym of *ambodimanganus*).

Holotype : NMPC.

• ***Agrilus (Diplolophotus) areolatus* Fairmaire, 1898**

Fairmaire, 1898 : 229 – Alluaud, 1900b : 198 – Kerremans, 1903 : 282 – *Diplolophotus* Théry, 1905 : 25, 128 – *Agrilus* Marie et Lesne, 1917 : 4 – Obenberger, 1936a : 1110 – Curletti, 1993 : 423 ; 2005 : 287.

Distribution : MADAGASCAR.

Holotype : MNHN.

synonyme / synonym : *ranavalonae* Obenberger, 1931

Obenberger, 1931a : 95 ; 1936a : 1127 – Curletti, 1993 : 431, 434 (synonyme de / synonym of *areolatus*).

Holotype : NMPC.

• ***Agrilus (Agrilus) barberoi* Curletti, 2002**

Curletti, 2002b : 212.

Holotype ♂ : TNSC.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Agrilus (Diplolophotus) brevicollis* Kerremans, 1894**

Kerremans, 1894 : 352 – Alluaud, 1900b : 198 – Kerremans, 1903 : 282 – *Diplolophotus* Théry, 1905 : 25, 128 – Obenberger, 1936a : 1111 – Curletti, 1993 : 424 ; 2005 : 287.

Holotype : BMNH.

Distribution : MADAGASCAR NORD : Diégo-Suarez / Antsiranana.

• ***Agrilus (Agrilus) chameleon* Curletti, 2002**

Curletti, 2002a : 19 ; 2005 : 287.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Mananara Nord, Antananambe.

• ***Agrilus (Diplophotus) crassus* (Théry, 1905)**

Diplophotus crassus Théry, 1905 : 26, 139, pl. IV, fig. 27 – *Agrilus crassus* (Théry) : Obenberger, 1936a : 1114 – Curletti, 1993 : 425.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR SUD : région de l'Androy.

• ***Agrilus (Diplophotus) decoloratus* Obenberger, 1935**

Obenberger, 1935e : 121 (nom. nov. de / for *Diplophotus decoloratus* Théry, 1905) ; 1936a : 1115 – Curletti, 1993 : 425.

Distribution : MADAGASCAR SUD : région de l'Androy.

synonyme / synonym : *decoloratus* (Théry, 1905)

Diplophotus decoloratus Théry, 1905 : 25, 135 (nom. praeocc. par / by *Agrilus decoloratus* Kerremans, 1892), pl. IV, fig. 22 – Obenberger, 1936a : 1115 – Curletti, 1993 : 425.

Holotype : MNHN.

• ***Agrilus (Diplophotus) decorsei* (Théry, 1905)**

Diplophotus decorsei Théry, 1905 : 25, 132 – *Agrilus decorsei* (Théry) : Obenberger, 1936a : 1115 – Curletti, 1993 : 425.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR SUD : région de l'Androy.

• ***Agrilus (Agrilus) delmastroi* Curletti, 2002**

Curletti, 2002a : 18.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : Perinet / Andasibe.

• ***Agrilus (Duttus) delphinus* Curletti, 2002**

Curletti, 2002a : 14.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR SUD : S.-P. d'Amboasary, Behara. MADAGASCAR EST : Fort-Dauphin / Tolanaro.

• ***Agrilus (Diplophotus) fallaciosulus* Obenberger, 1935**

Obenberger, 1935c : 43 (nom. nov. de / for *Diplophotus fallax* Théry, 1905) ; 1936a : 1117 – Curletti, 1993 : 427.

Distribution : MADAGASCAR SUD : région de l'Androy.

synonyme / synonym : *fallax* (Théry, 1905)

Diplophotus fallax Théry, 1905 : 26, 136 (nom. praeocc. par / by *Agrilus fallax* Say, 1839), pl. IV, fig. 24 – Obenberger, 1935c : 43 ; 1936a : 1117 – Curletti, 1993 : 427.

Holotype : MNHN.

• ***Agrilus (Diplophotus) farinosus* (Théry, 1905)**

Diplophotus farinosus Théry, 1905 : 25, 131 – *Agrilus farinosus* (Théry) : Obenberger, 1936a : 1117 – Curletti, 1993 : 427.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR SUD : région de l'Androy.

• ***Agrilus (s. g. indef.) fauveli* Kerremans, 1898**

Kerremans, 1898b : 84 – Alluaud, 1900b : 198 – Kerremans, 1903 : 281 – Lesne, 1918 : 464 – Obenberger, 1936a : 1117 – Vinson, 1960 : 142 ; 1967 : 324 – Curletti, 1993 : 427 – Gomy, 2000 : 63.

Holotype : BMNH.

Distribution : MASCAREIGNES : Maurice, Château d'Eau, Port Louis, Pointe aux Sables ; la Réunion.

• ***Agrilus (Diplophotus) flacourti* (Théry, 1905)**

Diplophotus flacourti Théry, 1905 : 25, 130 – *Agrilus flacourti* (Théry) : Obenberger, 1936a : 1118 – Curletti, 1993 : 427 ; 2005 : 287.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR SUD : région de l'Androy.

• ***Agrilus (s. g. indef.) gyleki* Obenberger, 1917**

Obenberger, 1917c : 33 ; 1936a : 1119 – Curletti, 1993 : 428.

Holotype : NMPC.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Agrilus (Agrilus) haesitans* Curletti, 2002**

Curletti, 2002a : 18.

Holotype ♂ : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR : Ankarafantsika, Lac d'Ampijoroa

• ***Agrilus (s. g. indef.) howanus* Obenberger, 1935**

Obenberger, 1935a : 182 ; 1936a : 1120 – Curletti, 1993 : 428.

Holotype : NMPC.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Agrilus (Diplophotus) inconstans* (Théry, 1905)**

Diplophotus inconstans Théry, 1905 : 25, 133, pl. IV, fig. 22 – *Agrilus inconstans* (Théry) : Obenberger, 1936a : 1120 – Curletti, 1993 : 428.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR SUD : région de l'Androy.

• ***Agrilus (Diplophotus) inornatus* Obenberger, 1935**

Obenberger, 1935c : 43 (nom. nov. de / for *inornatus* Théry, 1905) ; 1936a : 1120 – Curletti, 1993 : 428.

Distribution : MADAGASCAR : « Un exemplaire des collections du Muséum provenant de Ankaboka. Chasses du lieutenant Scalabre. » (Théry, 1905). Impossible à localiser sur la carte.

synonyme / synonym : *inornatus* (Théry, 1905)

Diplophotus inornatus Théry, 1905 : 26, 136 (nom. praeocc. par / by *Agrilus inornatus* Kerremans, 1896), pl. IV, fig. 25 – Obenberger, 1935c : 43 ; 1936a : 1120 – Curletti, 1993 : 428.

Holotype : MNHN.

• ***Agrilus (Diplophotus) legwai* Bellamy, 1998**

Bellamy, 1998a : 95 (nom. nov. de / for *Diplophotus tristis* Théry, 1905).

Distribution : MADAGASCAR SUD : région de l'Androy.

synonyme / synonym : *tristis* (Théry, 1905)

Diplophotus tristis Théry, 1905 : 26, 138 (nom. praeocc. par / by *Agrilus tristis* Deyrolle, 1864) – *Agrilus tristis* (Théry) : Obenberger, 1936a : 1132 – Curletti, 1993 : 433 – Bellamy, 1998a : 95.

Holotype : MNHN.

• ***Agrilus (s. g. indef.) madecassus* (Fairmaire, 1898)**

Coraeus madecassus Fairmaire, 1898 : 229 – Alluaud, 1900b : 197 – Kerremans, 1903 : 233 – Théry, 1905 : 24, 122 – Marie et Lesne, 1917 : 31 – *Agrilus madecassus* (Fairmaire) : Obenberger, 1936a : 1122 (*madegassus*, *lapsus*) – Curletti, 1993 : 429 (*madegassus*).

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Agrilus (s. g. indef.) madegassus* Obenberger, 1935**

Obenberger, 1935f : 167 ; 1936c : 91 ; 1936a : 1122 – Curletti, 1993 : 429.

Holotype : NMPC.

Distribution : MADAGASCAR.

synonyme / synonym : *madegassicus* Obenberger, 1936

Obenberger, 1936c : 91 (nom. nov. de / for *Agrilus madegassus* Obenberger, 1935, nom. superfl.) ; 1936a : 1122 – Curletti, 1993 : 429.

• ***Agrilus (s. g. indef.) mayeti* Théry, 1912**

Théry, 1912 : 122 – Curletti, 1993 : 429.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR NORD : S.-P. de Diégo-Suarez / Antsiranana, montagne d'Ambre.

• ***Agrilus (Diplophotus) mocquerysi* (Théry, 1905)**

Diplophotus mocquerysi Théry, 1905 : 25, 132 – *Agrilus mocquerysi* (Théry) : Obenberger, 1936a : 1123 – Curletti, 1993 : 429 ; 2005 : 287.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR SUD : région de l'Androy.

• ***Agrilus (s. g. indef.) neocollaris* Hespeneheide, 1974**

Hespeneheide 1974a : 49 (nom. nov. de / for *Agrilus collaris* Kerremans, 1898).

Distribution : MADAGASCAR. Côte d'Ivoire. Kenya. Tanzanie.

synonyme / synonym : *collaris* Kerremans, 1898

Kerremans, 1898b : 83 (nom. praeocc. par / by *Agrilus collaris* Waterhouse, 1889) – Alluaud, 1900b : 198 – Kerremans, 1903 : 280 – Théry, 1905 : 26, 140 – Kerremans, 1914c : 233 – Obenberger, 1928a : 16 ; 1931c : 127 ; 1936a : 1113 – Théry, 1937a : 85 – Pochon, 1972b : 366 – Hespeneheide, 1974a : 49 – Curletti, 1993 : 425.

Holotype : BMNH.

• ***Agrilus (Diplophotus) niviferus* (Théry, 1905)**

Diplophotus niviferus Théry, 1905 : 25, 134 – *Agrilus niviferus* (Théry) : Obenberger, 1936a : 1124 – Curletti, 1993 : 430.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR SUD : région de l'Androy.

• ***Agrilus (s. g. indef.) nossibanus* Obenberger, 1931**

Obenberger, 1931a : 85 ; 1936a : 1124 – Curletti, 1993 : 430.

Holotype : NMPC.

Distribution : MADAGASCAR SAMBIRANO : Nossi-Bé / Nosy Be.

• ***Agrilus (s. g. indef.) obsoletulus* Obenberger, 1935**

Obenberger, 1935c : 43 (nom. nov. de / for *Agrilus obsoletus* Fairmaire, 1902) ; 1936a : 1125 – Curletti, 1993 : 430.

Distribution : MADAGASCAR OUEST : région de Maevatanana, Belombe.

synonyme / synonym : *obsoletus* Fairmaire, 1902

Fairmaire, 1902b : 350 (nom. praeocc. par / by *Agrilus obsoletus* Gory, 1841) – *Diplophotus obsoletus* (Fairmaire) : Théry, 1905 : 25, 130 – *Agrilus obsoletus* (Fairmaire) : Marie et Lesne, 1917 : 4 – Obenberger, 1935c : 43 ; 1936a : 1125 – Curletti, 1993 : 430.

Holotype : MNHN.

nom indisponible / unavailable name : *subcostatus* (in coll.)

Marie et Lesne, 1917 : 4.

• ***Agrilus (Diplophotus) ocyalus* Obenberger, 1942**

Obenberger, 1942c : 74 – Curletti, 1993 : 430 ; 2005 : 287.

Holotype : NMPC.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Agrilus (Diplophotus) owas* Gory et Laporte de Castelnau, 1837**

Gory et Laporte de Castelnau, 1837 : 65, pl. 14, fig. 86 – Gemminger et Harold, 1869 : 1443 – Saunders, 1871 : 125 – Kerremans, 1892a : 266 – Alluaud, 1900b : 198 (*hova*, *lapsus*) – Kerremans, 1903 : 288 – Théry, 1905 : 25, 128 – Kerremans, 1914a : 378 – Obenberger, 1936a : 1125 – Curletti, 1993 : 430.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR. SEYCHELLES.

synonyme / synonym : *octosignatus* Gory et Laporte de Castelnau, 1837

Gory et Laporte de Castelnau, 1837 : 32, pl. 7, fig. 41 – Gemminger et Harold, 1869 : 1443 – Saunders, 1871 : 125 – Kerremans, 1892a : 266 – Alluaud, 1900b : 198 – Kerremans, 1903 : 288 – Curletti, 1993 : 430.

Holotype : MNHN.

• ***Agrilus (Diplophotus) perrieri* Fairmaire, 1902**

Fairmaire, 1902b : 349 – *Diplophotus perrieri* (Fairmaire) : Kerremans, 1903 : 265 – Théry, 1905 : 25, 127 – *Agrilus perrieri* (Fairmaire) : Marie et Lesne, 1917 : 4 – Lesne, 1918 : 466 – Obenberger, 1936a : 1126 – Vinson, 1960 : 142 ; 1967 : 325 – Descarpentries, 1978 : 108 – Curletti, 1993 : 431 – Gomy, 2000 : 63.

Holotype : MNHN.

Distribution : COMORES : Grande Comore / Ngazidja, Mohéli. MADAGASCAR OUEST : Suberbieville [= Maevatanana], bassin du Mandrare, Pays Androy. MASCAREIGNES : Maurice, Port Louis, le Chaland et Mon Désert, Butte-à-l'herbe.

• ***Agrilus (Diplophotus) quadraticollis* Fairmaire, 1902**

Fairmaire, 1902b : 349 – *Diplophotus quadraticollis* (Fairmaire) : Théry, 1905 : 25, 130 – *Agrilus quadraticollis* (Fairmaire) : Marie et Lesne, 1917 : 4 – Obenberger, 1936a : 1127 – Curletti, 1993 : 431.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR OUEST : environs de Suberbieville [= Maevatanana].

• ***Agrilus (Agrilus) roseus* Curletti, 2002**

Curletti, 2002b : 212.

Holotype ♀ : NMPC.

Distribution : MADAGASCAR : environs de « Meramanga » (probablement une cacographie / probably a cacography).

• ***Agrilus (Duttus) sanguineus* Curletti, 1997**

Curletti, 1997 : 130.

Holotype ♀ : MCCI.

Distribution : MADAGASCAR CENTRE : Tananarive / Antananarivo.

• ***Agrilus (Diplophotus) semifossus* Fairmaire, 1898**

Fairmaire, 1898 : 230 – Alluaud, 1900b : 199 – Kerremans, 1903 : 290 – *Diplophotus semifossus* (Fairmaire) : Théry, 1905 : 25, 129 – *Agrilus semifossus* (Fairmaire) : Marie et Lesne, 1917 : 4 – Obenberger, 1936a : 1129 – Curletti, 1993 : 432.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

synonyme / synonym : *moestus* Fairmaire, 1898

Fairmaire, 1898 : 230 – Alluaud, 1900b : 199 – Kerremans, 1903 : 287 – Théry, 1905 : 25, 129 – Marie et Lesne, 1917 : 4 – Obenberger, 1936a : 1123 – Curletti, 1993 : 435 (synonyme de / synonym of *semifossus*).

Holotype : MNHN.

synonyme / synonym : *plicipennis* Fairmaire, 1898

Fairmaire, 1898 : 231 – Alluaud, 1900b : 199 – Kerremans, 1903 : 289 – Théry, 1905 : 25, 129 – Marie et Lesne, 1917 : 4 – Obenberger, 1936a : 1126 – Curletti, 1993 : 435 (synonyme de / synonym of *semifossus*).

Holotype : MNHN.

• ***Agrilus (Agrilus) serенаe* Curletti, 2002**

Curletti, 2002a : 17.

Holotype ♀ : MCCI.

Distribution : MADAGASCAR EST : Antsevabe Didy.

• ***Agrilus (Diplophotus) sicardi* (Théry, 1912)**

Diplophotus sicardi Théry, 1912 : 121 – *Agrilus sicardi* (Théry) : Obenberger, 1936a : 1129 – Curletti, 1993 : 432 ; 2005 : 287.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR NORD : S.-P. de Diégo-Suarez / Antsiranana, montagne d'Ambre.

• ***Agrilus (Diplophotus) spurcus* (Théry, 1905)**

Diplophotus spurcus Théry, 1905 : 26, 139 – *Agrilus spurcus* (Théry) : Obenberger, 1936a : 1130 – Curletti, 1993 : 433.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR SUD : bassin du Mandrare.

• ***Agrilus (Diplophotus) subfrontalis* Kerremans, 1903**

Kerremans, 1903 : 281 (nom. nov. de / for *frontalis* Fairmaire, 1902) – Théry, 1905 : 25, 130 – Obenberger, 1936a : 1130 – Curletti, 1993 : 433.

Holotype : BMNH.

Distribution : MADAGASCAR OUEST : ouest d'Ambato-Boeni, Madirovalo.

synonyme / synonym : *frontalis* Fairmaire, 1902

Fairmaire, 1902b : 350 (nom. *praeocc.* par / by *frontalis* Gory et Laporte de Castelnau, 1837) – Kerremans, 1903 : 281 – *Diplophotus frontalis* (Fairmaire) : Théry, 1905 : 25 (synonyme de / synonym of *subfrontalis*) – *Agrilus frontalis* (Fairmaire) : Marie et Lesne, 1917 : 4 – Obenberger, 1936a : 1130 – Curletti, 1993 : 433.

Holotype : MNHN.

• *Agrilus* (*s. g. indef.*) *subnubilus* Obenberger, 1935

Obenberger, 1935a : 170 ; 1936a : 1131 – Curletti, 1993 : 433.

Holotype : NMPC.

Distribution : MADAGASCAR.

• *Agrilus* (*s. g. indef.*) *tuberculicollis* Kerremans, 1894

Kerremans, 1894 : 352 – Alluaud, 1900b : 199 – Kerremans, 1903 : 292 – Théry, 1905 : 26, 140 – Obenberger, 1936a : 1132 – Curletti, 1993 : 433 ; 2005 : 287.

Holotype : BMNH.

Distribution : MADAGASCAR NORD : S.-P. de Diégo-Suarez / Antsiranana.

• *Agrilus* (*Agrilus*) *vayssieresii* Curletti, 2005

Curletti, 2005 : 285.

Holotype ♀ : MCCI.

Distribution : MADAGASCAR SUD : S.-P. de Tuléar Toliara : Ifaty.

Genre / Genus *Sjoestedtius* Théry, 1931

Sjoestedtius Théry, 1931a : 29 [Espèce type / Type species : *Kamosia thoracica* Kerremans, 1903 (dénomination ultérieure / subsequent designation : Théry, 1931a : 29)] – Obenberger, 1934b : 907 – Bellamy, 1985 : 427 (*Sjoestedtius*) ; 1986 : 233 ; 1990 : 574 ; 2003b : 92.

• *Sjoestedtius madegassus* Obenberger, 1939

Obenberger, 1939 : 65.

Holotype : NMPC.

Distribution : MADAGASCAR EST : Perinet / Andasibe.

Tribu / Tribe *Aphanisticini* Jacquelin du Val, 1863

Aphanisticites Jacquelin du Val, 1863 : 104 – Bellamy, 2003b : 92.

Aphanisticini Reitter, 1911 : 187 – Bedel, 1921 : 169 – Portevin, 1931 : 334 – Schaefer,

1949 : 441 – Bellamy, 1985 : 428 – Cobos, 1986 : 269 – Holyński, 1993a : 15 – Bellamy, 2003b : 92.

Sous-tribu / Subtribe **Aphanisticina** Jacquelin du Val, 1863

Aphanisticina Jacquelin du Val, 1863 : 104 – Holyński, 1993a : 15 – Bellamy, 2003b : 92.

Genre / Genus *Aphanisticus* Latreille, 1829

Aphanisticus Latreille, [1810 : 169] 1829 : 448 [Espèce type / Type species : *Aphanisticus pusillus* Gyllenhal, 1808 (dénomination ultérieure / subsequent designation : Westwood, 1840 : 25)] – Eschscholtz, 1829 : 9 – Théry, 1905 : 26, 141 ; 1912 : 123 (clé partielle des espèces / partial key to spp.) – Obenberger, 1937c : 102 (révision des espèces malgaches / revision of Madagascan spp.) – Bellamy, 2003b : 92.

• ***Aphanisticus aculeatus* Théry, 1930**

Théry, 1930c : 190 – Obenberger, 1937c : 107 ; 1937a : 1304.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Aphanisticus ambodiranus* Obenberger, 1937**

Obenberger, 1937c : 109 ; 1937a : 1304.

Holotype : NMPC.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de la Moramanga, « Ambodirano » (Est-ce / Is it Ambodivoro ou / or Ambodiriana ?), « Tanovano » (cacographie / cacography, probablement / probably Fanovana ?). MADAGASCAR SAMBIRANO : Nossi-Bé / Nosy Be.

• ***Aphanisticus angustifrons* Théry, 1912**

Théry, 1912 : 125 – Obenberger, 1937c : 104 ; 1937a : 1304.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR NORD : S.-P. de Diégo-Suarez / Antsiranana, montagne d'Ambre.

• ***Aphanisticus ater* Gory et Laporte de Castelnau, 1840**

Gory et Laporte de Castelnau, 1840 : 4, pl. 1, fig. 4 – Lacordaire, 1857 : 89 – Gemminger et Harold, 1869 : 1448 – Saunders, 1871 : 128 – Kerremans, 1892a : 281 – Alluaud, 1900b : 199 – Kerremans, 1903 : 305 – Théry, 1905 : 26, 142 – Obenberger, 1937c : 114 (*incertae sedis*) ; 1937a : 1304.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Aphanisticus auriculatus* Gory et Laporte de Castelnau, 1840**

Gory et Laporte de Castelnau, 1840 : 2, pl. 1, fig. 2 – Gemminger et Harold, 1869 : 1448 – Saunders, 1871 : 128 – Kerremans, 1892a : 281 – Alluaud, 1900b : 199 – Kerremans, 1903 : 305 – Théry, 1905 : 26, 142 ; 1912 : 124 – Obenberger, 1937c : 114 (*incertae sedis*) ; 1937a : 1304.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

nom indisponible / unavailable name : *madagascariensis* Dupont, 1836

Dupont, in Dejean, 1836 : 95 (*nom. nud.*) – Gemminger et Harold, 1869 : 1448 – Kerremans, 1892a : 281.

• ***Aphanisticus bison* Théry, 1930**

Théry, 1930c : 187 – Obenberger, 1937c : 113 ; 1937a : 1305.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Aphanisticus bouvieri* Théry, 1905**

Théry, 1905 : 26, 144 ; 1912 : 124 – Obenberger, 1937c : 109 ; 1937a : 1305 – Descarpentries, 1973 : 205.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Aphanisticus capricornis* Obenberger, 1940**

Obenberger, 1940 : 159.

Holotype : NMPC.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Aphanisticus carbonarius* Théry, 1930**

Théry, 1930c : 188 – Obenberger, 1937c : 105 ; 1937a : 1306.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR CENTRE : Tananarive / Antananarivo.

• ***Aphanisticus cervicornis* Obenberger, 1937**

Obenberger, 1940 : 160.

Holotype : NMPC.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Aphanisticus compactilis* Obenberger, 1937**

Obenberger, 1937c : 110 ; 1937a : 1306.

Holotype : NMPC.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Aphanisticus coronatus* Théry, 1930**

Théry, 1930c : 190 – Obenberger, 1937c : 105 ; 1937a : 1306.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Aphanisticus crassulus* Obenberger, 1937**

Obenberger, 1937c : 105 ; 1937a : 1306.

Holotype : NMPC

Distribution : MADAGASCAR CENTRE : Tananarive / Antananarivo.

• ***Aphanisticus cristatus* Kerremans, 1894**

Kerremans, 1894 : 353 – Alluud, 1900b : 199 – Kerremans, 1903 : 305 – Théry, 1905 : 26, 143 ; 1912 : 123 – Obenberger, 1937c : 103 ; 1937a : 1306.

Distribution : MADAGASCAR NORD : S.-P. de Diégo-Suarez / Antsiranana.

Holotype : BMNH.

• ***Aphanisticus cupreomicans* Obenberger, 1937**

Obenberger, 1937a : 1306 ; 1937c : 111.

Holotype : NMPC.

Distribution : MADAGASCAR EST : Perinet / Andasibe.

• ***Aphanisticus decaryi* Théry, 1930**

Théry, 1930c : 189 – Obenberger, 1937c : 105 ; 1937a : 1306.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR CENTRE : Tananarive / Antananarivo.

• ***Aphanisticus denticulatus* Théry, 1912**

Théry, 1912 : 128 – Obenberger, 1937c : 108 ; 1937a : 1307.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR NORD : S.-P. de Diégo-Suarez / Antsiranana, montagne d'Ambre.

• ***Aphanisticus diversulus* Obenberger, 1937**

Obenberger, 1937c : 111 ; 1937a : 1307.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR CENTRE : Tananarive / Antananarivo.

• ***Aphanisticus elegans* Théry, 1905**

Théry, 1905 : 26, 145 ; 1912 : 123 – Obenberger, 1937c : 102 ; 1937a : 1307.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Maroantsetra, baie d'Antongil.

• ***Aphanisticus elphus* Obenberger, 1937**

Obenberger, 1940 : 161.

Holotype : NMPC.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Aphanisticus genesti* Théry, 1930**

Théry, 1930c : 187 – Obenberger, 1937c : 103 ; 1937a : 1307.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR CENTRE : Tananarive / Antananarivo.

• ***Aphanisticus goudotii* Gory et Laporte de Castelnau, 1840**

Gory et Laporte de Castelnau, 1840 : 3, pl. 1, fig. 3 – Lacordaire, 1857 : 89 – Gemminger et Harold, 1869 : 1449 – Saunders, 1871 : 128 – Kerremans, 1892a : 282 ; 1894 : 353 – Alluaud, 1900b : 199 – Kerremans, 1903 : 305 – Théry, 1905 : 26, 142 ; 1912 : 123 – Obenberger, 1937c : 104 ; 1937a : 1307.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR NORD : S.-P. de Diégo-Suarez / Antsiranana.

• ***Aphanisticus grandidieri* Théry, 1912**

Théry, 1912 : 128 – Obenberger, 1937c : 113 ; 1937a : 1307.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR NORD : S.-P. de Diégo-Suarez / Antsiranana, montagne d'Ambre.

• ***Aphanisticus grossei* Obenberger, 1937**

Obenberger, 1937c : 108 ; 1937a : 1307.

Holotype : NMPC

Distribution : MADAGASCAR EST : Perinet / Andasibe.

• ***Aphanisticus herbigradus* Obenberger, 1937**

Obenberger, 1937c : 112 ; 1937a : 1308.

Holotype : NMPC.

Distribution : MADAGASCAR CENTRE : Tananarive / Antananarivo.

• ***Aphanisticus hova* Kerremans, 1899**

Kerremans, 1899 : 297 – Alluaud, 1900b : 199 – Kerremans, 1903 : 304 – Théry, 1905 : 26, 143 ; Obenberger, 1937c : 105 ; 1937a : 1308 (*hova*).

Holotype : BMNH.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Aphanisticus impressipennis* Fairmaire, 1901**

Fairmaire, 1901 : 164 – Kerremans, 1903 : 305 – Théry, 1905 : 26, 144 ; 1912 : 123 – Obenberger, 1937c : 103 ; 1937a : 1308.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR OUEST : environs de Suberbieville [= Maevatanana].

• ***Aphanisticus inornatus* Théry, 1905**

Théry, 1905 : 26, 143 ; 1912 : 124 – Obenberger, 1937c : 111 ; 1937a : 1308.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Aphanisticus integer* Théry, 1930**

Théry, 1930c : 191 – Obenberger, 1937c : 108 ; 1937a : 1308.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Aphanisticus integricollis* Théry, 1905**

Théry, 1905 : 26, 146 ; 1912 : 123 – Obenberger, 1937c : 104 ; 1937a : 1308.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Aphanisticus krusemanni* Obenberger, 1937**

Obenberger, 1937c : 109 ; 1937a : 1309.

Holotype : NMPC.

Distribution : MADAGASCAR EST : Perinet / Andasibe.

• ***Aphanisticus lamellicornis* Obenberger, 1937**

Théry, 1930c : 188 – Obenberger, 1937c : 113 ; 1937a : 1309.

Holotype : NMPC.

Distribution : MADAGASCAR CENTRE : Tananarive / Antananarivo.

• ***Aphanisticus lunifrons* Théry, 1930**

Théry, 1930c : 190 – Obenberger, 1937c : 107 ; 1937a : 1309.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Aphanisticus madagascariensis* Obenberger, 1937**

Obenberger, 1937c : 107 ; 1937a : 1309.

Holotype : NMPC.

Distribution : MADAGASCAR CENTRE : Tananarive / Antananarivo.

• ***Aphanisticus maleficus* Théry, 1905**

Théry, 1905 : 26, 147 ; 1912 : 124 – Obenberger, 1937c : 110 ; 1937a : 1309.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR NORD : S.-P. de Diégo-Suarez / Antsiranana.

• ***Aphanisticus mascarenicus* Descarpentries, 1973**

Descarpentries, 1973 : 204, fig. 6 – Gomy, 2000 : 62.

Holotype ♀ : MNHN.

Distribution : MASCAREIGNES : Maurice, la Réunion, Rodrigues.

• ***Aphanisticus mathiauxi* Théry, 1930**

Théry, 1930c : 188 – Obenberger, 1937c : 112 ; 1937a : 1309.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Aphanisticus mendax* Théry, 1930**

Théry, 1930c : 189 – Obenberger, 1937c : 109 ; 1937a : 1310.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR CENTRE : Tananarive / Antananarivo.

• ***Aphanisticus mirandulus* Obenberger, 1937**

Obenberger, 1937c : 113 ; 1937a : 1310.

Holotype : NMPC

Distribution : MADAGASCAR EST : Perinet / Andasibe.

• ***Aphanisticus mitratus* (Chevrolat, 1838)**

Goniophthalma mitratus Chevrolat, 1838a : 106 – *Aphanisticus mitratus* (Chevrolat) Lacordaire, 1857 : 89 – Gemminger et Harold, 1869 : 1449 – Saunders, 1871 : 128 – Kerremans, 1892a : 282 – Fairmaire, 1899b : 19 – Alluaud, 1900b : 199 – Kerremans, 1903 : 305 – Théry, 1905 : 26, 143 ; 1912 : 123 – Obenberger, 1937c : 113 ; 1937a : 1310.

Holotype : BMNH.

Distribution : MADAGASCAR CENTRE : Tananarive / Antananarivo.

synonyme / synonym : *bicornutus* Gory et Laporte de Castelnau, 1840

Gory et Laporte de Castelnau, 1840 : 2, pl. 1, fig. 1 – Lacordaire, 1857 : 89 – Gemminger et Harold, 1869 : 1449 [synonyme de / synonym of *mitratus*] – Saunders, 1871 : 128 – Kerremans, 1892a : 282 – Alluaud, 1900b : 199 – Kerremans, 1903 : 305 – Théry, 1905 : 26 – Obenberger, 1937a : 1310.

Holotype : MNHN.

• ***Aphanisticus nanissimus* Obenberger, 1937**

Obenberger, 1937c : 110 ; 1937a : 1310.

Holotype : NMPC.

Distribution : MADAGASCAR SAMBIRANO : Nossi-Bé / Nosy Be.

• ***Aphanisticus nitidulipennis* Obenberger, 1937**

Obenberger, 1937c : 106 ; 1937a : 1311.

Holotype : NMPC.

Distribution : MADAGASCAR CENTRE : Tananarive / Antananarivo.

• ***Aphanisticus nocivus* Théry, 1930**

Théry, 1930c : 191 – Obenberger, 1937c : 109.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Aphanisticus obtusicornis* Théry, 1930**

Théry, 1930c : 186 – Obenberger, 1937c : 103 ; 1937a : 1311.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Maroantsetra, baie d'Antongil.

• ***Aphanisticus perinetensis* Obenberger, 1937**

Obenberger, 1937c : 111 ; 1937a : 1311.

Distribution : MADAGASCAR EST : Perinet / Andasibe.

Holotype : NMPC.

• ***Aphanisticus plantivorus* Obenberger, 1937**

Obenberger, 1937c : 112 ; 1937a : 1311.

Holotype : NMPC

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de la Moramanga, « Ambodirano » (Est-ce / Is it Ambodivoro ou / or Ambodirana ?), « Tanovano » (cacographie / cacography, probablement / probably Fanovana ?). MADAGASCAR CENTRE : Tananarive / Antananarivo. MADAGASCAR EST : Perinet / Andasibe.

• ***Aphanisticus putus* Obenberger, 1937**

Obenberger, 1937c : 111 ; 1937a : 1312.

Holotype : NMPC.

Distribution : MADAGASCAR CENTRE : Tananarive / Antananarivo.

• ***Aphanisticus rollei* Théry, 1912**

Théry, 1912 : 124 – Obenberger, 1937c : 104 ; 1937a : 1312.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Aphanisticus rotundicollis* Théry, 1912**

Théry, 1912 : 127 – Obenberger, 1937c : 107 ; 1937a : 1312.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR NORD : S.-P. de Diégo-Suarez / Antsiranana, montagne d'Ambre.

• ***Aphanisticus sagax* Théry, 1930**

Théry, 1930c : 191 – Obenberger, 1937c : 104 ; 1937a : 1312.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Aphanisticus sicardi* Théry, 1905**

Théry, 1905 : 26, 146 ; 1912 : 124 – Obenberger, 1937c : 106 ; 1937a : 1312.

Distribution : MADAGASCAR NORD : S.-P. de Diégo-Suarez / Antsiranana.

Holotype : MNHN.

• ***Aphanisticus similis* Théry, 1930**

Théry, 1930c : 191 – Obenberger, 1937c : 110 ; 1937a : 1312.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Aphanisticus simplex* Fairmaire, 1901**

Fairmaire, 1901 : 163 – Kerremans, 1903 : 306 – Théry, 1905 : 26, 144 – Obenberger, 1937c : 106 ; 1937a : 1312.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR OUEST : Suberbieville [= Maevatanana].

• ***Aphanisticus stramineus* Obenberger, 1937**

Obenberger, 1937c : 112 ; 1937a : 1313.

Holotype : NMPC.

Distribution : MADAGASCAR CENTRE : Tananarive / Antananarivo.

• ***Aphanisticus sulciceps* Obenberger, 1937**

Obenberger, 1937c : 108 ; 1937a : 1313.

Holotype : NMPC.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Aphanisticus tananarivensis* Obenberger, 1937**

Obenberger, 1937c : 107 ; 1937a : 1313.

Holotype : NMPC.

Distribution : MADAGASCAR CENTRE : Tananarive / Antananarivo.

• ***Aphanisticus tanovanensis* Obenberger, 1937**

Obenberger, 1937c : 113 ; 1937a : 1313.

Holotype : NMPC.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de la Moramanga, « Tanovano » (cacographie / cacography, probablement / probably Fanovana ?). MADAGASCAR CENTRE : Tananarive / Antananarivo.

• ***Aphanisticus taurus* Théry, 1930**

Théry, 1930c : 187 – Obenberger, 1937c : 103 ; 1937a : 1313.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR CENTRE : Tananarive / Antananarivo.

• ***Aphanisticus tenuolus* Obenberger, 1937**

Obenberger, 1937c : 106 ; 1937a : 1313.

Holotype : NMPC

Distribution : MADAGASCAR CENTRE : Tananarive / Antananarivo.

• ***Aphanisticus tondui* Théry, 1912**

Théry, 1912 : 126 – Obenberger, 1937c : 103 ; 1937a : 1313.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR NORD : S.-P. de Diégo-Suarez / Antsiranana, montagne d'Ambre.

• ***Aphanisticus waterloti* Théry, 1930**

Théry, 1930c : 189 – Obenberger, 1937c : 106 ; 1937a : 1314.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR CENTRE : Tananarive / Antananarivo.

Sous-tribu / Subtribe **Cylindromorphina** Portevin, 1931

Cylindromorphina Portevin, 1931 : 335 – Cobos, 1960 : 248 (clé des genres / gen. key) – Holyński, 1993a : 15, 32 – Bellamy, 2003b : 93.

Genre / Genus *Heromorphus* Obenberger, 1916

Heromorphus Obenberger, 1916 : 105 [Espèce type / Type species : *Heromorphus howanus* Obenberger, 1916 (monotypie / monotypy)] ; 1944b : 20 – Cobos, 1954 : 5 – Bellamy, 1985 : 427 – Cobos, 1986 : 289 – Bílý et Bellamy, 1998 : 2 – Bellamy, 2003b : 94.

• ***Heromorphus howanus* Obenberger, 1916**

Obenberger, 1916 : 105 ; 1934b : 923.

Holotype : NMPC.

Distribution : MADAGASCAR.

Genre / Genus *Paracylindromorphus* Théry, 1930

Paracylindromorphus Théry, 1930e : 493 [Espèce type / Type species : *Aphanisticus subuliformis* Mannerheim, 1837 (dénomination ultérieure / subsequent designation : Cobos, 1986 : 291)] ; 1929b : 244 (clé des espèces malgaches / Madagascan spp. key) – Obenberger, 1934 : 923 – Bellamy, 2003b : 94.

- *Paracylindromorphus albifrons* (Théry, 1905)

Cylindromorphus albifrons Théry, 1905 : 26, 141, pl. V, fig. 28 ; 1929b : 244 – *Paracylindromorphus albifrons* (Théry) : Obenberger, 1934b : 924.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR : « Sikora » (nom d'un chasseur autrichien ! / name of an Austrian collector!).

- *Paracylindromorphus hova* Théry, 1929

Théry, 1929b : 246 – Obenberger, 1934b : 925.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR CENTRE.

- *Paracylindromorphus tananarivensis* Obenberger, 1942

Obenberger, 1942d : 110.

Holotype : NMPC.

Distribution : MADAGASCAR CENTRE : Tananarive / Antananarivo.

- *Paracylindromorphus waterloti* Théry, 1929

Théry, 1929b : 245 – Obenberger, 1934b : 928.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR CENTRE : Tananarive / Antananarivo.

Tribu / Tribe *Trachini* Gory et Laporte de Castelnau, 1839

« Trachisites, Trachisidae » Laporte de Castelnau, 1835 : 166 ; 1840 : 220 – Bellamy, 2003b : 95.

Trachysites Gory et Laporte de Castelnau, 1839 : 1 (7^e Groupe / 7th Group) ; 1840 : 220 – Kurosawa, 1959 : 203 – Cobos, 1979a : 425 ; 1986 : 269, 276, 277.

Genre / Genus *Trachys* Fabricius, 1801

Trachys Fabricius, 1801 : 218 [Espèce type / Type species : *Buprestis minuta* Linnaeus 1758 (dénomination ultérieure / subsequent designation: Westwood, 1840 : 25)] – Théry,

1905 : 11, 26, 148 (révision des espèces malgaches / Madagascan spp. revision) – Bellamy, 2003b : 95.

• ***Trachys alluaudi* Kerremans, 1894**

Kerremans, 1894 : 356 – Alluaud, 1900b : 200 – Kerremans, 1903 : 308 – Théry, 1905 : 26, 152 – Obenberger, 1937a : 1397.

Holotype : BMNH.

Distribution : MADAGASCAR NORD : Diégo-Suarez / Antsiranana.

• ***Trachys brevior* Fairmaire, 1901**

Fairmaire, 1901 : 165 – Kerremans, 1903 : 312 – Théry, 1905 : 27, 164 – Marie et Lesne, 1917 : 122 – Obenberger, 1937a : 1398.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR OUEST : région de Maevatanana, cause de Hukaru (nec de l'Ankara).

• ***Trachys cambouei* Théry, 1905**

Théry, 1905 : 27, 154, pl. V, fig. 33 – Obenberger, 1937a : 1398.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Maroantsetra, baie d'Antongil.

• ***Trachys compactus* Théry, 1905**

Théry, 1905 : 27, 149, 160, pl. VI, fig. 44 – Obenberger, 1937a : 1399.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Trachys corculum* Théry, 1905**

Théry, 1905 : 27, 149, 157, pl. VI, fig. 38 – Obenberger, 1937a : 1399.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR SUD : région de l'Androy.

• ***Trachys corinnus* Théry, 1905**

Théry, 1905 : 27, 149, 162, pl. VII, fig. 47 – Obenberger, 1937a : 1399.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR SUD : région de l'Androy.

• ***Trachys crassulus* Fairmaire, 1903**

Fairmaire, 1903a : 31 – Théry, 1905 : 27, 166 – Marie et Lesne, 1917 : 122 – Obenberger, 1937a : 1399.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR SUD : région de l'Androy.

synonyme / synonym : *nyctelius* Théry, 1905

Théry, 1905 : 155, pl. V, fig. 36 – Obenberger, 1928b : 342 (synonyme de / synonym of *crassulus*) ; 1937a : 1399.

Holotype : MNHN.

• ***Trachys creon* Théry, 1905**

Théry, 1905 : 27, 149, 160, pl. VI, fig. 45 – Obenberger, 1937a : 1400.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR SUD : région de l'Androy.

• ***Trachys cuneatus* Fairmaire, 1903**

Fairmaire, 1903a : 31 – Théry, 1905 : 27, 166 – Marie et Lesne, 1917 : 122 – Obenberger, 1937a : 1400.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR OUEST : S.-P. d'Ambato-Boeni, Ankirihitra (*nec* Ankarahitra).

• ***Trachys decorsei* Théry, 1905**

Théry, 1905 : 27, 148, 153, pl. V, fig. 32 – Obenberger, 1937a : 1400.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR SUD : région de l'Androy.

• ***Trachys deditus* Théry, 1905**

Théry, 1905 : 27, 140, 157, pl. VI, fig. 39 – Obenberger, 1937a : 1400.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR NORD : Diégo-Suarez / Antsiranana.

• ***Trachys deliae* Théry, 1905**

Théry, 1905 : 27, 149, 161, pl. VII, fig. 46 – Obenberger, 1937a : 1400.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR SUD : région de l'Androy.

• ***Trachys dirus* Théry, 1905**

Théry, 1905 : 27, 149, 158, pl. VI, fig. 40 – Obenberger, 1937a : 1400.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR NORD : Diégo-Suarez / Antsiranana.

• ***Trachys exsculptus* Kerremans, 1894**

Kerremans, 1894 : 356 – *Trachys exsculta* (*sic*) Kerremans : Alluaud, 1900b : 200 – Kerremans, 1903 : 308 – Théry, 1905 : 26, 148, 152 – Obenberger, 1937a : 1401.

Holotype : BMNH.

Distribution : MADAGASCAR NORD : Diégo-Suarez / Antsiranana.

• ***Trachys fairmairei* Kerremans, 1903**

Kerremans, 1903 : 311 – Théry, 1905 : 27, 162 – Obenberger, 1937a : 1401.

Holotype : BMNH.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Trachys fischeri* Théry, 1905**

Théry, 1905 : 27, 149, 159, pl. VI, fig. 43 – Obenberger, 1937a : 1401.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR SUD : région de l'Androy.

• ***Trachys grandiceps* Théry, 1905**

Théry, 1905 : 27, 158, pl. VI, fig. 41 – Kerremans, 1903 : 310 – Obenberger, 1937a : 1402.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Maroantsetra, baie d'Antongil.

• ***Trachys grandidieri* Théry, 1937**

Théry, 1937c : 111, fig. 16.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Trachys immotus* Théry, 1905**

Théry, 1905 : 27, 149, 156, pl. VI, fig. 37 – Obenberger, 1937a : 1402.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR SUD : région de l'Androy.

• ***Trachys imperatrix* Kerremans, 1894**

Kerremans, 1894 : 354 – Alluaud, 1900b : 200 – Kerremans, 1903 : 308, pl. 4, fig. 7 – Théry, 1905 : 26, 148, 152 – Obenberger, 1937a : 1402.

Holotype : BMNH.

Distribution : MADAGASCAR NORD : Diégo-Suarez / Antsiranana.

• ***Trachys magnificus* Kerremans, 1894**

Kerremans, 1894 : 355 – Alluaud, 1900b : 200 – Kerremans, 1903 : 308 – Théry, 1905 : 26, 152 – Obenberger, 1937a : 1403.

Holotype : BMNH.

Distribution : MADAGASCAR NORD : Diégo-Suarez / Antsiranana.

• ***Trachys medianus* Fairmaire, 1903**

Fairmaire, 1903a : 31 – Théry, 1905 : 27, 165 – Marie et Lesne, 1917 : 122 – Obenberger, 1937a : 1404.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR OUEST : environs de Suberbieville [= Maevatanana].

• ***Trachys micros* Fairmaire, 1901**

Fairmaire, 1901 : 166 – Kerremans, 1903 : 313 – Théry, 1905 : 27, 165 – Marie et Lesne, 1917 : 122 – Obenberger, 1928b : 342 ; 1937a : 1404.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR SUD : région de l'Androy. MADAGASCAR OUEST : région de Maevatanana, Belombe.

synonyme / synonym : *cribrosus* Fairmaire, 1901

Fairmaire, 1901 : 166 – Kerremans, 1903 : 313 – Théry, 1905 : 27, 165 – Marie et Lesne, 1917 : 122 – Obenberger, 1928b : 342 (synonyme de / synonym of *micros*) ; 1937a : 1404.

Holotype : MNHN.

synonyme / synonym : *kervillei* Théry, 1905

Théry, 1905 : 27, 159, pl. VI, fig. 42 – Obenberger, 1928b : 342 (synonyme de / synonym of *micros*) ; 1937a : 1404.

Holotype : MNHN.

• *Trachys niobae* Théry, 1905

Théry, 1905 : 27, 149, 155, pl. V, fig. 35 – Obenberger, 1937a : 1404.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR NORD : Diégo-Suarez / Antsiranana.

• *Trachys perrieri* Fairmaire, 1901

Fairmaire, 1901 : 164 – Kerremans, 1903 : 314 – Théry, 1905 : 26, 148, 151 – Marie et Lesne, 1917 : 122 – Obenberger, 1937a : 1405.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR : « Berkely » (probablement une cacographie / probably a cacography).

• *Trachys posticalis* Fairmaire, 1903

Fairmaire, 1903a : 31 – Théry, 1905 : 27, 165 – Marie et Lesne, 1917 : 122 – Obenberger, 1937a : 1406.

Holotype : BMNH.

Distribution : MADAGASCAR OUEST : S.-P. d'Ambato-Boeni, Ankirihitra (*nec* Ankarahitra).

• *Trachys sellatus* Fairmaire, 1901

Fairmaire, 1901 : 165 – Kerremans, 1903 : 310 – Théry, 1905 : 27, 164 – Marie et Lesne, 1917 : 122 – Obenberger, 1937a : 1407.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR OUEST : Betsiboka.

• *Trachys sicardi* Théry, 1905

Théry, 1905 : 27, 148, 153 – Obenberger, 1937a : 1407.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR NORD : S.-P. de Diégo-Suarez / Antsiranana, montagne d'Ambre.

• ***Trachys solitarius* Kerremans, 1894**

Kerremans, 1894 : 356 – Alluaud, 1900b : 200 – Kerremans, 1903 : 314 (*solitarius*) – Théry, 1905 : 27, 163 – Obenberger, 1937a : 1408.

Holotype : BMNH.

Distribution : MADAGASCAR NORD : Diégo-Suarez / Antsiranana.

• ***Trachys spectrum* Théry, 1905**

Théry, 1905 : 27, 149, 154, pl. V, fig. 34 – Obenberger, 1937a : 1408.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR SUD : région de l'Androy.

Genre / Genus *Habroloma* C. G. Thomson, 1864

Habroloma C. G. Thomson, 1864 : 42 [Espèce type / Type species : *Buprestis nanus* Paykull (dénomination ultérieure / subsequent designation : Schaefer, 1949 : 456)] – Bellamy, 2003b : 95.

• ***Habroloma apicatum* (Chevrolat, 1838)**

Trachys apicata Chevrolat, 1838 : 105 – Gemminger et Harold, 1869 : 1452 – Saunders, 1871 : 131 – Kerremans, 1892a : 284 ; 1894 : 356 – Alluaud, 1900b : 200 – Kerremans, 1903 : 312 – Théry, 1905 : 27, 163 – *Habroloma apicata* (Chevrolat) : Obenberger, 1937a : 1428.

Holotype : BMNH.

Distribution : MADAGASCAR.

synonyme / synonym : *acephala* (Gory et Laporte de Castelnau), 1840

Trachys acephala Gory et Laporte de Castelnau, 1840 : 2, pl. 1, fig. 1 – Erichson 1841 : 162 – Gemminger et Harold, 1869 : 1452 – Saunders, 1871 : 131 – Kerremans, 1892a : 284 – Alluaud, 1900b : 200 – Kerremans, 1903 : 312 – Théry, 1905 : 27 (synonyme de / synonym of *apicata*) – *Habroloma acephala* (Gory et Laporte de Castelnau) : Obenberger, 1937a : 1428.

Holotype : MNHN.

• ***Habroloma auberti* (Théry, 1912)**

Trachys auberti Théry, 1912 : 130 – *Habroloma auberti* (Théry) : Obenberger, 1937a : 1398.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Habroloma fasciatum* (Gory et Laporte de Castelnau, 1840)**

Trachys fasciata Gory et Laporte de Castelnau, 1840 : 4, pl. 1, fig. 5 – Gemminger et Harold, 1869 : 1452 – Saunders, 1871 : 131 – Kerremans, 1892a : 286 – Alluaud, 1900b : 200 – Kerremans, 1903 : 313 – Théry, 1905 : 163 – *Habroloma fasciata* (Gory et Laporte de Castelnau) : Obenberger 1937a : 1429.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Habroloma gaylae* Bellamy, 1999**

Bellamy, 1999 : 7 (nom. nov. de / for *Trachys auberti* Théry, 1937).

Distribution : MADAGASCAR.

synonyme / synonym : *auberti* Théry, 1937

Trachys auberti Théry, 1937c : 110 (nom. praeocc. par / by *Trachys auberti* Théry, 1912), fig. 15.

Holotype : MNHN.

• ***Habroloma hovasianum* (Kerremans, 1903)**

Trachys hovasiana Kerremans, 1903 : 311 – Théry, 1905 : 27, 162 –
Habroloma hovasiana (Kerremans) : Obenberger, 1937a : 1429.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR.

• ***Habroloma hovum* (Théry, 1905)**

Trachys hova Théry, 1905 : 150, pl. V, fig. 29 – Kerremans, 1903 : 308 – *Habroloma hova* (Théry) : Obenberger, 1937a : 1429.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Maroantsetra, baie d'Antongil.

• ***Habroloma mathiauxi* (Théry, 1909)**

Trachys mathiauxi Théry, 1909 : 446.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : Andavoranto.

• ***Habroloma mocquersyi* (Théry, 1905)**

Trachys mocquersyi Théry, 1905 : 150, pl. V, fig. 30 – *Habroloma mocquersyi* (Théry) : Obenberger, 1937a : 1429.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR EST : S.-P. de Maroantsetra, baie d'Antongil.

• ***Habroloma obsoletum* (Chevrolat, 1838)**

Trachys obsoleta Chevrolat, 1838 : 105 – Gemminger et Harold, 1869 : 1453 – Saunders, 1871 : 131 – Kerremans, 1892a : 287 ; 1894 : 356 – Alluaud, 1900b : 200 – Théry, 1905 : 27, 163 – *Habroloma obsoleta* (Chevrolat) : Obenberger, 1937a : 1405.

Holotype : BMNH.

Distribution : MADAGASCAR NORD : Diégo-Suarez / Antsiranana.

nom indisponible / unavailable name : *irrorata* Dupont, 1836

Dupont, in Dejean, 1836 : 94 (nom. nud.) – Gemminger et Harold, 1869 : 1453 – Kerremans, 1892a : 287.

synonyme / synonym : *marmorea* (Gory et Laporte de Castelnau, 1840)

Trachys marmorea Gory et Laporte de Castelnau, 1840 : 3, pl. 1, fig. 2 – Gemminger et Harold, 1869 : 1453 – Saunders, 1871 : 131 – Kerremans, 1892a : 287 (synonyme de / synonym of *obsoleta*) – Alluaud, 1900b : 200 – Théry, 1905 : 27 – *Habroloma marmorea* (Gory et Laporte de Castelnau) : Obenberger, 1937a : 1405.

Holotype : MNHN.

synonyme / synonym : *purpurea* (Gory et Laporte de Castelnau, 1840)

Trachys purpurea Gory et Laporte de Castelnau, 1840 : 3, pl. 1, fig. 3 – Gemminger et Harold, 1869 : 1453 – Saunders, 1871 : 131 – Kerremans, 1892a : 287 (synonyme de / synonym of *obsoleta*) – Alluaud, 1900b : 200 – Théry, 1905 : 27 – *Habroloma purpurea* (Gory et Laporte de Castelnau) : Obenberger, 1937b : 80 ; 1937a : 1405.

Holotype : MNHN.

synonyme / synonym : *quadrinotata* (Gory et Laporte de Castelnau, 1840)

Trachys quadrinotata Gory et Laporte de Castelnau, 1840 : 4, pl. 1, fig. 4 – Gemminger et Harold, 1869 : 1453 – Saunders, 1871 : 131 – Kerremans, 1892a : 287 – Alluaud, 1900b : 200 – Théry, 1905 : 27 (synonyme de / synonym of *obsoleta*) – *Habroloma quadrinotata* (Gory et Laporte de Castelnau) : Obenberger, 1937a : 1405.

Holotype : MNHN.

• ***Habroloma pigrum* (Théry, 1912)**

Trachys pigra Théry, 1912 : 131 – *Habroloma pigra* (Théry) : Obenberger, 1937a : 1406.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR NORD : S.-P. de Diégo-Suarez / Antsiranana, montagne d'Ambre.

• ***Habroloma pustulosum* (Fairmaire, 1903)**

Trachys pustulosa Fairmaire, 1903b : 201 – Théry, 1905 : 27, 166 – Marie et Lesne, 1917 : 122 – *Habroloma pustulosa* (Fairmaire) : Obenberger, 1937a : 1429.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR OUEST : S.-P. d'Ambato-Boeni, Ankirihitra (*nec* Ankarahitra).

• ***Habroloma velutinum* Théry, 1912**

Théry, 1912 : 129 – Obenberger, 1937a : 1430.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR NORD : S.-P. de Diégo-Suarez / Antsiranana, montagne d'Ambre.

• ***Habroloma vividum* (Théry, 1905)**

Trachys vivida Théry, 1905 : 26, 151, pl. V, fig. 31 – *Habroloma vivida* (Théry) : Obenberger, 1937a : 1430.

Holotype : MNHN.

Distribution : MADAGASCAR SUD : région de l'Androy.




Planche / plate 1 (traits d'échelle / scale bars = 1 mm). Fig. 1-3 : *Madassetia bicolor*, sp. nov. – 1 : habitus dorsal / dorsal habitus (holotype ♂). – 2 : habitus latéral / lateral habitus. – 3 : édéage / aedeagus, vue dorsale / dorsal aspect. Fig. 4-5 : *Madassetia unicolor*, sp. nov. – 4 : habitus dorsal / dorsal habitus (holotype ♂). – 5 : édéage / aedeagus, vue dorsale / dorsal aspect. Fig. 6-8 : *Compsaglypha nigrocaerulea*, sp. nov. – 6 : habitus dorsal / dorsal habitus (holotype ♂). – 7 : habitus latéral / lateral habitus. – 8 : édéage / aedeagus, vue dorsale / dorsal aspect. Fig. 9-11 : *Gracilocala bicolor*, sp. nov. – 9 : habitus dorsal / dorsal habitus (holotype ♂). – 10 : habitus latéral / lateral habitus. – 11 : édéage / aedeagus, vue dorsale / dorsal aspect.




Planche / plate 2 (traits d'échelle / scale bars = 1 mm). Fig. 12-13 : *Ivalouwayneia ruficapiticauda*, sp. nov. – 12 : habitus dorsal / dorsal habitus (aquarelle / watercolour : André Olwage). – 13 : édéage / aedeagus, vue dorsale / dorsal aspect. Fig. 14 : *Malagascoderes scriptus* (Théry, 1937), comb. nov. : habitus dorsal / dorsal habitus (aquarelle / watercolour : André Olwage). Fig. 15 : *Vadonaxia peyrierasi* Descarpentries, 1969 : habitus dorsal / dorsal habitus. Fig. 16-17 : *Paranastella strandi* Obenberger, 1931. – 16 : habitus dorsal / dorsal habitus (holotype ♂). – 17 : édéage / aedeagus, vue dorsale / dorsal aspect. Fig. 18-19 : *Paranastella villiersi* Descarpentries, 1984. – 18 : habitus dorsal / dorsal habitus (holotype ♂). – 19 : édéage / aedeagus, vue dorsale / dorsal aspect. Fig. 20-21 : *Paranastella viridis*, sp. nov. ; 20 : habitus dorsal / dorsal habitus (aquarelle / watercolour : André Olwage). – 21 : édéage / aedeagus, vue dorsale / dorsal aspect.




Planche / plate 3 (traits d'échelle / scale bars = longueur réelle / length). Fig. 22-23 : *Madecassia rothschildi* (Gahan, 1893). – 22 : habitus dorsal / dorsal habitus. – 23 : habitus ventral / ventral habitus. Fig. 24-25 : *Chalcophoropsis quadrifoveolata* (Laporte de Castelnau et Gory, 1836). – 24 : habitus dorsal / dorsal habitus. – 25 : habitus ventral / ventral habitus (specimen ISNB). Fig. 26-27 : *Apateum sexsulcatum* (Fairmaire, 1869). – 26 : habitus dorsal / dorsal habitus. – 27 : habitus ventral / ventral habitus.




Planche / plate 4 (traits d'échelle / scale bars = longueur réelle / length). Fig. 28-29 : *Polybothris auriventris* (Laporte de Castelnau et Gory, 1837). – 28 : habitus dorsal / dorsal habitus. – 29 : habitus ventral / ventral habitus. Fig. 30-31 : *Polybothris auropicta* (Laporte de Castelnau et Gory, 1836). – 30 : habitus dorsal / dorsal habitus. – 31 : habitus ventral / ventral habitus. Fig. 32-33 : *Polybothris goryi* (Guérin-Mèneville, 1833). – 32 : habitus dorsal / dorsal habitus. – 33 : habitus ventral / ventral habitus.




Planche / plate 5 (traits d'échelle / scale bars = longueur réelle / length). Fig. 34 : *Polybothris expansicollis* (Fairmaire, 1869) : habitus dorsal / dorsal habitus. Fig. 35-36 : *Polybothris pyropyga* Coquerel, 1851. – 35 : habitus dorsal / dorsal habitus. – 36 : habitus ventral / ventral habitus. Fig. 37-38 : *Polybothris quadricollis* (Laporte de Castelnau et Gory, 1836). – 37 : habitus dorsal / dorsal habitus. – 38 : habitus ventral / ventral habitus. Fig. 39 : *Anthaxia peyrierasi* Descarpentries, 1967 : habitus dorsal / dorsal habitus.




Planche / plate 6 (traits d'échelle / scale bars = longueur réelle / length). Fig. 40-43 : *Polybothris sumptuosa* (Klug, 1833). – 40, 41 : dorsal, habitus ventral / ventral habitus. – 42, 43 : dorsal, habitus ventral / ventral habitus. Fig. 44 : *Sambirania inflata* Descarpentries, 1968 : habitus dorsal / dorsal habitus. Fig. 45 : *Angatra parva* Descarpentries, 1969 : habitus dorsal / dorsal habitus.




Planche / plate 7 (traits d'échelle / scale bars = longueur réelle / length). Fig. 46 : *Falliellus richardi* Bellamy, 2001 : habitus dorsal / dorsal habitus (aquarelle / watercolour : André Olwage). Fig. 47 : *Dejongiella cavifrons* (Fairmaire, 1904) : habitus dorsal / dorsal habitus (aquarelle / watercolour : André Olwage). Fig. 48 : *Neefia magna* Bellamy, 2003 : habitus dorsal / dorsal habitus (aquarelle / watercolour : André Olwage). Fig. 49 : *Neefia semivestita* Bellamy, 2003 : habitus dorsal / dorsal habitus (aquarelle / watercolour : André Olwage). Fig. 50 : *Neefioides rufobasalis* (Fairmaire, 1897) : habitus dorsal / dorsal habitus (aquarelle / watercolour : André Olwage). Fig. 51 : *Sambus vadoni* Descarpentries, 1968 : habitus dorsal / dorsal habitus.




Planche / plate 8. Divisions phytogéographiques de Madagascar / Phytogeographic map of Madagascar (Service cartographique du Cirad).

Bibliographie / Bibliography

ALLUAUD C.

1896. – Contribution à la faune entomologique de la région malgache (4^e note). *Bulletin de la Société entomologique de France*, 1 : 33-36.

1900a. – Trois Coléoptères nouveaux pour la faune malgache. *Bulletin du Muséum national d'Histoire naturelle*, 6 (1) : 17-18.

1900b. – « Liste des insectes coléoptères de la région malgache ». In : A. Grandidier (éd.) : *Histoire physique, naturelle et politique de Madagascar*, volume 21, Histoire naturelle des Coléoptères, tome I, texte, 1^{re} partie. Paris, Imprimerie nationale, i-viii + 509 p.

BELLAMY C.L.

1985. – A catalogue of the higher taxa of the family Buprestidae (Coleoptera). *Navorsinge van die Nasionale Museum, Bloemfontein*, 4 (15) : 405-472.

1986. – Studies in the African Agrilinae, Coraebini IV (Coleoptera, Buprestidae). *Navorsinge van die Nasionale Museum, Bloemfontein*, 5 (8) : 93-167.

1988. – Studies in the African Agrilinae, Coraebini VI (Coleoptera, Buprestidae). *Journal of the Entomological Society of Southern Africa*, 51 (1) : 101-114.

1990. – Studies in the African Agrilinae, Agrilini II (Coleoptera: Buprestidae). *Revue de zoologie africaine*, 104 : 573-579.

1991a. – Studies in the Mastogeniinae (Coleoptera: Buprestidae). III. New species, combinations and a world catalogue. *Giornale Italiano di Entomologia*, 5 : 109-128.

1991b. – New species of *Phrixia* Deyrolle and *Belionota* Eschscholtz, from Luzon, Philippines with checklists of both genera (Coleoptera: Buprestidae). *The Coleopterists Bulletin*, 45 (4) : 341-349.

1995. – Authorship of *Galbellina* (Buprestidae). *The Coleopterists Bulletin*, 49 (1) : 7.

1996 (1995). – Comments on the genus *Agrilus* Curtis, 1825: Where do we go now and do we go together? (Coleoptera: Buprestidae: Agrilinae). *Elytron*, 9 : 77-86.

1997. – Clarification of authorship of certain generic names of Buprestidae (Coleoptera). *African Entomology*, 5 (2) : 217-224.

1998a. – Further replacement names in the family Buprestidae (Coleoptera). *African Entomology*, 6 (1) : 91-99.

1998b. – Type species designations in the family Buprestidae (Coleoptera). *Deutsche Entomologische Zeitschrift*, 45 (1) : 9-15.

1998c (1997). – A clarification of authorship of buprestid genera originally defined in the catalogues of P.F.M.A. Dejean (Coleoptera: Buprestidae). *Fragmenta Entomologica*, 29 (2) : 365-382.

1999. – Nomenclatural notes in Buprestidae (Coleoptera). *Folia Heyrovskyana*, 7 (1) : 1-11.

2001a. – The Madagascan *Coraebina* Bedel, 1921 (Coleoptera: Buprestidae: Agrilinae: Agrilini): Introduction and systematic catalogue. *Annals of the Transvaal Museum*, 38 : 57-70.

2001b. – The Madagascan *Coraebina* Bedel (Coleoptera: Buprestidae: Agrilinae): A new genus and species. *The Coleopterists Bulletin*, 55 (2) : 167-171.

2003a. – The Madagascan *Coraebini* (Coleoptera: Buprestidae: Agrilinae): Part 4. New genera and species. *Zootaxa*, 174 : 1-19, 3 pl.

2003b. – An illustrated summary of the higher classification of the superfamily Buprestoidea (Coleoptera). *Folia Heyrovskyana, Supplementum*, 10 : 197 p., 44 pl.

2003c. – Nomenclatural and taxonomic changes, new distribution and biological records for jewel beetles (Coleoptera: Buprestidae). *Insecta Mundi*, 16 (1-3) : 57-63.

BELLAMY C.L., d'HOTMAN D. et HOLM E.

1987. – A review of the Afrotropical Buprestinae with description of a new tribe, genera and species (Coleoptera, Buprestidae). *Journal of the Entomological Society of Southern Africa*, 50 (1) : 217-239.

BELLAMY C.L. et HOLM E.

1986. – A revision of the African species of *Galbella* (Coleoptera, Buprestidae). Republic of South Africa, Department of Agriculture and Water Supply, *Entomology Memoirs*, 63 : 1-41.

Bílý S.

1997. – World catalogue of the genus *Anthaxia* Eschscholtz, 1829 (Coleoptera: Buprestidae). *Folia Heyrovskyana, Supplementum*, 2 : 1-190.

2000. – A new concept of Anthaxiini (Coleoptera: Buprestidae). *Folia Heyrovskyana*, 8 (2) : 109-114.

Bílý S. et BELLAMY C.L.

1998. – A new cylindromorphine genus and species from Central Africa with comments on its relationships within the tribe (Coleoptera: Buprestidae: Cylindromorphini). *Folia Heyrovskyana*, 6 (1) : 1-6.

BRANCSIK K.

1893. – Beiträge zur Kenntniss Nossibés und dessen Fauna nach Sendungen und Mittheilungen des Herrn P. Frey. *Jahrbuch des Naturwissenschaftliche Vereines Trencsiner Comitates*, 16 : 202-258.

BUQUET J.B.L.

1854. – Description d'une nouvelle espèce de Buprestide du genre *Polybothris*. *Annales de la Société entomologique de France*, (3) 2 : 75-76.

CHEVROLAT L.A.A.

1838. – Centurie de Buprestides. *Revue entomologique*, 5 : 41-110.

COBOS A.

1954. – Dos Buprestidos nuevos (Insecta, Coleoptera) de África del Sur. *Bulletin de l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique*, 30 (27) : 1-8.

1955. – Estudio sobre los Ptosimites de Ch. Kerremans, (Coleoptera, Buprestidae). *Bulletin de l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique*, 31 (13) : 1-24.
1956. – Sexta nota sobre Buprestidos (Ins. Coleoptera) neotropicales: los *Mastogenius* Sol., de Sudamérica. *Revista Brasileira de Entomologia*, 5 : 203-218.
1960. – Estudio sobre los Cylindromorphini Portevin y descripciones de especies nuevas (Col. Buprestidae). *EOS, Revista Española de Entomología*, 36 (3) : 245-276.
1975. – Dos nuevas tribus de Buprestidos (Col. Buprestidae). *EOS, Revista Española de Entomología*, 49 : 87-104.
- 1979a. – Revisión de la subfamilia Trachyinae a niveles supraespecíficos (Coleoptera, Buprestidae). *Acta Entomologica Bohemoslovaca*, 76 : 414-430.
- 1979b. – Rectificaciones sinonimicas de Buprestidos (Col.) a niveles supraespecíficos Cinyrini nov. nom. (= Paraleptodromini Cobos, nom. nudum). *Boletín de la Asociación Española de Entomología*, 3 : 226.
- 1978 (1980). – Ensayo sobre los géneros de la subfamilia Polycestinae (Coleoptera, Buprestidae) (Parte I). *EOS, Revista Española de Entomología*, 54 : 15-94.
- 1981a. – Estudios sobre la subfamilia Mastogeniinae (Coleoptera: Buprestidae). *Boletín de Entomología Venezolana (N.S.)*, 1 (6) : 71-86.
- 1981b (1979-1980). – Ensayo sobre los géneros de la subfamilia Polycestinae (Coleoptera, Buprestidae): Parte II. *EOS, Revista Española de Entomología*, 55-56 : 23-94.
1986. – *Fauna ibérica de Coleopteros Buprestidae*. Madrid, Consenjo Superior de Investigaciones Científicas : 364 p.

COQUEREL C.

1848. – Observations entomologiques sur divers insectes recueillis à Madagascar. *Annales de la Société entomologique de France*, 6 (1) : 177-190 ; 6 (2) : 275-284.
1851. – Coléoptères nouveaux de Madagascar. *Revue et magasin de zoologie*, 2 (3) : 86-90.
1852. – Observations entomologiques sur divers Insectes recueillis à Madagascar. *Annales de la Société entomologique de France*, 2 (10) : 359-405.

CURLETTI G.

1993. – First contribution to the revision of the genus *Agrilus* of the Ethiopic region (Coleoptera, Buprestidae). *Lambillionea*, 93 (4-II) : 421-444.
1997. – Nuovi taxa Africani del Gen. *Agrilus* Curtis, 1825. VI. (Coleoptera, Buprestidae). *Elytron*, 10 (1996) : 123-134.
1998. – Notes on metatarsal morphology in the genus *Agrilus* and a proposed redefinition of its subgenera in the Afrotropical region (Coleoptera: Buprestidae). *Bullettino della Società Entomologica Italiana*, 130 (2) : 124-134.
- 2002a. – New African Agrilini species belonging to the genera *Agrilus* and *Bellamyus* (Coleoptera: Buprestidae). *Elytron*, 15 (2001) : 4-20.
- 2002b. – New *Agrilus* species from Africa and Madagascar, with a view on the subgenus *Personatus* Curletti, 1994, in general (Coleoptera, Buprestidae). *Mitteilungen des Museum Naturkunde der Berlin für Zoologische Reihe*, 78 (2) : 207-216.
2005. – *Agrilus* (*Agrilus*) *vayssieresii* sp. nov. del Madagascar (Coleoptera, Buprestidae). *Rivista Piemontese di Storia Naturale*, 26 : 285-288.

DEJEAN A.P.

1833. – *Catalogue des Coléoptères de la collection de M. le comte Dejean* (2^e édition, livraison 1). Paris, Méquignon-Marvis : 96 p.

1837. – *Catalogue des Coléoptères de la collection de M. le comte Dejean* (3^e édition, revue, corrigée et augmentée). Paris, Méquignon-Marvis : 503 p.

DESCARPENTRIES A.

1950. – Révision des Buprestides de la région malgache appartenant à la tribu des *Chrysobothrini*. *Le Naturaliste malgache*, 2 (1) : 7-46.

1955. – Un nouvel *Actenodes* malgache [Col. Buprestidae]. *Le Naturaliste malgache*, 7 (1) : 71-73.

1958a (1957). – *Sponsor* nouveaux de Madagascar et des îles Mascareignes [Col. Buprestidae]. *Bulletin de la Société entomologique de France*, 62 (7-8) : 199-208.

1958b. – Deux nouveaux *Actenodes* malgaches [Col. Buprestidae]. *Bulletin de la Société entomologique de France*, 63 (3-4) : 91-95.

1966 (1965). – Coléoptères Buprestidae de la région de la Baie d'Antongil (Madagascar). I. Ptosimini, genre *Sponsor* ; Acmaeoderini, genre *Acmaeodera*. *Bulletin de l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique*, 41 (39) : 1-49.

1967a (1966). – Un nouvel *Actenodes* malgache [Col. Buprestidae]. *Bulletin de la Société entomologique de France*, 71 (78) : 200-201.

1967b. – Révision des *Anthaxia* actuellement connus de Madagascar [Col. Buprestidae]. *Annales de la Société entomologique de France (N.S.)*, 3 (1) : 31-51.

1969a (1968). – Diagnoses de Buprestidae [Col.] nouveaux de Madagascar appartenant à la tribu des Coraebini. *Annales de la Société entomologique de France (N.S.)*, 4 (4) : 927-935.

1969b. – Deux Buprestides inédits de Madagascar appartenant à la tribu des Coraebini [Col.]. *Bulletin de Madagascar*, 19 (277-278) : 599-602.

1969c. – Diagnoses de Buprestidae [Col.] nouveaux de Madagascar. *Annales de la Société entomologique de France (N.S.)*, 5 (4) : 909-926.

1970 (1969). – Note sur un Buprestide inédit de Madagascar appartenant à une nouvelle tribu [Col.]. *Bulletin de la Société entomologique de France*, 74 (7-8) : 188-192.

1973. – Buprestides nouveaux des îles Mascareignes [Col.]. *Bulletin de la Société entomologique de France*, 78 (5-6) : 201-205.

1974. – Contribution à l'étude des Buprestidae de Madagascar [Col.]. *Annales de la Société entomologique de France*, 10 (3) : 577-587.

1975. – Deux nouveaux genres de Buprestidae de Madagascar [Col.]. *Bulletin de la Société entomologique de France*, 80 (1-2) : 19-25.

1976 (1975). – Note sur des Buprestides nouveaux de Madagascar appartenant à la tribu des Polycestini [Col.]. *Bulletin de la Société entomologique de France*, 80 (9-10) : 266-271.

1978. – Coléoptères Buprestidae de l'Archipel des Comores. *Mémoires du Muséum national d'Histoire naturelle (N.S.)*, série A, zoologie, 109 : 103-109.

1984. – Une nouvelle espèce de *Paranastella* malgache [Coleoptera, Buprestidae]. *Revue française d'entomologie (N.S.)*, 6 (2) : 57-58.

DESCARPENTRIES A. et VILLIERS A.

1967. – Catalogue raisonné des Buprestidae d'Indochine XIII. Coraebini (3^e partie). *Annales de la Société entomologique de France (N.S.)*, 3 (2) : 471-492.

DEYROLLE H.

1864. – Description des Buprestides de la Malaisie recueillis par M. Wallace. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 8 : 1-312.

DUPONT H.

1833. – Description du *Polybothris croesus*. *Magasin de zoologie*, 3 : 77, 1 pl.

ESCHSCHOLTZ J.F.

1829. – *Zoologischer Atlas, Abbildungen und Beschreibungen neuer Theierarten, während des Flottcapitains v. Kotzebue zweiter Reise um die Welt, auf der Russisch-Kaiserlichen Kriegsschiff Predpriaetië in den Jahren 1823-1826*. Berlin, G. Reimer, Erstes Heft : 1-17.

FABRICIUS I.C.

1787. – *Mantissa insectorum sistens eorum species nuper detectas adiectis characteribus genericis, differentiis specificis, emendationibus, observationibus*. Hafniae, C.G. Proft, 1 : 1-348 ; 2 : 1-382.

1801. – *Systema Eleutheratorum, ordines, genera, species : adiectis synonymis, locis, observationibus, descriptionibus*. Kiliae, Bibliopolii Academici Novi, 2 : 1-687.

FAIRMAIRE L.M.H.

1869. – Notes sur les Coléoptères recueillis par Charles Coquerel à Madagascar et sur les côtes d'Afrique. *Annales de la Société entomologique de France*, 4 (9) : 179-260.

1886. – Notes sur les Coléoptères recueillis par M. Raffray à Madagascar et descriptions des espèces nouvelles (2^e Partie). *Annales de la Société entomologique de France*, 6 (6) : 31-96.

1888. – Diagnoses de Coléoptères nouveaux de Madagascar. *Le Naturaliste*, (2) 1 : 56-57.

1889a. Diagnoses de Coléoptères madécasses. *Comptes-Rendus de la Séance de la Société entomologique de Belgique*, 33 : vi-ix, xc-xcvi.

1889b. – Description de quelques Buprestides et Cérambycides de la faune malgache. *Annales de la Société entomologique de France*, 68 : 110-124.

1891. – Description d'une nouvelle espèce de Buprestide : *Iridotaenia mahena*. *Annales de la Société entomologique de France*, 60 : 46.

1893. – Coléoptères des îles Comores. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 37 : 521-555.

1896. – Matériaux pour la faune coléoptérique de la région malgache. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 40 : 452-480.

1897. – Matériaux pour la faune coléoptérique de la région malgache (4^e note). *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 41 : 363-406.

1898. – Matériaux pour la faune coléoptérique de la région malgache (5^e note). *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 42 : 222-260.

1899a. – Description de quelques Buprestides et Cérambycides de la faune malgache. *Annales de la Société entomologique de France*, 68 : 110-124.

1899b. – « Buprestidae ». In : Liste des Coléoptères recueillis à Madagascar par MM. le Commandant Dorr, de l'infanterie de marine (1896-97) et le Lieutenant Jobit, du

13^e d'artillerie (1895-96). *Mémoires de la Société zoologique de France*, 12 (1^{re} partie) : 11-28.

1900. – Descriptions de Coléoptères recueillis par M. H. Perrier de la Bâthie à Madagascar [*Siagona*, *Tetragonoderus*, *Pygora*, *Acmaeodera*, *Myiodola*, *Damiria* et *Cassiodopsis*]. *Bulletin de la Société entomologique de France*, 5 : 85-90.

1901. – Matériaux pour la faune coléoptérique de la région malgache (11^e note). *Revue d'entomologie*, 20 : 101-248.

1902a. – Buprestides nouveaux recueillis par M. Ch. Alluaud, dans le sud de Madagascar [Col.]. *Bulletin de la Société entomologique de France*, 7 : 77-81.

1902b. – Matériaux pour la faune coléoptérique de la région malgache (12^e note). *Annales de la Société entomologique de France*, 71 : 325-388.

1903a. – Matériaux pour la faune coléoptérique malgache (15^e note). *Revue d'entomologie*, 22 : 13-46.

1903b. – Matériaux pour la faune coléoptérique de la région malgache (16^e note). *Annales de la Société entomologique de France*, 72 : 181-259.

1903c. – Matériaux pour la faune coléoptérique de la région malgache (17^e note). *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 47 : 358-380.

1903d. – Description de Coléoptères nouveaux de Madagascar. *Le Naturaliste*, 1903 : 9-11.

1904. – Matériaux pour la faune coléoptérique malgache (18^e note). *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 48 : 225-276.

1905. – Matériaux pour la faune coléoptérique malgache (19^e note). *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 49 : 114-138.

GEMMINGER M. et von HAROLD E.

1869. – *Catalogus coleopterorum hucusque descriptorum synonymicus et systematicus* (Buprestidae, Trixagidae, Monommidae, Eucnemidae, Elateridae, Cebrionidae). Londres, Monachii, 5 : 1347-1608.

GIANASSO D.

1999. – Una nuova specie di *Chalcophoropsis* Saunders, dell'isola di Mayotte (Coleoptera : Buprestidae). Torino, *Bollettino del Museo Regionale di Scienze Naturali*, 16 (1-2) : 321-326.

GISTEL J.N.F.X.

1848a. – *Naturgeschichte des Thierreichs für höhere Schulen*. Stuttgart : 216 p., 32 pl.

1848b. – *Faunula monacensis cantharologica*. Isis von Oken. [Fortsetzung is the title on p. 2 and ends in p. 4].

GOMY Y.

2000. – *Nouvelle liste chorologique des Coléoptères de l'archipel des Mascareignes*. Saint-Denis, Société réunionnaise des amis du Muséum : 140 p.

GORY H.L.

1840. – *Histoire naturelle et iconographie des insectes Coléoptères : supplément aux Buprestides*. Paris, P. Duménil, 4, livraisons 36-42. 1-72 ; *Sternocera*, *Julodis*, *Acmaeodera*, *Chrysochroa*, *Chrysodema*, *Ptosima*, *Coeculus* : 79-80 ; *Buprestis* : 81-106 ; *Polycesta* : 112-125.

1841. – *Histoire naturelle et iconographie des insectes Coléoptères : supplément aux Buprestides*. Paris, P. Duménil, 4, livraisons 43-52. *Melanophila* : 73-77 ; *Buprestis* : 107-111 et 126 ; *Stigmodera*, *Colobogaster*, *Chrysobothris*, *Belionota*, *Castalia*, *Poecilonota*, *Zemina*, *Stenogaster*, *Agrilus*, *Amorphosoma*, *Eumerus*, *Coraebus*, *Anthaxia*, *Evagora*, *Sphenoptera*, *Sponsor*, *Brachys*, *Trachys*, *Aphanisticus* : 127-356.

GORY H.L. et LAPORTE DE CASTELNAU F.L.

1837. – *Histoire naturelle et iconographie des insectes Coléoptères : monographie des Buprestides*. Paris, P. Duménil, 2, livraisons 12-16. *Colobogaster*, *Chrysobothris*, *Agrilus* (genres paginés séparément / genera paged separately).

1838. – *Histoire naturelle et iconographie des insectes Coléoptères : monographie des Buprestides*. Paris, P. Duménil, 2, livraisons 17-24. *Stigmodera*, *Polycesta*, *Belionota*, *Eurybia* (genres paginés séparément / genera paged separately).

1839. – *Histoire naturelle et iconographie des insectes Coléoptères : monographie des Buprestides*. Paris, P. Duménil, 2, livraisons 25-35. *Anthaxia*, *Evagora*, *Sphenoptera*, *Cratomerus*, *Sponsor*, *Cisseis*, *Castalia*, *Poecilonota*, *Zemina*, *Stenogaster*, *Pseudagrilus*, *Amorphosoma*, *Eumerus*, *Coraebus*, *Ethon*, *Brachys* : 1-3 (genres paginés séparément / genera paged separately).

1840. – *Histoire naturelle et iconographie des insectes Coléoptères : monographie des Buprestides*. Paris, P. Duménil, 2, livraisons 36-42. *Brachys* : 4-9. *Trachys*, *Aphanisticus*.

GRIVEAUD P.

1981. – « Les invertébrés : un univers prodigieux ». In : P. Oberlé (éd.) : *Madagascar, un sanctuaire de la Nature*. Paris, Lechevalier : 49-56, pl. 25-28.

GUÉRIN E.

1925. Une nouvelle espèce de *Polybothris* de Madagascar (Col. Buprestidae). *Miscellanea Entomologica*, 28 : 41.

GUÉRIN-MÉNEVILLE F.E.

1832a. – Description du *Buprestis aureopilosa*. *Magasin de zoologie*, 1 : 13.

1832b. – Description du *Buprestis scapularis*. *Magasin de zoologie*, 1 : 14.

1832c. – Description du *Buprestis complanata*. *Magasin de zoologie*, 1 : 25.

1832d. – Description du *Buprestis exophthalma*. *Magasin de zoologie*, 1 : 26.

1832e. – Description du *Buprestis colliciata*. *Magasin de zoologie*, 1 : 27.

1832f. – Description du *Buprestis rotundata*. *Magasin de zoologie*, 1 : 28.

1832g. – Description du *Buprestis cassidioides*. *Magasin de zoologie*, 1 : 29.

1840. – Note monographique sur le genre *Sponsor* de M. Gory, démembré du grand genre des Buprestides. *Revue zoologique* : 356-358.

HOLM E.

1978. – Monograph of the genus *Acmaeodera* Eschscholtz (Coleoptera: Buprestidae) of Africa south of the Sahara. *Department of Agricultural Technical Services Republic of South Africa Entomology Memoir*, 47: 1-210.

1979a. – Revision of the genera of the tribe Julodini (Coleoptera: Buprestidae). *Journal of the Entomological Society of Southern Africa*, 42 (1) : 89-114.

1979b. – Revision of the genera *Amblysterna* Thomson, *Neojulodis* Kerremans, and the African species of *Julodella* Semenow, plus Appendix. Republic of South Africa, Department of Agriculture and Water Supply, *Entomology Memoirs*, 51 : 1-35.

1982. – Revision of the Polycestini (Coleoptera: Buprestidae) of Africa. Republic of South Africa, Department of Agriculture, *Entomology Memoir*, 56 : 1-29.

1985. – Supplementary notes and descriptions of Ethiopian Acmaeoderinae, Julodinae and Polycestinae (Coleoptera: Buprestidae). *Journal of the Entomological Society of Southern Africa*, 48 (1) : 135-161.

HOLM E. et GUSSMANN S.

1992. – Revision of the genus *Sternocera* Eschscholtz, of Africa (Coleoptera: Buprestidae). Republic of South Africa, Department of Agricultural Development, *Entomology Memoir*, 85 : 1-84.

HOLM E. et SCHOEMAN A.S.

1999. – New subgenera and species of Afrotropical *Acmaeodera* Eschscholtz (Coleoptera: Buprestidae). *Cimbebasia*, 15 : 77-97.

HOLM E. et WENTZEL L.M.

1991. – Revision of the African species of *Sponsor* Castelnau et Gory (Coleoptera: Buprestidae: Polycestinae: Ptosimini). *Journal of the Entomological Society of Southern Africa*, 54 (1) : 51-59.

HOLYŃSKI R.

1984. – On Notogean and Oriental Mastogeniini L.C. Horn (Coleoptera, Buprestidae). *Polskie Pismo Entomologiczne*, 54 : 105-114.

1988. – Remarks on the general classification of Buprestidae Leach as applied to Maoraxiina Hol. *Folia Entomologica Hungarica*, 49 : 49-54.

1992. – A review of the genus *Paratrachys* Snd. (Coleoptera: Buprestidae). *Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology*, 3 : 115-136.

1993a. – A reassessment of the internal classification of the Buprestidae Leach (Coleoptera). *Crystal, series Zoologica*, 1 : 1-42.

1993b. – A new genus of Buprestidae from Madagascar. *Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology*, 4 : 163-167.

1997. – *Mroczkowskia* knot and the evolution of the subtribe Chrysochroina (Coleoptera: Buprestidae). *Annales Zoologici*, 47 (1-2) : 179-188.

2001. – Miscellaneous notes on *Iridotaenia* Deyr. and related genera (Col.: Bupr.). *Jewel Beetles*, 10 : 1-34.

HOSCHEK von MÜHLHAIMB A.F.

1927. – Beiträge zur Kenntnis der Buprestiden (Col.). II. *Deutsche Entomologische Zeitschrift*, 3 : 231-234.

1931a. – Beiträge zur Kenntnis der Buprestiden (Col.) III. *Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum in Berlin*, 17 (1) : 133-164.

1931b. – Beiträge zur Kenntnis der Buprestiden (Col.) IV. *Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum in Berlin*, 17 (5) : 724-743.

ICZN (INTERNATIONAL COMMISSION ON ZOOLOGICAL NOMENCLATURE)

1994. – Opinion 1784. *Buprestis* Linnaeus, 1758 and *Chrysobothris* Eschscholtz, 1829 (Insecta, Coleoptera): conserved by the designation of *Buprestis octoguttata* Linnaeus, 1758 as the type species of *Buprestis*, and *Chrysobothris* and *Dicerca* Eschscholtz, 1829: conserved as the correct original spellings. *Bulletin of Zoological Nomenclature*, 51 (3) : 280-282.

1999. – *International Code of Zoological Nomenclature* (4th edition) / *Code international de nomenclature zoologique* (4^e édition). International Trust for Zoological Nomenclature : XIX, 306 p.

JACQUELIN DU VAL C.

1863. – *Manuel entomologique : genera des Coléoptères d'Europe comprenant leur classification en familles naturelles, la description de tous les genres, des tableaux synoptiques destinés à faciliter l'étude, le catalogue de toutes les espèces, de nombreux dessins au trait de caractères*. Paris, A. Deyrolle, 3 : 463 p.

JAKOBSON G.G.

1912. – *Les Coléoptères de Russie et d'Europe occidentale II*. Saint-Petersbourg, F. Devrien : 657-864.

KERREMANS C.

1885. – Énumération des Buprestides décrits postérieurement au Catalogue de MM. Gemminger et de Harold. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 29 : 119-157.

1890. – Note sur les Chrysobothrides. *Compte rendu de la séance de la Société entomologique de Belgique*, 34 : cxxxiii-cxl.

1891. – Buprestides nouveaux et remarques synonymiques. *Compte rendu de la séance de la Société entomologique de Belgique*, 35 : clvi-clxiv.

1892a. – Catalogue synonymique des Buprestides décrits de 1758 à 1890. *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, 1 : 304 p.

1892b. – Voyage de M. Ch. Alluaud, dans le territoire d'Assinie (Afrique occidentale) en juillet et août 1886 : 11^e mémoire (Buprestidae). *Annales de la Société entomologique de France*, 61 : 301-304.

1893a. – Essai de groupement des Buprestides. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 37 : 94-122.

1893b. – Les Chrysobothrines d'Afrique. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 37 : 232-260.

1893c. – Diagnoses de Buprestides nouveaux. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 37 : 503-509.

1893d. – Buprestidae des îles Séchelles. *Annales de la Société entomologique de France*, 62 : ciii.

1894. – Mission scientifique de M. Ch. Alluaud, dans le territoire de Diégo-Suarez (Madagascar nord), avril-août 1893 : Buprestides. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 38 : 338-357.

1898a. – Buprestides du Congo et des régions voisines. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 42 : 272-329.

1898b. – Descriptions de Buprestides nouveaux de Madagascar (Col.). *Bulletin de la Société entomologique de France*, 3 : 78-84.

1899. – Buprestides de l'Afrique équatoriale et de Madagascar. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 43 : 256-298.
- 1900a. – Buprestides nouveaux et remarques synonymiques. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 44 : 282-351.
- 1900b. – Contribution à l'étude de la faune entomologique de Sumatra (Côte ouest, Vice-résidence de Painan) chasses de M.J.L. Weyers. VI. Buprestides. *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, 7 : 1-60.
1902. – « Coleoptera Serricornia, Fam. Buprestidae ». In : P. Wytsman (éd.) : *Genera Insectorum*, Fasc. 12a. Bruxelles, Verteneuil et Desmet : 1-48.
1903. – « Coleoptera Serricornia, Fam. Buprestidae ». In : P. Wytsman (éd.) : *Genera Insectorum*, Fasc. 12b, 12c et 12d. Bruxelles, Verteneuil et Desmet : 49-338.
1905. – *Monographie des Buprestides*. Volume 1. Livraisons 3 à 14 : 65-448. Bruxelles, J. Janssens.
- 1906a. – *Monographie des Buprestides*. Volume 1. Livraison 15 : 449-489 ; livraisons 16 à 18 : 481-534. Bruxelles, J. Janssens. Volume 2. Livraisons 1 à 8 : 1-256. Londres, Dulau and Co. ; Bruxelles, chez l'auteur ; Berlin, R. Friedländer and Son.
- 1906b. – Buprestides recueillis par M.L. Fea dans l'Afrique occidentale. *Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova*, 42 : 406-411.
1907. – *Monographie des Buprestides*. Volume 2. Livraisons 9 à 18 : 257-576 ; livraisons 19 et 20 : 557-623. Londres, Dulau and Co. ; Bruxelles, chez l'auteur ; Berlin, R. Friedländer and Son.
- 1908a. – *Monographie des Buprestides*. Volume 3. Livraisons 1 à 12 : 1-384. Londres, Dulau and Co. ; Bruxelles, chez l'auteur ; Berlin, R. Friedländer and Son.
- 1908b. – Catalogue raisonné des Buprestides de l'Egypte. *Bulletin de la Société entomologique d'Egypte*, 1 : 84-111 [tiré à part / reprint : 1-28].
- 1909a. – Catalogue raisonné de la faune entomologique du Congo belge. Coleoptera, Buprestidae. *Annales du Musée royal du Congo belge, zoologie, série III*, 1 (2) : 1-44.
- 1909b. – *Monographie des Buprestides*. Volume 3. Livraisons 13 à 19 : 385-602. Volume 4. Livraisons 1 à 5 : 1-160. Londres, Dulau et Co. ; Bruxelles, chez l'auteur ; Berlin, R. Friedländer et Son.
1910. – *Monographie des Buprestides*. Volume 4. Livraisons 6 à 9 : 161-284. Volume 5. Livraisons 1 à 8 : 1-256. Londres, Dulau and Co. ; Bruxelles, chez l'auteur ; Berlin, R. Friedländer and Son.
- 1911a. – Buprestides du Musée de Pretoria (Transvaal). *Annals of the Transvaal Museum*, 3 : 84-92.
- 1911b. – *Monographie des Buprestides*. Volume 5. Livraisons 9 à 20 : 257-640. Londres, Dulau and Co. ; Bruxelles, chez l'auteur ; Berlin, R. Friedländer and Son.
- 1912a. – H. Sauter's Formosa: Ausbeute. Buprestiden. *Archiv für Naturgeschichte*, 78 (A-7) : 203-209.
- 1912a. – *Monographie des Buprestides*. Volume 5. Livraison 21 : 641-662. Volume 6. Livraisons 1 à 3 : 1-96. Londres, Dulau and Co. ; Bruxelles, chez l'auteur ; Berlin, R. Friedländer and Son.

1912b. – Supplément au Catalogue des Buprestides du Congo belge. *Revue de zoologie africaine*, 2 : 1-14.

1913a. – Deuxième supplément au Catalogue des Buprestides du Congo belge. *Revue de zoologie africaine*, 2 : 439-448.

1913b. – *Monographie des Buprestides*. Volume 6. Livraisons 4 à 19 : 97-594. Volume 7. Livraisons 1 à 3 : 1-96. Londres, Dulau and Co. ; Bruxelles, chez l'auteur ; Berlin, R. Friedländer and Son.

1913c. – Note sur divers Coléoptères Buprestides des collections du Muséum d'Histoire naturelle de Paris. *Bulletin du Muséum national d'Histoire naturelle*, 19 : 575-580.

1914a. – Coleoptera, Buprestidae [of the Seychelles]. *Transactions of the Linnean Society of London*, 16 : 377-378.

1914b. – Troisième supplément au Catalogue des Buprestides du Congo belge. *Revue de zoologie africaine*, 3 : 347-364.

1914c. – « Buprestidae ». In : *Voyage de Ch. Alluaud et R. Jeannel en Afrique orientale (1911-1912)*. Résultats scientifiques, Mémoire 28, Coleoptera VI : 207-246.

1914d. – Coleoptera, Buprestidae. Percy Sladen Trust Expedition, Indian Ocean, Volume V. *Transactions of the Linnean Society of London, 2nd Series Zoology*, 16 (4) : 377-378.

Klug J.C.F.

1833. – Bericht über eine auf Madagascar veranstaltete Sammlung von Insecten aus der Ordnung Coleoptera. Berlin, *Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin*, Separatadruk : 135 p.

Kolubáč J.

2001 (2000). – Classification and phylogeny of the Buprestoidea (Insecta: Coleoptera). *Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae*, 85 : 113-184.

Kubáň V., Majer K. et Kolubáč J.

2001 (2000). Classification of the tribe Coraebini Bedel, 1921 (Coleoptera, Buprestidae, Agrilinae). *Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae*, 85 : 185-287.

Künckel d'Herculaïs J.

1890. – « Histoire naturelle des Coléoptères ». In : A. Grandidier (éd.) : *Histoire physique, naturelle et politique de Madagascar*. 22 (2), atlas, 1^{re} partie. Paris, Imprimerie nationale : 25 pl.

Kurosawa Y.

1959. – A revision of the leaf-mining buprestid-beetles from Japan and the Loo-Choo Islands. *Bulletin of the National Science Museum*, 4 (2) : 202-268.

1982. – A remarkable convergence found in Malayan buprestid beetles, with description of two new species from Thailand and Hainan. *Bulletin of the National Science Museum, Series A, Zoology*, 8 (4) : 173-204.

1993. – Reorganization of the genus *Psiloptera* (Coleoptera, Buprestidae). *Japanese Journal of Entomology*, 61 (3) : 577-583.

Kurosawa Y., Hisamatsu S. et Sasaji H. (eds).

1985. – *Colored illustrations of the Coleoptera of Japan*. Volume III (first edition). Osaka, Hoikusha Publishing : 500 p.

LACORDAIRE J.T.

1857. – *Histoire naturelle des insectes*. Volume 4 : *Genera des Coléoptères ou exposé méthodique et critique de tous les genres proposés jusqu'ici dans cet ordre d'Insectes* (Contenant les familles des Buprestides, Throscides, Eucnémides, Élatérides, Cébrionides, Cérophytides, Rhipicérides, Dascyllides, Malacodermes, Clérides, Lyméxylones, Cupésides, Ptinores, Bostrichides et Cissides). Paris, Roret, 4 : 554 p.

LAPORTE DE CASTELNAU F.L.

1835. – Études entomologiques ou descriptions d'insectes nouveaux et observations sur la synonymie, par M.F.L. de Laporte de Castelnau, Comte de Castelnau. *Revue d'entomologie*, 3 : 157-181.

1840. – *Histoire naturelle des animaux Articulés, Annelidés, Crustacés, Arachnides, Myriapodes et Insectes*. 1. *Histoire naturelle des insectes Coléoptères*. Paris, P. Duménil : 324 p.

LAPORTE DE CASTELNAU F.L. et GORY H.L.

1835. – *Histoire naturelle et iconographie des insectes Coléoptères* : monographie des Buprestides. Paris, P. Duménil. Volume 1, livraisons 1-7 (genres paginés séparément / genera paged separately).

1836. – *Histoire naturelle et iconographie des insectes Coléoptères* : monographie des Buprestides. Paris, P. Duménil. Volume 1, livraisons 8-11 (genres paginés séparément / genera paged separately).

1837. – *Histoire naturelle et iconographie des insectes Coléoptères* : monographie des Buprestides. Paris, P. Duménil. Volume 1, livraisons 12-16 (genres paginés séparément / genera paged separately).

LAWRENCE J. F. et NEWTON A. F. Jr.

1995. – « Families and subfamilies of Coleoptera (with selected genera, notes, references and data on family-group names) ». In : J. Pakaluk et S.A. Ślipiński (éd.) : *Biology, Phylogeny, and Classification of Coleoptera*. Papers Celebrating the 80th Birthday of Roy A. Crowson. Warszawa, Muzeum i Instytut Zoologii PAN : 779-1006.

LEACH W.E.

1815. – « Articles on entomology ». In : Brewster (éd.) : *Edinburgh encyclopaedia*, 9 (1) : 57-172.

LECONTE J.L.

1861. – Classification of the Coleoptera of North America. Prepared for the Smithsonian Institution. Part 1. *Smithsonian Miscellaneous Collections*, 3 : 1-25 ; 1-214.

LECONTE J.L. et HORN G.H.

1883. – Classification of the Coleoptera of North America. *Smithsonian Miscellaneous Collection*, 26 (507) : 38, 567 p.

LESNE P.

1918 (1917). – Coléoptères Buprestides des îles Mascareignes (Mission scientifique de M.P. Carié, 1910-1913). *Annales de la Société entomologique de France*, 86 : 437-472.

1924. – « Synopsis des Coléoptères Buprestides du genre *Sponsor* ». In : *Comptes rendus du Congrès des Sociétés savantes en 1923*, Paris : 43-56.

1932. – Coléoptères des îles Mascareignes (Mission Scientifique de P. Carié, 1910-1913). III. Supplément aux Buprestides. *Annales de la Société entomologique de France*, 101 : 21-24.

1937. – Les Coléoptères Buprestides du genre *Sponsor*. Etude systématique. *Annales des sciences naturelles*, séries botanique et zoologie, 10^e série, 20 : 109-166.

LEVEY B.

1978. – A new tribe, Epistomentini, of Buprestidae (Coleoptera) with a redefinition of the tribe Chrysochroini. *Systematic Entomology*, 3 : 153-158.

1992. – Phylogenetic relationships of *Stephansortia* Théry (Coleoptera: Buprestidae). *Journal of Natural History*, 26 : 449-454.

MANNERHEIM C.G. von

1837. – Enumération des Buprestides, et description de quelques nouvelles espèces de cette tribu de la famille des Sternoxes, de la collection de M. le comte Mannerheim. *Bulletin de la Société impériale des naturalistes de Moscou*, 8 : 1-126.

MARIE R. et LESNE P.

1917. – Catalogue des Coléoptères de la région malgache décrits ou mentionnés par L. Fairmaire, (1849-1906). *Bulletin du Muséum national d'Histoire naturelle*, Annexe, 7 : 1-180.

MEYER-DARCIS G.

1906. – Descriptions de deux *Polybothris* nouveaux [Col.] de Madagascar. *Bulletin de la Société entomologique de France*, 11 : 36.

NONFRIED A.F.

1892. – Beiträge zur Coleopteren Fauna von Afrika und Madagascar. *Entomologische Nachrichten*, 18 : 105-111, 117-127, 136-141.

OBERBERGER J.

1916. – Neue Buprestiden. *Coleopterologische Rundschau*, 5 : 97-107.

1916 (1917a). – Holarktische Anthaxien. Beitrag zu einer Monographie der Gattung. *Archiv für Naturgeschichte*, 82 (A-8) : 1-187.

1917b. – Neue Polybothrysarten (Coleoptera, Buprestidae). *Entomologische Blätter*, 13 : 278-285.

1917c. – Neue exotische *Agrilus*-Arten (Coleoptera, Buprestidae). *Coleopterologische Rundschau*, 6 : 32-37.

1916 (1918a). – Revision der paläarktischen Trachydinen (Coleoptera, Buprestidae), mit Einschluss einiger Beschreibungen exotischer Arten. *Archiv für Naturgeschichte*, 82 (A-11) : 1-74.

1918b. – Neue Formen aus der Gruppe Actenodites (Coleoptera, Buprestidae, Chrysobothrini). *Entomologische Mitteilungen*, 7 : 12-17.

1922. – Beiträge zur Kenntnis Buprestiden (Col.). *Archiv für Naturgeschichte*, 88 (A-12) : 64-168.

1923. – Řada nových rodů čeledi Buprestidae (Coleoptera) / Une série de nouveaux genres de Buprestides. *Acta Entomologica Musaei Nationalis Pragae*, 1 : 13-44.

1924a. – De Buprestidarum speciebus novis (Diagnoses praeliminares) / Nové druhy čeledi krasců. *Acta Entomologica Musaei Nationalis Pragae*, 2 : 93-115.

1924b. – Kritische studien über die Buprestiden (Col.). *Archiv für Naturgeschichte*, 90 (A-3) : 1-171.

1926a. – « Buprestidae 1 ». In : W. Junk et S. Schlenkling (éd.) : *Coleopterorum Catalogus*, Pars 84. Berlin, W. Junk : 212 p.

- 1926b. – Sphenopteritorum revisionis prodromus : de Sphenopteritorum speciebus exoticis (Col. Buprestidea) / Exotické druhy podčeledi Sphenopterini (Col. Buprestidae). *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae*, 4 : 3-79.
1927. – Die Sphenopterensubgenera *Hoplistura* B. Jak. und *Tropeopeltis* B. Jak. (Col., Bupr.). *Coleopterologische Centralblatt*, 2 : 151-201.
- 1928a. – Sur les Buprestides recueillis par MM. Alluaud et Jeannel dans la région du Kilimandjaro (Col., Bupr.) / Revise sbírky krasců, nalezených pp. Alluaudem a Jeannelem na Kilimandzaru. *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae*, 6 : 3-28.
- 1928b. (1926) – Opuscula Buprestologica I. Beiträge zur Kenntnis der Buprestiden (Col.). *Archiv für Naturgeschichte*, 92 (A-9-11) : 1-350.
1930. – « Buprestidae 2 ». In : W. Junk et S. Schlenkling (éd.) : *Coleopterorum Catalogus*, Pars 111. Berlin, W. Junk : 213-568.
- 1931a. – O krascích z rodu *Agrilus* z přibuzenstva afrického druhu *A. variegatus* Klug / Sur les *Agrilus* de l'Afrique du voisinage de l'*A. variegatus* Klug (Col. Bupr.). *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae* 9 : 84-98.
- 1931b. – Studien über die äthiopischen Buprestiden I. *Folia Zoologica et Hydrobiologica*, 2 : 175-201.
- 1931c. – Studien über die äthiopischen Buprestiden II. *Folia Zoologica et Hydrobiologica*, 3 : 84-127.
- 1931d. – Agrilenstudien I. (Col. Bupr.). *Entomologische Nachrichtenblatt*, 5 : 54-71.
1932. – Neue Beiträge zur Kenntnis der orientalischen Prachtkäfer (Col. Bupr.). *Folia Zoologica et Hydrobiologica*, 4 : 205-221.
- 1934a. – « Buprestidae 3 ». In : W. Junk et S. Schlenkling (éd.) : *Coleopterorum Catalogus*, Pars 132. Berlin, W. Junk : 569-781.
- 1934b. – « Buprestidae 4 ». In : W. Junk et S. Schlenkling (éd.) : *Coleopterorum Catalogus*, Pars 143. Berlin, W. Junk : 782-934.
- 1935a. – De regionis aethiopicae speciebus generis *Agrili* novis (Col. Bupr.) / Nové druhy krasců z rodu *Agrilus* z aethipské oblasti. *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae*, 13 : 149-210.
- 1935b. – Systematické a synonymické poznámky I / Notes systématiques et synonymiques sur les Buprestides (Col. Bupr.). *Acta Societatis Entomologicae Cechosloveniae*, 32 : 20.
- 1935c. – Synonymia Agrilorum. *Acta Societatis Entomologicae Cechosloveniae*, 32 : 43.
- 1935d. – Fragmenta Buprestologica IX. *Acta Societatis Entomologicae Cechosloveniae*, 32 : 87.
- 1935e. – Synonymia Agrilorum (Col. Bupr.) II. *Acta Societatis Entomologicae Cechosloveniae* 32 : 121.
- 1935f. – De regionis palaearcticae generis *Agrili* speciebus novis (Col. Bupr.) / O nových palaearktických druzích krasců z rodu *Agrilus*. *Acta Societatis Entomologicae Cechosloveniae*, 32 : 161-171.
- 1936a. – « Buprestidae 5 ». In : W. Junk et S. Schlenkling (éd.) : *Coleopterorum Catalogus*, Pars 152. 's Gravenhage, W. Junk : 935-1246.

- 1936b. – Etude analytique sur les *Janthe* de la région éthiopienne (Col. Bupr.) / Studie o krasicích z rodu *Janthe* z oblasti etiopské (Col. Bupr.). *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae*, 14 : 58-65.
- 1936c. – *Synonymia Agrilorum* (Col. Bupr.) II. *Acta Societatis Entomologicae Cechosloveniae*, 33 : 91-92.
- 1936d. – Eine Festschrift zum sechzigjährigen Jubiläum meines Freundes Univ. Prof. Dr. Embrik Strand. *Festschrift zum 60. Geburtstag von Professor Dr. Embrik Strand*, 1 : 97-145.
- 1937a. – « Buprestidae 6 ». In : W. Junk et S. Schenkling (éd.) : *Coleopterorum Catalogus*, Pars 157. 's Gravenhage, W. Junk : 1247-1714.
- 1937b. – Révision des espèces exotiques du genre *Trachys* Fabr. du continent africain / Přehled exotických druhů rodu *Trachys* africké pevniny. *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae*, 15 : 46-101.
- 1937c. – Révision des espèces malgaches du genre *Aphanisticus* (Col. Bupr.) / Revise madagaskarských druhů rodu *Aphanisticus* (Col. Bupr.). *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae*, 15 : 102-114.
1939. – *Sjoestedtius madegassus* n. sp. (Col. Bupr.). *Acta Societatis Entomologicae Bohemiae*, 36 : 65.
1940. – Nové exotické druhy rodu *Aphanisticus* Latr. (Col. Bupr.) / De novis generis *Aphanisticus* Latr. speciebus exoticis (Col. Bupr.). *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae*, 18 : 158-161.
1941. – *Mastogenius testaceipes* n. sp. *Acta Societatis Entomologicae Bohemiae*, 38 : 58-59.
- 1942a. – De Agrilinarum insulae Madagascaris generibus novis quinque / Pět nových rodů Agrilinů z ostrova Madagaskaru. *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae*, 20 : 7-13.
- 1942b. – De novis generis *Polybothris* speciebus et formis. (Col. Bupr.) / Nové formy rodu *Polybothris* (Col. Bupr.). *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae*, 20 : 30-49.
- 1942c. – De tribus generis *Agrilus* Sol. madegassis speciebus novis / Tři nové druhy rodu *Agrilus* Sol. z Madagaskaru. *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae*, 20 : 74-77.
- 1942d. – *Paracylindromorphus tananarivensis* n. sp. (Col. Bupr.). *Acta Societatis Entomologicae Bohemiae*, 39 : 110.
- 1944a (1943-44). – Dva nové madagaskarské druhy rodu *Phlocteis* Kerr. (Col. Bupr.) / De duabus generis *Phlocteis* Kerr. insulae Madagascaris speciebus novis (Col. Bupr.). *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae*, 21-22 : 420-422.
- 1944b. – K biologii rodu *Cylindromorphus* (Col. Bupr.) [On biology of the genus *Cylindromorphus*]. *Acta Societatis Entomologicae Bohemiae*, 41 : 20.
1946. – De novis generis *Entomogaster* Fairm. speciebus (Col. Bupr.) / Nové druhy rodu *Entomogaster* Fairm. (Col. Bupr.). *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae*, 24 : 159-164.
1958. – Generis *Lampropepla* Fairm. revisio (Col. Bupr.) / Revise rodu *Lampropepla* Fairm. (Col. Bupr.). *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae*, 32 : 491-493.

PERRIER DE LA BÂTHIE H.

1921. – La végétation malgache. *Annales du Musée colonial de Marseille*, 3 (9), 29^e année : 3-268, nombr. phot., tabl., 3 cartes, 1 carte coul. h.t.

PORTEVIN G.

1931. – *Histoire naturelle des Coléoptères de France. Tome II. Polyphaga : Lamellicornia, Palpicornia, Diversicornia.* Paris, Lechevalier, Encyclopédie entomologique, Série A, 13 : VII, 542 p.

REITTER E.

1911. – *Die Käfer, des Deutschen Reiches. Nach der analytische Methode bearbeitet. III. Band.* Stuttgart, K.G. Lutz Verlag, Fauna Germanica : 436 p.

RICHTER A.A.

1949. – « Zlatki (Buprestidae). Chast 2 ». In : E.N. Pavlovskii et A.A. Shtakelberg (éd.) : *Fauna SSSR. Nasekomye zhestkokrylye*, 13, vypusk 2. Moskva-Leningrad : 260 p. [en Russe / in Russian]

SAINVAL T. NEEF de

2000. – Description de deux nouvelles espèces de Buprestides du sous-genre *Polybothris* (Spinola, 1887) (Coleoptera, Buprestidae, Chalcophorinae, Psyllopterini, *Polybothris*). *Lambillionea*, 100 (1-I) : 70-79 ; 100 (2-II) : 337-339 (corrigenda).

SAUNDERS E.

1871. – *Catalogus Buprestidarum Synonymicus et Systematicus.* Londres, J. Janson : 171 p.

SCHAEFER L.

1949. – Les Buprestides de France. Tableaux analytiques des Coléoptères de la faune franco-rhénane. *Miscellanea Entomologica*, Supplément : 511 p.

SCHENKLING S.

1940. – « Index Generalis ». In : W. Junk et S. Schenkling (éd.) : *Coleopterorum Catalogus*, Pars 170. 's Gravenhage, W. Junk : iv, 502 p.

SNELLEN van VOLLENHOVEN S.C.

1874 (1869). – « Liste des insectes rapportés de l'île de la Réunion, des îles Comores et de Madagascar par MM. Pollen et van Dam. Description des espèces nouvelles de Coléoptères, Orthoptères, Lépidoptères et Hémiptères, mentionnées dans la liste précédente ». In : F.P.L. Pollen et D.C. van Dam (éd.) : *Recherches sur la faune de Madagascar et de ses dépendances d'après les découvertes de F.P.L. Pollen et D.C. van Dam*, 5^e partie, 1^{re} livraison, Insectes. Leyden, E.J. Brill : 9-10, pl. 1, fig. 6 et 6a.

SNELLEN van VOLLENHOVEN S.C. et de SÉLYS LONGSCHAMPS E.

1877. – « Insectes de Madagascar et de ses dépendances ». In : F.P.L. Pollen et D.C. van Dam (éd.) : *Recherches sur la faune de Madagascar et de ses dépendances, d'après les découvertes de F.P.L. Pollen et D.C. van Dam*, 5^e partie. Leyden, E.J. Brill.

SOUER A.J.J.

1849. – « Orden III. Coleopteros [Pentamera, Heteromera I.] ». In : C. Gay (éd.) : *Historia fisica y politica de Chile*, 4 : 105-380, 414-511.

SPINOLA M.

1837. – Lettre adressée à la Société entomologique de France sur un groupe de Buprestides. *Annales de la Société entomologique de France*, 6 : 101-122.

STEIN J.P.E.F.

1868. – *Catalogus Coleopterorum Europae.* Berolini, Friderici Nicolai : iv, 149 p.

STRAND E.

1942. – *Miscellanea nomenclatorica zoologica et palaeontologica X. Folia Zoologica et Hydrobiologica*, 11 (2) : 386-402.

THERY A.

1905. – *Révision des Buprestides de Madagascar*. 1^{re} partie : catalogue synonymique des Buprestides de Madagascar décrits au 1^{er} Janvier 1904. 2^e partie : révision sommaire des espèces de Buprestides Malgaches et description d'espèces nouvelles. Paris, Emile Deyrolle : 15-28 ; 29-179, 7 pl.

1909. – Coléoptères Buprestides nouveaux de Madagascar des collections du Muséum. *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, 7 : 444-447.

1910. – Buprestides nouveaux (2^e partie). *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, 18 : 1-58.

1912. – Descriptions de Buprestides nouveaux de Madagascar. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 56 : 108-135.

1926. – Descriptions de cinq Buprestides nouveaux de Madagascar. *Encyclopédie Entomologique, Série B, I. Coléoptères*, 1 (3) : 123-130.

1927. – Etude sur les Coléoptères Buprestides appartenant aux collections des grands musées (1^{re} note : British Museum). *Annales de la Société entomologique de France*, 96 (3-4) : 247-261.

1929a. – Révision monographie des espèces du genre *Belionota*. *Annales de la Société linéenne de Lyon*, 74 : 132-147.

1929b. – Espèces malgaches du genre *Paracylindromorphus* des collections du Muséum national d'Histoire naturelle. *Bulletin du Muséum national d'Histoire naturelle*, 2, 1 (4) : 244-247.

1930a (1929). – Essai du classement du genre *Pseudagrilus* (Col. Buprestidae). *Bulletin de la Société des sciences naturelles du Maroc*, 9 (7-8) : 122-138.

1930b (1929). – Buprestides nouveaux d'Afrique (Deuxième note). *Bulletin de la Société des sciences naturelles du Maroc*, 9 : 139-171.

1930c (1929). – Diagnoses préliminaires d'espèces du genre *Aphanisticus* Latr. *Bulletin de la Société des sciences naturelles du Maroc*, 9 (7-8) : 172-199.

1930d. – Recherches synonymiques sur les Buprestides et notes diverses. I. Note sur le genre *Galbella* avec descriptions d'espèces nouvelles. II. Observations concernant la préface du travail de M. Gebhardt. III. A propos de *Opuscula Buprestologica*. *Bulletin de la Société des sciences naturelles du Maroc*, 10 (1-6) : 21-53.

1930e (1928). – Études sur les Buprestides de l'Afrique du Nord. *Mémoires de la Société des sciences naturelles du Maroc*, 19 : 1-586.

1931a. – Recherches synonymiques sur les Buprestides et notes diverses. Suite (1). V. Genre *Genestia*. VI. *Gassneria*. VII. Variétés de *Sternocera interrupta*. *Bulletin de la Société des sciences naturelles du Maroc*, 11 (1-3) : 27-33.

1931b (1930). – Notes sur quelques espèces nouvelles du genre *Sponsor*. *Compte rendu de l'Association française pour l'avancement des sciences fusionnée avec l'Association scientifique de France* : 587-590.

1934 (1933). – Notes sur les espèces africaines de Buprestidae appartenant la tribu des Chrysobothrini sous-tribu des Actenodae. *Bulletin de la Société des sciences naturelles du Maroc*, 13 (7-8) : 234-253.

1935. – Note sur les Buprestides du Muséum de Leiden. *Zoologische Mededeelingen*, 18 : 241-256.

1936a. – Notes synonymique sur les Buprestides (Col.). *Bulletin de la Société entomologique de France*, 41 (4) : 59-61.

1936b. – Description d'un *Entomogaster* nouveau du Musée d'Histoire naturelle de Genève. *Revue suisse de zoologie*, 43 (33) : 697-699.

1937a (1935-36). – Descriptions de Buprestides nouveau de la faune malgache (1^{re} série). *Annales de l'Association des naturalistes de Levallois-Perret*, 22 : 83-112.

1937b (1936). – Buprestides nouveaux d'Afrique (5^e note). *Bulletin de la Société des sciences naturelles du Maroc*, 16 (3) : 217-238.

1943. – Questions de nomenclature (3^e note). *Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon*, 12 : 147-149.

1955. – Buprestides des provinces de Rhodésie du Sud, du Transvaal, du Natal et du Cap, au Transvaal Museum. *Annals of the Transvaal Museum*, 22 : 391-400.

THOMSON C.G.

1864. – *Skandinaviens Coleoptera*. Synoptiski bearbetade, Lund, Lundbergiska Boktryckeriet, 6 : 385 p.

THOMSON J.

1878a. – Buprestides Polybothroides. *Revue et magasin de zoologie*, 3 (6) : 313-351.

1878b. – Observation sur le groupe des Psiloptérites, et notamment sur le genre *Psiloptera* Solier, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1833, p. 283. In *Typi Buprestidarum Musaei Thomsoniani*. Paris, E. Deyrolle : 28-36.

1879. – Revue du groupe des Psiloptérites : description d'espèces nouvelles de Psiloptérites. *Revue et magasin de zoologie*, 3 (7-42) : 161-177.

THUNBERG C.P.

1789. – *Novas Insectorum species*. Uppsala, Dissertation, 5 : 85-106.

TÔYAMA M.

1986. – Notes on the buprestid genus *Neosambus* (Coleoptera, Buprestidae). *Elytra*, 14 (2) : 57-60.

1987. – The systematic positions of some buprestid genera (Coleoptera, Buprestidae). *Elytra*, 15 (1-2) : 1-11.

VIETTE P.

1991. – Principales localités où des Insectes ont été recueillis à Madagascar / Chief field stations where Insects were collected in Madagascar. *Faune de Madagascar, Supplément*, 2 : 88 p.

VINSON J.

1960. – Catalogue of the Coleoptera of Mauritius and Rodriguez. Part III. *The Mauritius Institute Bulletin*, 4 (3) : 131-196.

1967. – Liste chorologique des Coléoptères des Mascareignes. *The Mauritius Institute Bulletin*, 4 (5) : 299-372.

VOELTZKOW A.

1917. – Flora und Fauna der Comoren. Reise in Ostafrika in den Jahren 1903-1905. *Wissenschaftliche Ergebnisse Band III, Systematische Arbeiten*, 5 : 429-480.

VOVKOVITSH M.G.

1979. – Obzor palearkticheskikh grupp zlatok triby Acmaeoderini (Coleoptera, Buprestidae). *Entomologicheskoe Obozrenie*, 58 (2) : 333-354 [en Russe / in Russian].
[1980. – A review of Palaearctic groups of the tribe Acmaeoderini (Coleoptera, Buprestidae). *Entomological Review*, 58 (2) : 78-99.]

2001. – The comparative morphology of antennal structures in Buprestidae (Coleoptera): evolutionary trends, taxonomic and phylogenetic implications. Part 1. Brno, *Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae*, 86 : 43-169.

VOVKOVITSH M.G. et BELLAMY C. L.

1992. – A new genus of Buprestidae (Coleoptera) from Southern Africa with notes on the taxonomy of African Acmaeoderini. *The Coleopterists Bulletin*, 46 (3) : 297-305.

VOVKOVITSH M.G. et BILÝ S.

2001. – Larvae of *Galbella acaciae* and *G. felix* with notes on the systematic position of *Galbella* (Coleoptera: Buprestidae: Galbellinae). *Acta Societatis Zoologicae Bohemicae*, 65 : 135-152.

WATERHOUSE C.O.

1877. – Descriptions of twenty new species of Coleoptera from various localities. *The Transactions of the Entomological Society of London*, 1 : 1-13.

1880. – On the Buprestidae from Madagascar. *The Transactions of the Entomological Society of London* : 179-196.

1882. – Descriptions of new Cetoniidae, Buprestidae, and Cerambycidae from Madagascar. *The Annals and Magazine of Natural History*, 5 (9) : 321-328.

1885. – On the insects collected on Kilimanjaro by Mr. H.H. Johnston. *Proceedings of the Zoological Society of London* : 230-235.

1887. – Descriptions of new Coleoptera in the British Museum. *The Annals and Magazine of Natural History*, 5 (19) : 289-296.

WESTWOOD J.O.

1840. – *Synopsis of the genera of British Insects, published with an introduction to the modern classification of insects, founded on the natural habits and corresponding organisations of the different families*. Londres, Longman, 2 : 587 p.

1848. – *The Cabinet of Oriental Entomology, being a selection of some of the rarer and more beautiful species of insects, natives of India and the adjacent islands, the greater portion of which are now for the first time described and figured*. Londres, William Smith, 88 p.

ZIMSEN E.

1964. – *The type material of I.C. Fabricius*. Copenhagen, Munksgaard : 656 p.

Index des genres et des taxa supragénériques

Index of genus, tribe and subfamily-group names

Les genres nouveaux sont signalés par un astérisque / New genus have an asterisk.

Les genres valides sont en italiques, les synonymes et les taxa supragénériques en romain / Valid genus in italics, synonyms and suprageneric names in Roman.

Les taxa nouveaux sont signalés par un astérisque / New taxa have an asterisk.

Les chiffres en caractère gras indiquent les pages où figure une illustration / pictures pages in bold.

Acmaeodera, 43, 44, 45, 46, 50

Acmaeoderini, 43

Actenodes, 162, 163, 164, 165

Actenodina, 162

Agrilinae, 167

Agrilini, 190

Agrilus, 31, 37, 38, 174, 189, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199

Alampetis, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 104, 134

Aldabrica, 65

Amblysterna, 39, 40

Amphisbeta, 88, 90, 117, 127, 128, 146

Anadora, 37

Angatra, 183, **222**

Ankareus, 41, 42, 43

Annietta, 176

Antanambia, 183

Anthaxia, 156, 157, 158, 159, 160, 172, 175, **221**

Anthaxiina, 156

Anthaxiini, 156

Apateum, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, **219**

Aphanisticina, 200

Aphanisticini, 199

Aphanisticus, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209

Aplax, 88, 130

Brachmaeodera, 43, 45

Brachydora, 168, 169

Buprestinae, 154

Carcinias, 88, 93, 105, 115, 141, 142

Cassidabothris, 88, 90, 105, 125

Castaliella, 66

Chalcophoropsis, 13, 70, 71, **72, 219**

Chloricala, 28, 177, 178

Chrysobothrina, 160

Chrysobothrini, 160

Chrysobothris, 160, 161, 162, 164

Chrysochroina, 69

- Chrysochroinae*, 69
Coccinellopsis, 88, 91, 95, 96, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 112, 113, 118, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 139, 140, 143, 144, 149, 151, 152
Compsoglypha, 15, 16, 23, 26, 169, **217**
Coraebastus, 176
Coraebina, 188
Coraebini, 15, 16, 23, 26, 29, 31, 33, 37, 168
Coraebus, 170, 171, 188, 195
Cornelia, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 99, 107, 108, 109, 116, 120, 124, 125, 126, 133, 134, 135, 137, 138, 140, 142, 146, 147, 149, 150, 151
Cylindromorphina, 208
Dejongiella, 185, **223**
Dipolophotus, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199
Discoderes, 15, 16, 23, 31, 32, 33, 34, 37, 168, 170, 171, 180, 182, 185, 186, 187, 188
Discoderopsis, 180
Duttus, 191, 193, 198
Enharpya, 89, 92
Entomoderes, 172, 174, 191
Entomogaster, 157, 158, 159, 172, 173, 174, 175, 186, 189, 191
Erebodes, 89, 110, 114, 120, 145
Euridotaenia, 70
Eumorphocerus, 175
Evimantius, 176
Falliellus, 184, **223**
Galbella, 67, 68, 69
Galbellinae, 67
Gigantocoraebus, 170
** Gracilocala*, 15, 16, 27, 28, 178, **217**
Habroloma, 214, 215, 216
Haplanthaxia, 156, 157, 158, 159, 160
Haplostethini, 40
Hemisobothris, 89, 119, 133, 137, 138
Heromorphus, 208
Icaria, 152, 153
Icarina, 152, 153
Iridotaenia, 70
** Ivalouwayneia*, 15, 16, 29, 30, 179, **218**
Janthe, 67, 68, 69
Jaroslavia, 178
Julodinae, 39
Julodini, 39
Laconides, 89, 94, 102, 103, 111, 112, 119, 122, 125, 131, 133, 137, 141
Lampetis, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 134, 150
Lampropepla, 71
Lampropeplina, 70
** Madaphlocteis*, 15, 16, 32, 33, 34, 187, 188
** Madassetia*, 15, 16, 23, 24, 25, 155, 156, **217**
Madecacesta, 66, 67
Madecassia, 70, 71, **219**
Madecastalia, 64, 65
** Malagascoderes*, 15, 31, 32, 186, **218**
Mandritsaria, 182, 183
Maroantsetra, 29, 30, 35, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 78, 83, 84, 125, 128, 135, 141, 157, 159, 160, 161, 163, 165, 174, 177, 178, 180, 181, 184, 185, 186, 191, 202, 206, 210, 212, 215
Mastogenius, 40, 41, 43
Meliboeina, 188
Meliboeus, 15, 16, 37, 189, 190

- Micropolycesta*, 65, 66
Midongya, 84, 183
Neefia, 185, 186, **223**
Neefioides, 186, **223**
Neoptosima, 46, 50, 51, 54, 57, 61
Nisibia, 37, 38
Obenbergerietta, 41
Oncomaea, 67
Oomorpha, 46, 52
Palaeobothris, 89, 132
Paracastalia, 15, 16, 36, 37, 64
Paracylindromorphus, 209
Paradora, 15, 16, 34, 168, 169, 170, 171, 188
Paranastella, 15, 16, 23, 34, 35, 171, 172, **218**
Paraphrixia, 155
Parapolycesta, 64
Paratrachyini, 46
Peyrierasina, 184
Phlocteis, 15, 16, 23, 31, 32, 33, 34, 170, 171, 179, 180, 182, 185, 186, 187, 188
Phobetodes, 89, 99, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 139
Phrixiini, 155
Polybothris, 13, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, **97**, 98, **99**, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, **119**, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, **128**, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, **142**, 143, 144, 145, 146, 147, **148**, 149, 150, 151, 152, 153, 169, **220**, **221**, **222**
Polycestaxia, 66
Polycestinae, 40
Polycestini, 64
Pseudagrilus, 191
Pseudianthe, 41, 42, 60
Pseudocoraebus, 177
Pseudopolycesta, 65
Pseudophthalma, 87, 150
Ptosimoides, 47
Pycnobothris, 89, 90, 101, 106, 107, 109, 120, 125, 126, 133, 138, 140, 142, 146, 147, 150, 151
Sambirania, 180, 181, **222**
Sambus, 190, **223**
Seranambia, 179
Seyrigia, 184
Sicardia, 41, 42, 43
Sjöstedtius, 199
Speophora, 170
Sphenoptera, 153, 154
Sphenopterina, 153
Sponsor, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
Sponsorinus, 67, 68
Stenianthe, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69
Suarezia, 169, 170
Suarezina, 146, 169
Toxoscelina, 34, 168
Trachini, 209
Trachys, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216
Tropeopeltis, 153, 154
Vadonaxia, 69, 70, **218**
Vadonaxiini, 69

Index des espèces / Index of species-group names

Les taxa valides sont en italiques, les synonymes en romain / Valid taxa in italics, synonyms in roman.

Les taxa nouveaux sont signalés par un astérisque / New taxa have an asterisk.

Les chiffres en caractère gras indiquent les pages où figure une illustration / pictures pages in bold.

- | | |
|--|---|
| <i>abeillei</i> (<i>Agrilus</i>), 192 | <i>aeneostictica</i> (<i>Lampetis</i>), 73 |
| <i>abeillei</i> (<i>Apateum</i>), 82 | <i>aeneus</i> (<i>Actenodes</i>), 162 |
| <i>acephala</i> (<i>Habroloma</i>), 214 | <i>aeneus</i> (<i>Sponsor</i>), 47 |
| <i>acripes</i> (<i>Polybothris</i>), 90 | <i>aeneus</i> (<i>Ankareus</i>), 41 |
| <i>acroneus</i> (<i>Agrilus</i>), 192 | <i>aequalipennis</i> (<i>Entomogaster</i>), 172 |
| <i>actenia</i> (<i>Polybothris</i>), 152 | <i>aequalipennis</i> (<i>Polybothris</i>), 107 |
| <i>aculeatus</i> (<i>Aphanisticus</i>), 200 | <i>aequalis</i> (<i>Polybothris</i>), 131, 132, |
| <i>acuminatum</i> (<i>Apateum</i>), 79 | <i>affinis</i> (<i>Apateum</i>), 84 |
| <i>acuminipennis</i> (<i>Actenodes</i>), 162 | <i>alata</i> (<i>Icaria</i>), 152 |
| <i>adelpa</i> (<i>Polybothris</i>), 109 | <i>albicollis</i> (<i>Suarezia</i>), 169, 170 |
| <i>adpersipennis</i> (<i>Polybothris</i>), 90 | <i>albifrons</i> (<i>Actenodes</i>), 163 |
| <i>aenea</i> (<i>Polybothris</i>), 133 | <i>albignaci</i> (<i>Madecastalia</i>), 64, 65 |
| <i>aeneicollis</i> (<i>Polybothris</i>), 90 | <i>albomaculatus</i> (<i>Meliboeus</i>), 189 |
| <i>aeneicollis</i> (<i>Sambirania</i>), 180 | <i>alboplagiata</i> (<i>Polybothris</i>), 91, 127 |
| <i>aeneidorsis</i> (<i>Apateum</i>), 82 | <i>albopunctata</i> (<i>Seyrigia</i>), 184 |
| <i>aeneipes</i> (<i>Apateum</i>), 79 | <i>albosparsa</i> (<i>Lampetis</i>), 73 |
| <i>aeneiventris</i> (<i>Sponsor</i>), 47 | <i>alcyon</i> (<i>Polybothris</i>), 119 |
| <i>aeneolus</i> (<i>Sponsor</i>), 47 | <i>aliena</i> (<i>Polybothris</i>), 127 |
| <i>aeneomaculata</i> (<i>Polybothris</i>), 90, 91, 104 | <i>alluaudi</i> (<i>Actenodes</i>), 163 |

- alluaudi* (*Lampetis*), 74
alluaudi (*Polybothris*), 98
alluaudi (*Sponsor*), 47
alluaudi (*Trachys*), 210
ambanjana (*Madaphlocteis*), 33, 187
ambiguum (*Apateum*), 80
ambiguus (*Sponsor*), 47
ambodimanganus (*Agrilus*), 192
ambodiranus (*Aphanisticus*), 200
ambositrensis (*Mandritsaria*), 182
amethystina (*Galbella*), 69
amethystinus (*Sponsor*), 58
amorosa (*Polybothris*), 91
amorpha (*Polybothris*), 92
ampliata (*Madaphlocteis*), 33, 187
ampliata (*Polybothris*), 92
amplicollis (*Entomogaster*), 172
amplicollis (*Acmaeodera*), 44, 45
analabensis (*Anthaxia*), 156
analis (*Polybothris*), 92, 93
ancora (*Polybothris*), 120
androyensis (*Anthaxia*), 156
androyensis (*Sponsor*), 48
angazidziana (*Lampetis*), 74
angulicollis (*Polybothris*), 93
angulosa (*Polybothris*), 93
angusta (*Polybothris*), 93
angustifrons (*Aphanisticus*), 200
anniae (*Polybothris*), 93
antamponensis (*Sponsor*), 48
antamponensis (*Mandritsaria*), 182
antamponensis (*Anthaxia*), 156
antanala (*Sponsor*), 48
antelmei (*Sponsor*), 48
anthracicolor (*Polybothris*), 123
anthracinus (*Sponsor*), 48
antiqua (*Galbella*), 67
antsihanaka (*Sponsor*), 48
anulifer (*Polybothris*), 93
antiopa (*Polybothris*), 93
antiqua (*Polybothris*), 94
apicalis (*Acmaeodera*), 43
apicatum (*Habroloma*), 214
apollo (*Entomogaster*), 172
areolatus (*Agrilus*), 192
arete (*Polybothris*), 135
arge (*Polybothris*), 91
arion (*Polybothris*), 108
artemis (*Polybothris*), 94
ater (*Aphanisticus*), 200
ater (*Sponsor*), 48
atomosparsa (*Acmaeodera*), 43, 44
auberti (*Habroloma*), 214, 215
auberti (*Polybothris*), 94
aureopilosa (*Polybothris*), 94, 102, 121, 122
auribasis (*Sponsor*), 48
auriculatus (*Aphanisticus*), 201
auritarsis (*Apateum*), 87
auriventris (*Polybothris*), 95, **220**
aureopilosa (*Polybothris*), 94, 102, 121, 122
auroclavata (*Polybothris*), 96
aurocyanea (*Polybothris*), 96
auromaculata (*Polybothris*), 93
auropicta (*Polybothris*), 96, 97, 127, 138, **220**
azurea (*Polybothris*), 97

balachowskyi (*Chloricala*), 177
barberoi (*Agrilus*), 192
bekilyensis (*Anthaxia*), 157
belalonensis (*Anthaxia*), 157
bernieri (*Polybothris*), 97
betsimisaraka (*Sponsor*), 49
** bicolor* (*Gracilocala*), 15, 16, 27, 28, 178, 217
** bicolor* (*Madassetia*), 15, 16, 23, 24, 25, 155, 217
bicolor (*Sponsor*), 49
bicornutus (*Aphanisticus*), 205
bilis (*Chalcophoropsis*), 72
bilobata (*Polybothris*), 98
bipustulata (*Polybothris*), 98
bipustulatus (*Meliboeus*), 189
bison (*Aphanisticus*), 201
bistrigata (*Polybothris*), 144
blairi (*Polybothris*), 98
blanchardi (*Polybothris*), 98
blucheau (*Polybothris*), 98
boopis (*Nisibia*), 37, 38
borbonicus (*Sponsor*), 51
boreki (*Polybothris*), 131
bothripyga (*Polybothris*), 99
bourgini (*Actenodes*), 163
bourgoini (*Polybothris*), 99
bouvieri (*Aphanisticus*), 201
bouvieri (*Polybothris*), 99
brachysoma (*Sambirania*), 180
bremei (*Lampetis*), 74
brevicollis (*Agrilus*), 192
brevior (*Trachys*), 210
brunneitarsis (*Polybothris*), 135
byrrhoides (*Galbella*), 67
caerulescens (*Sponsor*), 49
caeruleifinis (*Polybothris*), 138
calceata (*Apateum*), 82
calligastra (*Polybothris*), 115
calo (*Sponsor*), 49
calypso (*Polybothris*), 99
cambouei (*Trachys*), 210
canaliculata (*Belionota*), 166, 167
capnodiformis (*Polybothris*), 123
capricornis (*Aphanisticus*), 201
carbonarius (*Aphanisticus*), 201
carbonarius (*Sponsor*), 49
carcharias (*Polybothris*), 141
cariei (*Sponsor*), 49
carinifrons (*Polybothris*), 99
carli (*Entomogaster*), 173
carreti (*Polybothris*), 100
cassandra (*Polybothris*), 100
cassidea (*Polybothris*), 106
cassidioides (*Polybothris*), 100
catalai (*Mandritsaria*), 182
caudalis (*Polybothris*), 91
caudatula (*Polybothris*), 101
cervicornis (*Aphanisticus*), 201
chalceus (*Sponsor*), 49
chalcochrysea (*Polybothris*), 101, 102
chalybaeus (*Sponsor*), 50
chalybeata (*Lampetis*), 76
chalybeopicta (*Polybothris*), 102
chalybeoventralis (*Polybothris*), 102
chameleon (*Agrilus*), 193
championi (*Belionota*), 166

- chaotica* (*Polybothris*), 92
chloroderus (*Actenodes*), 163
chrysonotata (*Galbella*), 69
chrysozona (*Polybothris*), 100
circularis (*Polybothris*), 103, 127
circulum (*Polybothris*), 104
circumdata (*Polybothris*), 104
circumdatus (*Actenodes*), 164
cleo (*Polybothris*), 103
cobosi (*Sponsor*), 50
cobosi (*Parapolycesta*), 64
coccinella (*Polybothris*), 104, 105, 109
coelestis (*Polybothris*), 105
coeruleipes (*Polybothris*), 105, 138
coeruleiventris (*Polybothris*), 105
coindardi (*Polybothris*), 105
collaris (*Agrilus*), 196
colliciata (*Polybothris*), 88, 105, 106, 111
comorica (*Lampetis*), 74
compacta (*Polybothris*), 125
compactilis (*Aphanisticus*), 201
compactus (*Trachys*), 210
complanata (*Peyrierasina*), 184
complanata (*Polybothris*), 106, 107, 113, 114
confinis (*Polybothris*), 123
convexa (*Apateum*), 80, 85
convexum (*Apateum*), 80
convexus (*Sponsor*), 46, 50
coquerelii (*Lampetis*), 75
corculum (*Trachys*), 210
cordiformis (*Polybothris*), 107
corinna (*Polybothris*), 107
corinthia (*Paradora*), 170
corinnus (*Trachys*), 210
coronatus (*Aphanisticus*), 202
costipennis (*Eumorphocerus*), 175
cottae (*Icaria*), 153
crassa (*Brachydora*), 168
crassa (*Polybothris*), 107, 108
crassiuscula (*Apateum*), 81, 82
crassulus (*Aphanisticus*), 202
crassulus (*Sponsor*), 55
crassulus (*Trachys*), 210, 211
crassus (*Agrilus*), 193
creon (*Trachys*), 211
cribraria (*Polybothris*), 108
cribripennis (*Polybothris*), 108
cribristernum (*Apateum*), 80
cribrosus (*Trachys*), 213
cristatus (*Aphanisticus*), 202
croesus (*Polybothris*), 147
cuneatus (*Trachys*), 211
cuprea (*Polybothris*), 117
cupreomicans (*Aphanisticus*), 202
cupreonitens (*Polybothris*), 108
cupreonotata (*Polybothris*), 144
cupreosignata (*Polybothris*), 143
cupreovaria (*Polybothris*), 108
cupreoviolaceus (*Sponsor*), 50
cupreoviridis (*Sponsor*), 50
cuprifera (*Polybothris*), 108, 109
cupripennis (*Sponsor*), 51
cupriventris (*Anthaxia*), 157, 158
curtula (*Lampetis*), 75
curvicollis (*Evimantius*), 176
curvipes (*Actenodes*), 164

cyanella (*Polybothris*), 110
cyaneopyga (*Polybothris*), 146
cyaneoviridis (*Polybothris*), 109
cyaneus (*Sponsor*), 51
cyanicollis (*Chrysobothris*), 160, 162
cyanicollis (*Ankareus*), 41
cyanimaculifer (*Lampetis*), 75
cyanipennis (*Sponsor*), 51
cyanipennis (*Meliboeus*), 189
cyclops (*Lampetis*), 75
cyclopyga (*Polybothris*), 110
cylindrica (*Polybothris*), 147
darwini (*Polybothris*), 110
dauidi (*Apateum*), 80
decaryi (*Aphanisticus*), 202
decolor (*Polybothris*), 131
decoloratulus (*Agrilus*), 193
decoloratus (*Agrilus*), 193
decorsei (*Agrilus*), 193
decorsei (*Anthaxia*), 157
decorsei (*Chrysobothris*), 161
decorsei (*Lampetis*), 76
decorsei (*Trachys*), 211
deditus (*Trachys*), 211
deformis (*Brachydora*), 168
dejecta (*Polybothris*), 106, 140
deliae (*Trachys*), 211
delmastroi (*Agrilus*), 193
delphinus (*Agrilus*), 193
denticulatus (*Aphanisticus*), 202
deplanatus (*Sponsor*), 51
dermestoides (*Sponsor*), 51
descarpentriesi (*Entomogaster*), 173
desjardinsii (*Sponsor*), 51, 52
deyrollei (*Polybothris*), 110
diecki (*Polybothris*), 110
diegana (*Polybothris*), 112
differens (*Apateum*), 80, 81
diffinis (*Polybothris*), 111
dilatata (*Polybothris*), 89, 111
dirus (*Trachys*), 211
dissimilis (*Apateum*), 81
distinctus (*Sponsor*), 52
diversicollis (*Polybothris*), 111
diversulus (*Aphanisticus*), 202
dodone (*Polybothris*), 111
donckieri (*Apateum*), 81
dorsata (*Chrysobothris*), 161
douquetteae (*Anthaxia*), 157
douquetteae (*Sambus*), 190
dubia (*Sambirania*), 181
dubitata (*Apateum*), 82
dujardini (*Polybothris*), 112
echidna (*Polybothris*), 119
effractella (*Polybothris*), 116
elegans (*Aphanisticus*), 202
elegans (*Polybothris*), 113
elegans (*Sponsor*), 52
elliptica (*Acmaeodera*), 44
elliptica (*Polybothris*), 112
elongata (*Icaria*), 153
elongatus (*Sponsor*), 52
elphus (*Aphanisticus*), 203
emarginata (*Polybothris*), 101
emarginaticollis (*Polybothris*), 97
embriki (*Evimantius*), 177

- emmae* (Sponsor), 52
emmae (Anthaxia), 157
emmeresi (Sponsor), 52
episcopalis (Sponsor), 59
episcopalis (Apateum), 85
episcopalis (Anthaxia), 157, 158
epicureus (Sponsor), 53
epigaptrum (Apateum), 81
epistomalis (Sponsor), 53
eros (Polybothris), 112
erosa (Icaria), 153
errata (Polybothris), 112
eubrachea (Polybothris), 112
euchroa (Polybothris), 101
euterpe (Polybothris), 103
exophthalma (Lampetis), 76, 77
expansicollis (Polybothris), 112, 113, **221**
exsculptus (Trachys), 211
externa (Acmaeodera), 44
extrema (Apateum), 85
fairmairella (Anthaxia), 157
fairmairei (Acmaeodera), 44
fairmairei (Madecassia), 71
fairmairei (Polybothris), 113
fairmairei (Trachys), 211
fallaciosa (Polybothris), 130
fallaciosulus (Agrilus), 193
fallax (Agrilus), 193, 194
fallax (Polybothris), 128
falligani (Polybothris), 141
farinosus (Agrilus), 194
fasciatum (Habroloma), 214
faucherei (Polybothris), 113
fauveli (Agrilus), 194
fischeri (Trachys), 212
fisheri (Polybothris), 125
flacourti (Agrilus), 194
flavocincta (Lampetis), 77
flesa (Polybothris), 113, 114
foveicollis (Chrysobothris), 161
francoiseae (Polybothris), 114
frater (Actenodes), 164
frontalis (Agrilus), 198, 199
frontalis (Polybothris), 98
fryeri (Aldabrica), 65
fulgens Fairmaire, 1899 (Sponsor), 53
fulgidiventris (Polybothris), 114
funebis (Entomogaster), 173
fuscus (Sponsor), 59
fusiformis (Sponsor), 53
gagates (Sponsor), 53
galathaea (Polybothris), 115
garnotii (Polybothris), 109
gaudroni (Madecacesta), 66, 67
gaylae (Habroloma), 215
gebhardti (Paracastalia), 36, 64
geminata (Polybothris), 114
gemma (Polybothris), 148
gemmatus (Sponsor), 53
genesti (Aphanisticus), 203
geniculata (Polybothris), 135
gloriosa (Polybothris), 148
glyphoderes (Polybothris), 106
gnomiphila (Sororcula) (Polybothris), 152
gomyi (Ankareus), 41
goryi (Polybothris), 114, 115, 116, **220**

goryi (*Pseudopolycesta*), 65
goudotii (*Aphanisticus*), 203
goudotii (*Polybothris*), 94
goudotii (*Malagascoderes*), 15, 16, 31, 32, 186
gracilis (*Neefia*), 185
grandiceps (*Trachys*), 212
grandidieri (*Aphanisticus*), 203
grandidieri (*Polybothris*), 116
grandidieri (*Trachys*), 212
grandis (*Sponsor*), 53
grandis (*Entomogaster*), 173
granulicollis (*Sponsor*), 53
granulosissima (*Apateum*), 86
granulum (*Brachydora*), 168
gratiosa (*Chloricala*), 177, 178
gratiosa (*Polybothris*), 116
griveaudi (*Actenodes*), 164
grossei (*Aphanisticus*), 203
gueyraudi (*Polybothris*), 116
guttata (*Chrysobothris*), 161, 162
guttulata (*Polybothris*), 119
gyleki (*Agrilus*), 194
gyrinoides (*Sponsor*), 54
haematurga (*Polybothris*), 151
haesitans (*Agrilus*), 194
heliobia (*Polybothris*), 116
heraclea (*Polybothris*), 130
herbigradus (*Aphanisticus*), 203
heydeni (*Polybothris*), 116
hildebrandti (*Polybothris*), 103
himera (*Polybothris*), 137
hoschecki (*Entomogaster*), 173
hova (*Anadora*), 37
hova (*Anthaxia*), 158
hova (*Aphanisticus*), 203
hova (*Paracylindromorphus*), 209
hova (*Phlocteis*), 179
hova (*Polybothris*), 117
hovana (*Galbella*), 68
hovanus (*Meliboeus*), 15, 16, 37, 189
hovasianum (*Habroloma*), 215
hovum (*Habroloma*), 215
howa (*Sphenoptera*), 154
howa (*Acmaeodera*), 44
howanus (*Agrilus*), 194
howanus (*Heromorphus*), 208
howas (*Chrysobothris*), 162
howas (*Galbella*), 68
howas (*Polycestaxia*), 66
humblotiana (*Polybothris*), 102
humblotii (*Polybothris*), 117
humeralis (*Neefia*), 185
humeralis (*Apateum*), 86
humeralis (*Phlocteis*), 180
hydropica (*Anthaxia*), 158
hypocyana (*Polybothris*), 117
hypsitropa (*Polybothris*), 102
ianthinipennis (*Jaroslavia*), 178
idae (*Polybothris*), 107
ignicollis (*Polybothris*), 113
ignipennis (*Sponsor*), 54
imbella (*Apateum*), 87
immotus (*Trachys*), 212
impedita (*Sambirania*), 181
imperatrix (*Coraeobastus*), 176
imperatrix (*Trachys*), 212

impetigosus (*Paradora*), 171
impressipennis (*Aphanisticus*), 203
impressipennis (*Polybothris*), 117
impunctata (*Chloricala*), 178
inaequalis (*Mandritsaria*), 182
incerta (*Sambirania*), 181
incerticolor (*Polybothris*), 118
inclyta (*Polybothris*), 118
incongruum (*Apateum*), 81
inconstans (*Agrilus*), 195
incurvatus (*Discoderopsis*), 180
indigna (*Polybothris*), 118
indistincta (*Polybothris*), 118
indurata (*Polybothris*), 118
inedita (*Polybothris*), 118
inflata (*Sambirania*), 181, **222**
infrapendens (*Polybothris*), **119**
ino (*Polybothris*), 108
inornata (*Polybothris*), 119
inornatulus (*Agrilus*), 195
inornatus (*Agrilus*), 195
inornatus (*Aphanisticus*), 204
insignis (*Coraebus*), 188
insignis (*Polybothris*), 119
insipidus (*Meliboeus*), 189
insularis (*Sphenoptera*), 154
insularis (*Galbella*), 69
integer (*Aphanisticus*), 204
integricollis (*Aphanisticus*), 204
interundata (*Polybothris*), 97
irideus (*Sponsor*), 54
iridipennis (*Madaphlocteis*), 33, 187
iris (*Entomogaster*), 173
iris (*Polybothris*), 148
jacquemonti (*Chalcophoropsis*), 72
jansonii (*Polybothris*), 120
janthinus (*Sponsor*), 54
johnstoni (*Amblysterna*), 40
juno (Théry, 1905) (*Polybothris*), 97
keiseri (*Anthaxia*), 158
kerremansi (*Entomogaster*), 173
kerremansi (*Polybothris*), 122
kerremansi (*Sponsor*), 54
kervillei (*Trachys*), 213
klugii (*Polybothris*), 120
krusemanni (*Aphanisticus*), 204
kyselyi (*Polybothris*), 107
lachesis (*Polybothris*), 120
laesicollis (*Castaliella*), 66
laeta (*Polybothris*), 120
laeviventris (*Polybothris*), 121
lafertei (*Polybothris*), 121
lalandei (*Polybothris*), 132
lamellicornis (*Aphanisticus*), 204
lamina (*Polybothris*), 114, 121
laportedeana (*Polybothris*), 121
lata (*Galbella*), 67, 68
lateralis (*Polybothris*), 122
lateripicta (*Apateum*), 86
laticollis (*Polybothris*), 122
laticornis (*Eumorphocerus*), 175
latissima (*Polybothris*), 122
legwai (*Agrilus*), 195
lelieurii (*Polybothris*), 89, 122, 123
lemoulti (*Actenodes*), 164
lemur (*Lampetis*), 78

lepetitii (Polybothris), 123
lepidus (Sponsor), 54
lesnei (Polybothris), 123
liliputana (Acmaeodera), 46
limbata (Galbella), 68
linearis (Polybothris), 123
livens (Sponsor), 55
longicollis (Polybothris), 128
lottei (Polybothris), 101
luczotii (Apateum), 79, 82
lumbaris (Gigantocoraebus), 170
lunifrons (Aphanisticus), 204
luteomaculata (Apateum), 85
luteopicta (Polybothris), 124
luteosignata (Polybothris), 95
maculiventris (Polybothris), 124
madagascariensis (Sphenoptera), 154
madagascariensis (Aphanisticus), 201, 204
madagascariensis (Belionota), 167
madagascariensis (Sambus), 190
madecassus (Agrilus), 195
madegassa (Acmaeodera), 44
madegassicus (Agrilus), 195
madegassus (Agrilus), 195
madegassus (Pseudagrilus), 191
madegassus (Sjoestedtius), 199
madoni (Polybothris), 124
magna (Neefia), 185, 223
magna (Angatra), 183
magnificus (Trachys), 212
mahena (Iridotaenia), 70
malartici (Sponsor), 55
maleficus (Aphanisticus), 204
mameti (Ankareus), 41
mameti (Sponsor), 55
mandraranus (Sponsor), 55
marginalis (Polybothris), 124
mariae (Polybothris), 124
marmorata (Polybothris), 124
marmorea (Habroloma), 216
mascarenicus (Aphanisticus), 205
mascarenicus (Ankareus), 41
mathiauxi (Aphanisticus), 205
mathiauxi (Habroloma), 215
mayeti (Agrilus), 196
mayottensis (Lampetis), 77
medianus (Trachys), 212
melanopus (Sponsor), 55
melitta (Polybothris), 125
mendax (Aphanisticus), 205
metallinus (Sponsor), 55
metriostola (Polybothris), 151
micrastoides (Ankareus), 42
micros (Trachys), 212, 213
midongyana (Apateum), 84
miliaris (Meliboeus), 15, 16, 37, 189
milloti (Actenodes), 164
minutissima (Acmaeodera), 46
mirabilis (Sponsor), 56
mirabilis (Midongya), 183
mirandulus (Aphanisticus), 205
miribella (Polybothris), 125
miribellus (Actenodes), 164
mitratus (Aphanisticus), 205
mocquerysi (Agrilus), 196
mocquerysi (Entomogaster), 174

- mocquerysi* (*Habroloma*), 215
mocquerysi (*Polybothris*), 125
mocquerysi (*Pseudocoraebus*), 177
modestus (*Entomogaster*), 174
moesta (*Polybothris*), 125
moestus (*Agrilus*), 198
molesta (*Polybothris*), 125, 126
monochroma (*Chalcophoropsis*), 71
monstrum (*Brachydora*), 168
montana (*Neefia*), 185
montanus (*Sponsor*), 56
monticola (*Sponsor*), 56
montivagus (*Sponsor*), 56
moralesi (*Polybothris*), 126
morosa (*Polybothris*), 148
mucorea (*Madaphlocteis*), 33, 187
mucronata (*Polybothris*), 109, 126
muhlbergi (*Polybothris*), 126
multiguttata (*Polybothris*), 126, 127
myops (*Polybothris*), 116
myrmido (*Polybothris*), 127
mystica (*Polybothris*), 127
nanissimus (*Aphanisticus*), 205
navicularis (*Polybothris*), 127, **128**, 137, 138
neocollaris (*Agrilus*), 196
neocuris (*Anthaxia*), 158
nickerli (*Polybothris*), 128
nigellata (*Apateum*), 81
niger (*Sponsor*), 56
nigra (*Polybothris*), 114, 129
** nigrocaerulea* (*Compsoglypta*), 15, 16, 26, 169, **217**
nigricans (*Antanambia*), 183
nigricollis (*Sponsor*), 56
nigrina (*Polybothris*), 107
nigrior (*Polybothris*), 114
nigroaeneus (*Sponsor*), 56
nigrocyanus (*Sponsor*), 56
nigrovirens (*Discoderopsis*), 180
niobae (*Trachys*), 213
nitidiventr (*Anthaxia*), 158
nitidiventr (*Polybothris*), 129
nitidulipennis (*Aphanisticus*), 206
nivicincta (*Polybothris*), 129
nivifera (*Polybothris*), 129
niviferus (*Agrilus*), 196
nocivus (*Aphanisticus*), 206
nodosa (*Seranambia*), 179
nossibiana (*Polybothris*), 129
nossibanus (*Agrilus*), 196
notocel (*Apateum*), 86
nyctelius (*Trachys*), 210
oberthurii (*Polybothris*), 130
obesa (*Polybothris*), 130
oblongus (*Sponsor*), 57
obscura (*Polybothris*), 88, 130
obscurella (*Polybothris*), 109
obsoleta (*Polybothris*), 130, 131
obsoletulus (*Agrilus*), 196
obsoletum (*Habroloma*), 215
obsoletus (*Agrilus*), 196
obtusa (*Polybothris*), 131, 132
obtusicornis (*Aphanisticus*), 206
ochraceopicta (*Madaphlocteis*), 33, 187
ochreata (*Polybothris*), 132
octoguttatus (*Entomogaster*), 174

octosignatus (*Agrilus*), 197
octosticta (*Chloricala*), 178
oculicollis (*Polybothris*), 113
ocyalus (*Agrilus*), 197
ogloblini (*Polybothris*), 132
olsoufieviella (*Apateum*), 79
olsufiewi (*Evimantius*), 177
opaca (*Ankareus*), 42
ophthalmica (*Madecassia*), 71
opistograptis (*Apateum*), 83
opogona (*Polybothris*), 115
orbicularis (*Polybothris*), 88, 132, 133
ornaticollis (*Actenodes*), 165
ornix (*Polybothris*), 137
ovalis (*Polybothris*), 133
ovalis (*Sponsor*), 52
ovularis (*Polybothris*), 133
owas (*Agrilus*), 197
pamene (*Apateum*), 81
pandora (*Polybothris*), 133
pandus (*Polybothris*), 103
parallela (*Polybothris*), 133
paralispa (*Polybothris*), 115
parilis (*Sponsor*), 57
parmulata (*Polybothris*), 133, 134
parva (*Angatra*), 183, **222**
parvulus (*Sponsor*), 57
pater (*Lampetis*), 77
patruelis (*Lampetis*), 77, 78
pauliani (*Actenodes*), 165
pauliani (*Anthaxia*), 158
penelope (*Polybothris*), 134
peraffinis (*Lampetis*), 78

perinetensis (*Aphanisticus*), 206
peringueyi (*Castaliella*), 66
perrieri (*Acmaeodera*), 44
perrieri (*Agrilus*), 197
perrieri (*Anthaxia*), 159
perrieri (*Compsoglypta*), 26, 27, 169
perrieri (*Galbella*), 68
perrieri (*Madaphlocteis*), 15, 16, 32, 33, 187
perrieri (*Polybothris*), 134
perrieri (*Sphenoptera*), 154
perrieri (*Sponsor*), 57
perrieri (*Trachys*), 213
petrequini (*Polybothris*), 134
pexipennis (*Sponsor*), 57
peyrierasi (*Actenodes*), 165
peyrierasi (*Anthaxia*), 159, **221**
peyrierasi (*Eumorphocerus*), 175
peyrierasi (*Mandritsaria*), 182
peyrierasi (*Polybothris*), 134
peyrierasi (*Sambus*), 190
peyrierasi (*Sponsor*), 57
peyrierasi (*Vadonaxia*), 69, 70, **218**
pfeifferae (*Polybothris*), 134
picticollis (*Chrysobothris*), 161
pigrum (*Habroloma*), 216
pilosellus (*Sponsor*), 58
pinguicula (*Acmaeodera*), 45
pinguis (*Sponsor*), 50, 58
pisciformis (*Polybothris*), 134, 135
plagiata (*Polybothris*), 91
plagicollis (*Sambirania*), 181
plantivorus (*Aphanisticus*), 206
planula (*Polybothris*), 135

- platessa* (*Polybothris*), 100, 135
plicifrons (*Apateum*), 83
plicipennis (*Agrilus*), 198
polychroa (*Madaphlocteis*), 33, 188
postfasciata (*Acmaeodera*), 45
posticalis (*Entomogaster*), 174
posticalis (*Trachys*), 213
prasina (*Belionota*), 167
pretiosa (*Galbella*), 68
primaria (*Chalcophoropsis*), 72
propinqua (*Polybothris*), 136
protasis (*Apateum*), 83
pruinosa (*Acmaeodera*), 45
pseudelongatus (*Sponsor*), 58
pseudepistomalis (*Sponsor*), 58
pseudopunctipennis (*Polybothris*), 126
psyche (*Polybothris*), 135
pubescens (*Sponsor*), 58
pulcher (*Sponsor*), 58
pulchriventris (*Polybothris*), 107
pulverulenta (*Polybothris*), 135, 136
pulvifera (*Polybothris*), 136
pumicatus (*Paradora*), 170, 171
pumilio (*Entomogaster*), 175
punctata (*Belionota*), 166, 167
puncticollis (*Polybothris*), 136
punctipennis (*Polybothris*), 126, 136
punctiventris (*Polybothris*), 136, 137
pupa (*Sponsor*), 59
purpurea (*Habroloma*), 216
purpurea (*Lampetis*), 75
purpurea (*Paraphrixia*), 155
purpureipennis (*Sponsor*), 59
purpureiventre (*Apateum*), 83
purpureosignata (*Madaphlocteis*), 34, 188
purpurifera (*Polybothris*), 135
pustulosum (*Habroloma*), 216
putus (*Aphanisticus*), 206
pygidialis (*Polybothris*), 137
pygmaeus (*Sponsor*), 59
pyrogastra (*Polybothris*), 137
pyropyga (*Polybothris*), 88, 137, **221**
pyropygus (*Actenodes*), 165
quadraticollis (*Agrilus*), 197
quadricollis (*Polybothris*), 128, 137, 138, **221**
quadrifoveolata (*Chalcophoropsis*), 13, **72**, 106, **219**
quadrinotata (*Habroloma*), 216
quadrinotata (*Madaphlocteis*), 34
quadruplicatum (*Apateum*), 83
quadrupunctata (*Polybothris*), 138
quadrispilota (*Polybothris*), 127, 133, 138, 139
quinquepustulatus (*Coraebastus*), 176
raharizoninai (*Anthaxia*), 159
ranavalona (*Polybothris*), 139
ranavalonae (*Agrilus*), 192
rebelia (*Apateum*), 83
regalis (*Polybothris*), 139
renardi (*Polybothris*), 139
republicana (*Polybothris*), 139
reunionensis (*Sponsor*), 59
rhombus (*Polybothris*), 140
richardi (*Falliellus*), 184, **223**
ridens (*Polybothris*), 110
rodrigianus (*Sponsor*), 59

rollei (*Aphanisticus*), 206
roseus (*Agrilus*), 197
rothschildi (*Madecassia*), 70, 71, **219**
rotundata (*Polybothris*), 103, 139, 140
rotundipennis (*Sambirania*), 181
rubripes (*Polybothris*), 140
rubinifera (*Polybothris*), 148
rubromarginata (*Acmaeodera*), 44
** ruficapiticauda* (*Ivalouwayneia*), 15, 16, 29, 30, 179, **218**
ruficauda (*Polybothris*), 140
ruficornis (*Ankareus*), 42
rufipes (*Sponsor*), 60
rufitarsis (*Sponsor*), 60
rufitarsis (*Ankareus*), 42
rufobasalis (*Neefioides*), 186, **223**
rufofascia (*Neefia*), 185
rufopictus (*Evimantius*), 176, 177
rufovestita (*Neefia*), 186
rugosa (*Polybothris*), 127
rustica (*Polybothris*), 140
rutiliplaga (*Polybothris*), 148
rotundicollis (*Aphanisticus*), 206
rotundipennis (*Polybothris*), 105
rutilans (*Sponsor*), 60
sagax (*Aphanisticus*), 207
salebria (*Apateum*), 81
salvazai (*Polybothris*), 141
sanguineotincta (*Polybothris*), 141
sanguineus (*Agrilus*), 198
satanas (*Sponsor*), 60
saxosicollis (*Paradora*), 171
scabra (*Anthaxia*), 159
scapularis (*Polybothris*), 141, 142
scenica (*Polybothris*), **142**
schoenherrii (*Polybothris*), 96
scintillans (*Apateum*), 85
scintillans (*Pseudagrilus*), 191
scriptus (*Malagascoderes*), 32, 186, **218**
sculpticollis (*Compsoglypta*), 169
sellatus (*Trachys*), 213
semifossus (*Agrilus*), 198
semipolitum (*Apateum*), 83
semistrigosus (*Sponsor*), 60
semivestita (*Neefia*), 185, 186, **223**
senescens (*Sponsor*), 60
senilis Descarpentries, 1966 (*Sponsor*), 60
serenae (*Agrilus*), 198
sericeus (*Sponsor*), 61
setosulus (*Sponsor*), 61
sexfoveolata (*Polybothris*), 95
sexmaculata (*Polybothris*), 142
sexpunctatus (*Entomogaster*), 172, 175
sexsulcatum (*Apateum*), 84, **219**
seyrigi (*Acmaeodera*), 45
seyrigi (*Anthaxia*), 159
seyrigi (*Paradora*), 170
seyrigi (*Sambus*), 190
seyrigi (*Sponsor*), 61
sicardi (*Agrilus*), 198
sicardi (*Anthaxia*), 159
sicardi (*Aphanisticus*), 207
sicardi (*Brachydora*), 169
sicardi (*Mandritsaria*), 182
sicardi (*Trachys*), 213
sikorai (*Polybothris*), 109
silphoides (*Polybothris*), 142

- similis* (*Aphanisticus*), 207
similis (*Sponsor*), 61
similis (*Apateum*), 84
simplex (*Aphanisticus*), 207
simplicifrons (*Madaphlocteis*), 34, 188
simulatrix (*Polybothris*), 104
sirgueyi (*Micropolycesta*), 65, 66
sobrina (*Polybothris*), 143
sodalis (*Polybothris*), 143
solea (*Polybothris*), 143, 144
solitarius (*Trachys*), 214
sommeri (*Lampetis*), 74
sordidum (*Apateum*), 84
soror (*Lampetis*), 77
sparsuta (*Acmaeodera*), 44, 45
sparsuta (*Polybothris*), 95, 144, 145
specialis (*Polybothris*), 145
spesivcevi (*Polybothris*), 145
spectralis (*Polybothris*), 142
spectrum (*Trachys*), 214
speculifera (*Polybothris*), 110
spinolae (*Polybothris*), 128
spinosa (*Sponsor*), 50
splendens (*Sponsor*), 61
splendidiventris (*Polybothris*), 145
spurcus (*Agrilus*), 198
squalus (*Polybothris*), 145
staudingeri (*Polybothris*), 145
staudingeriana, 79
stellata (*Polybothris*), 132
sternalis (*Lampetis*), 77, 78
stramineus (*Aphanisticus*), 207
strandii (*Evimantius*), 177
strandii (*Pseudocoraebus*), 177
strandii (*Paranastella*), 34, 35, 36, 171, 218
strigithorax (*Polybothris*), 146
striolata (*Polybothris*), 140
stygia (*Polybothris*), 146
suarezina (*Polybothris*), 146
suavis (*Actenodes*), 165
subelongata (*Polybothris*), 146
subpropinqua (*Polybothris*), 146
subsilphoides (*Polybothris*), 147
succinicola (*Seranambia*), 179
subcyaneus (*Ankareus*), 42
subfrontalis (*Agrilus*), 198, 199
subnubilis (*Agrilus*), 199
subobtusata (*Polybothris*), 131
subparallelus (*Sponsor*), 61
succinicola (*Anthaxia*), 159
succinicola (*Sponsor*), 62
sulcicollis (*Polybothris*), 147
sulculiceps (*Aphanisticus*), 207
sumptuosa (*Polybothris*), 87, 111, 131, 147, 148, 149, 222
superba (*Maroantsetra*), 184
superba (*Polybothris*), 148
surcoufi (*Polybothris*), 149
suspecta (*Polybothris*), 115
suspecta (*Sambirania*), 181
sycophanta (*Lampetis*), 78
tacens (*Polybothris*), 149
tanananarivensis (*Aphanisticus*), 207
tanananarivensis (*Paracylindromorphus*), 209
tanananarivensis (*Polybothris*), 149

tanovanensis (*Aphanisticus*), 207
tantilla (*Acmaeodera*), 43, 45, 46
taurus (*Aphanisticus*), 208
tchitcherini (*Polybothris*), 111
tenebrosus (*Ankareus*), 42
tenuolus (*Aphanisticus*), 208
terminalis (*Polybothris*), 149
testaceipes (*Mastogenius*), 40
testudinea (*Polybothris*), 144, 145
tetraleuca (*Polybothris*), 149
tetrops (*Polybothris*), 122
teuxia (*Polybothris*), 99
theryi (*Polybothris*), 149
theryi (*Sponsor*), 62
thyris (*Polybothris*), 149
tigrina (*Pseudopolycesta*), 65
tondui (*Aphanisticus*), 208
trachydea (*Galbella*), 69
transversa (*Polybothris*), 150
tristis (*Sponsor*), 62
tristis (*Agrilus*), 195
tristis (*Ankareus*), 41, 43
tropica (*Lampetis*), 76
truncatella (*Polybothris*), 150
truncatipennis (*Polybothris*), 150
tuberculicollis (*Agrilus*), 199
tulearica (*Acmaeodera*), 46
uniformis (*Actenodes*), 165
** unicolor* (*Madassetia*), 15, 16, 25, 156, **217**
uvarovi (*Polybothris*), 141
vacheri (*Polybothris*), 150
vadoni (*Actenodes*), 163
vadoni (*Anthaxia*), 160
vadoni (*Eumorphocerus*), 175
vadoni (*Mandritsaria*), 183
vadoni (*Sambus*), 190, **223**
vadoni (*Sponsor*), 62
vadonianus (*Sponsor*), 62
vagecostatus (*Meliboeus*), 190
valreasi (*Lampetis*), 78
vayssieresi (*Agrilus*), 199
velutinum (*Habroloma*), 216
ventricosa (*Anthaxia*), 160
vermiculata (*Polybothris*), 150
vespertilio (*Polybothris*), 115
vetustus (*Sponsor*), 62
videns (*Polybothris*), 87, 150, 151
viduus (*Sponsor*), 62
viettei (*Actenodes*), 165
viettei (*Sponsor*), 62
vieui (*Sponsor*), 63
villettei (*Polybothris*), 151
villiersi (*Paranastella*), 34, 35, 172, **218**
villosus (*Sponsor*), 63
vinsoni (*Ankareus*), 43
vinsoni (*Sponsor*), 63
violaceipennis (*Sponsor*), 63
violaceiventris (*Polybothris*), 151
violaceus (*Sponsor*), 63
viossati (*Actenodes*), 165
viridiauratus (*Sponsor*), 63
viridiaenus (*Sponsor*), 63
viridichalybea (*Polybothris*), 151
viridicoerulans (*Sponsor*), 64
viridicollis (*Polybothris*), 111, 131
viridicollis (*Sponsor*), 60

viridicornis (*Lampetis*), 78

• *viridis* (*Paranastella*), 15, 16, 34, 35, 172, **218**

viriditarsis (*Apateum*), 84, 85

viridiventris (*Polybothris*), 142

vividum (*Habroloma*), 216

vohemarensis (*Agrilus*), 192

vondrozensis (*Seranambia*), 179

waterhousei (*Apateum*), 85

waterloti (*Aphanisticus*), 208

waterloti (*Paracylindromorphus*), 209

wautersi (*Polybothris*), 151

xanthostictum (*Apateum*), 85

zivettoides (*Apateum*), 87

zivettum (*Apateum*), 86, **87**

zonata (*Paradora*), 171

zoufali (*Polybothris*), 151, 152

zygaena (*Polybothris*), 115

Points de vente / Outlets

Service des publications scientifiques du Muséum national d'Histoire naturelle
adresse postale : 57, rue Cuvier, 75231 Paris Cedex 5, France
adresse physique : Bâtiment de Cryptogamie, 12, rue Buffon, 75005 Paris, France
Tél. : +33 (0)1 40 79 37 00, fax : +33 (0)1 40 79 38 40
diff.pub@mnhn.fr <http://www.mnhn.fr/publication/faunemad/>

Editions du Cirad
Ventes sur place/Bookshop
Librairie du Cirad, avenue Agropolis, 34398 Montpellier Cedex 5
Tél. : +33 (0)4 67 61 44 17

VPC/By mail order
Inra Editions, RD 10, 78026 Versailles Cedex
Tél. : +33 (0)1 30 83 34 06, fax : +33 (0)1 30 83 34 49
Serviceclients-quae@versailles.inra.fr <http://www.quae.com>

Librairie de l'IRD
213, rue La Fayette, 75480 Paris Cedex 10, France
Tél. : +33 (0)1 48 03 75 62, fax : +33 (0)1 48 03 76 12
librairie@paris.ird.fr <http://www.ird.fr>

Déjà parus / Published volumes

1. – Insectes Odonates Anisoptères, par le Dr F.C. Fraser, 1956
2. – Insectes Lépidoptères Danaidae, Nymphalidae, Acraeidae, par R. Paulian, 1956
3. – Insectes Lépidoptères Hesperidae, par P. Viette, 1956
4. – Insectes Coléoptères Cerambycidae Lamiinae, par S. Breuning, 1957
5. – Insectes Mantodea, par R. Paulian, 1957
6. – Insectes Coléoptères Anthicidae, par P. Bonadona, 1957
7. – Insectes Hémiptères Enicocephalidae, par A. Villiers, 1958
8. – Insectes Lépidoptères Sphingidae, par P. Griveaud, 1959
9. – Arachnides Opilions, par le Dr R.-F. Lawrence, 1959
10. – Poissons des eaux douces, par J. Arnoult, 1959
11. – Insectes Coléoptères Scarabaeidae, Scarabaeina et Onthophagini, par R. Paulian ; Helictopleurina, par E. Lebis, 1960
12. – Myriapodes Chilopodes, par le Dr R.-F. Lawrence, 1960
13. – Zoogéographie de Madagascar et des îles voisines, par R. Paulian, 1961
(Prix Foulon de l'Académie des sciences)
14. – Insectes Lépidoptères Eupterotidae et Attacidae, par P. Griveaud, 1961
15. – Insectes Aphaniptères, par R. Lumaret, 1962
16. – Crustacés Décapodes Portunidae, par A. Crosnier, 1962
17. – Insectes Lépidoptères Amatidae, par P. Griveaud, 1964
(Prix Constant de la Société entomologique de France)
18. – Crustacés Décapodes Grapsidae et Ocypodidae, par A. Crosnier, 1965
19. – Insectes Coléoptères Erotylidae, par H. Philipp, 1965
- 20 (1). – Insectes Lépidoptères Noctuidae Amphipyridae (part.), par P. Viette, 1965
- 20 (2). – Insectes Lépidoptères Noctuidae Amphipyridae (part.) et Melicleptriinae, par P. Viette, 1967 (Prix Foulon de l'Académie des sciences)
21. – Octocoralliaires, par A. Tixier-Durivault, 1966
22. – Insectes Diptères Culicidae Anophelinae, par A. Grjebine, 1966
(Prix Passet de la Société entomologique de France)
23. – Insectes Psocoptères, par A. Badonnel, 1967

24. – Insectes Lépidoptères Thyrididae, par P.E.S. Whalley, 1967
25. – Insectes Hétéroptères Lygaeidae Blissinae, par J.A. Slater, 1967
26. – Insectes Orthoptères, Acridoidea (Pyrgomorphidae et Acrididae), par V.M. Dirsh et M. Descamps, 1968
27. – Insectes Lépidoptères Papilionidae, par R. Paulian et P. Viette, 1968
28. – Insectes Hémiptères Reduviidae (1^{ère} partie), par A. Villiers, 1968
29. – Insectes Lépidoptères Notodontidae, par S.G. Kiriakoff, 1969
30. – Insectes Dermaptères, par A. Brindle, 1969
31. – Insectes Lépidoptères Noctuidae Plusiinae, par C. Dufay, 1970
32. – Arachnides Araignées Archaeidae, par R. Legendre, 1970
33. – Reptiles Sauriens Chamaeleonidae, le genre *Chamaeleo*, par E.R. Brygoo, 1971
34. – Insectes Lépidoptères Lasiocampidae, par Y. de Lajonquière, 1972
35. – Oiseaux, par Ph. Milon, J.-J. Petter et G. Randrianasolo, 1973 + fascicule des planches
36. – Mammifères Carnivores, par R. Albignac, 1973
37. – Insectes Coléoptères Carabidae Scaritinae, par P. Basilewsky, 1973
38. – Arachnides Araignées Araneidae Gasteracanthinae, par M. Emerit, 1974
39. – Insectes Lépidoptères Agaristidae, par S.G. Kiriakoff et P. Viette, 1974
40. – Insectes Coléoptères Cerambycidae Parandrinae et Prioninae, par R.M. Quentin et A. Villiers, 1975
41. – Insectes Coléoptères Carabidae Scaritinae : II. Biologie, par A. Peyrieras. - III. Supplément à la systématique, par P. Basilewsky, 1976
42. – Arachnides Acariens Astigmata Listerophoroidea, par A. Fain, 1976
- 43 (1). – Insectes Lépidoptères Lymantriidae (1^{re} partie), par P. Griveaud, 1977
- 43 (2). – Insectes Lépidoptères Lymantriidae (2^e partie), par P. Griveaud, 1977
44. – Mammifères Lémuriens (Primates Prosimiens) par J.-J. Petter, R. Albignac et Y. Rumpler, 1977 (**Prix Foulon de l'Académie des sciences**)
45. – Reptiles Sauriens Iguanidae, par Ch. P. Blanc, 1977
46. – Crustacés Décapodes Aristeidae (Benthescyminae, Aristeinae, Solenicerinae) par A. Crosnier, 1978
47. – Reptiles Sauriens Chamaeleonidae, genre *Brookesia* et complément pour le genre *Chamaeleo*, par E.-R. Brygoo, 1978
48. – Echinodermes Ophiures, par G. Cherbonnier et A. Guille, 1978 (stock détruit par l'éditeur)
49. – Insectes Hémiptères Reduviidae (2^e partie), par A. Villiers, 1979
50. – Insectes Coléoptères Silphidae, Passalidae, Belohinidae et Ceratocanthidae, par R. Paulian et J.-P. Lumaret, 1979
51. – Insectes Coléoptères Staphylinides Oxytelidae Osoriinae, par H. Coiffait, 1979 (stock détruit par l'éditeur)
52. – Insectes Coléoptères Cerambycidae Disteniinae, par A. Villiers, 1980
53. – Insectes Lépidoptères Limacodidae, par P. Viette, 1980
54. – Insectes Coléoptères Colydiidae et Cerylonidae, par R. Dajoz, 1980 (stock détruit par l'éditeur)
55. – Insectes Coléoptères Curculionidae Cycloterini, par R. Richard, 1981 (**Prix M. et Th. Pic de la Société entomologique de France**)
56. – Insectes Coléoptères Trogidae et Hybosoridae, par R. Paulian, 1981
57. – Insectes Coléoptères Cetoniidae Euchroina : I. Systématique, par R. Paulian et A. Descarpentries. II. Biologie et formes larvaires, par J.-P. Lumaret et A. Peyrieras, 1982
58. – Crustacés Copépodes des eaux intérieures, par B.H. Dussart, 1982

- 59 (1). – Crustacés Amphipodes Gammariens (1^{re} partie), par M. Ledoyer, 1982 (stock détruit par l'éditeur)
- 59 (2). – Crustacés Amphipodes Gammariens (2^e partie), par M. Ledoyer, 1986
60. – Insectes Lépidoptères Epipleminae, par J. Boudinot, 1982
61. – Insectes Lépidoptères Sesiidae, par P. Viette, 1982
62. – Insectes Coléoptères Curculionidae Stigmaterini, par R. Richard, 1983
63. – Insectes Lépidoptères Psychidae Oiketicinae, par J. Bourgogne, 1984
64. – Insectes Coléoptères Carabidae Platyninae, par P. Basilewsky, 1985
65. – Insectes Coléoptères Dynastidae, par R.-P. Dechambre, 1986
(Prix Passet de la Société entomologique de France)
66. – Insectes Coléoptères Curculionidae Brachyderini, genre *Dinosius*, par M. Ferragu, 1986
67. – Insectes Coléoptères Staphylinidae Paederinae, I. Pinophilini, par J.-Cl. Lecoq, 1986
68. – Insectes Diptères Culicidae Culicinae Ficalbiini, par A. Grjebine, 1986
69. – Insectes Coléoptères Aulonocnemidae, par Y. Cambefort, 1987
70. – Echinodermes Holothurides par G. Cherbonnier, 1988
71. – Insectes Coléoptères Staphylinidae Euaesthetinae, par J. Orousset, 1988
(Prix M. et Th. Pic de la Société entomologique de France)
72. – Insectes Lépidoptères Crambidae Scopariinae, par P. Leraut, 1989
- 73 (1). – Insectes Coléoptères Melolonthidae (1^{re} partie), par M. Lacroix, 1989
(Prix M. et Th. Pic de la Société entomologique de France)
- 73 (2). – Insectes Coléoptères Melolonthidae (2^e partie), par M. Lacroix, 1993
74. – Insectes Coléoptères Aphodiidae, par P. Bordat, R. Paulian et R. Pittino, 1990
- 75 (1). – Amphibiens (1^{re} partie), par R.M.A. Blommers-Schlösser et Ch. P. Blanc, 1991
- 75 (2). – Amphibiens (2^e partie), par R.M.A. Blommers-Schlösser et Ch. P. Blanc, 1993
76. – Insectes Coléoptères Nosodendridae, par S. Endrödy-Younga, 1991
77. – Insectes Coléoptères Ptinidae, par X. Bellés, 1991
78. – Insectes Hétéroptères Tingidae, par P. Duarte Rodriguez, 1992
79. – Insectes Coléoptères Staphylinidae Paederinae, II. Paederini, par J.-Cl. Lecoq, 1993
80. – Gastéropodes terrestres Prosobranchs, par E. Fischer-Piette *et al.*, 1993
81. – Insectes Lépidoptères Pterophoridae, par C. Gibeaux, 1994
82. – Insectes Coléoptères Cetoniidae, genre *Pygora*, par R. Paulian, 1994
83. – Gastéropodes terrestres Pulmonés, par E. Fischer-Piette *et al.*, 1994
84. – Mammifères Chiroptères, par R.L. Peterson *et al.*, 1995
85. – Insectes Diptères Culicidae Culicinae. Genre *Orthopodomyia* de la sous-région malgache et de la région afrotropicale, par J. Brunhes et J.-P. Hervy, 1995
86. – Insectes Coléoptères Staphylinidae Paederinae, genre *Astenus*, par J.-Cl. Lecoq, 1996
87. – Chelicerata Scorpions, par W.R. Lourenço, 1996
- 88 (1). – Insectes Coléoptères Heliidae (1^{re} partie), par M. Lacroix, 1997
- 88 (2). – Insectes Coléoptères Heliidae (2^e partie), par M. Lacroix, 1998
89. – Insectes Coléoptères Staphylinidae Aleocharinae, par R. Pace, 1999
90. – Insecta Coleoptera Chironidae, par J.-B. Huchet, 2003
91. – Insecta Diptera Culicidae *Uranotaenia*, par H. da Cunha Ramos et J. Brunhes, 2004
(Prix Passet de la Société entomologique de France)
92. – Insecta Coleoptera Buprestidae de Madagascar et des îles voisines : Catalogue annoté / Insecta Coleoptera Buprestidae of Madagascar and adjacent islands. An Annotated Catalogue, par / by C. L. Bellamy, 2006

Suppléments / Supplements

1. - Liste récapitulative des Lépidoptères Hétérocères de Madagascar / A provisional check-list of the Lepidoptera Heterocera of Madagascar, par / by P. Viette, 1990
2. - Principales localités où des Insectes ont été recueillis à Madagascar / Chief field stations where Insects were collected in Madagascar, par / by P. Viette, 1991

Achevé d'imprimer sur les presses
de l'imprimerie Louis-Jean (GAP, France)
Dépôt légal : 456 juin 2006

Les Buprestes, ou Richards, ne sont pas appelés en vain « jewel beetles » par les Anglo-Saxons. Ils comptent en effet parmi les plus beaux représentants du règne animal et du concept de biodiversité. Phytophages, parfois saproxylophages, les Buprestes sont directement associés aux plantes, qu'elles soient vivantes ou mortes. Ils jouent donc un rôle important dans l'équilibre des écosystèmes, tant par la pression qu'ils exercent sur leurs plantes-hôtes que par leur rôle dans le recyclage de la matière organique. Madagascar abrite une faune de Buprestes remarquablement riche pour une île.

Ce catalogue annote des Coléoptères Buprestidae de Madagascar, des îles Aldabra, des Comores, des Mascareignes et des Seychelles présente 74 genres valides, 18 genres mis en synonymie, 16 sous-genres inédits, 747 espèces valides, 224 espèces mises en synonymie et 20 sous-espèces, répartis en 6 sous-familles, 15 tribus et 19 sous-tribus. Pour chaque espèce, la localisation du type est précisée ainsi que la distribution géographique connue, qu'elle soit publiée ou parfois inédite. L'ensemble des descriptions originales valides et leurs références bibliographiques sont citées. Six espèces et cinq genres nouveaux sont par ailleurs décrits pour la première fois dans ce volume.

An annotated catalogue of the Buprestidae (Coleoptera) of Madagascar and the Aldabra, Comoro, Mascareine and Seychelles Islands is presented for 74 valid genera, 18 genus-group synonyms, 16 non-nominate subgenera, 747 valid species, 224 available species names in synonymy and 20 subspecies split between six subfamilies, 15 tribes and 19 subtribes. Type locality or subsequently published distributional data are given. All relevant original descriptions and subsequent reference literature are listed. Six species and five genera are described in this volume.



Charles L. Bellamy

est conservateur de la collection d'Arthropodes de l'État de Californie, à Sacramento, et chercheur associé au Muséum national d'histoire naturelle des États-Unis, Smithsonian Institution de Washington, et au Muséum d'histoire naturelle de Los Angeles. Il a été président de la Coleopterists Society. Rédacteur en chef de *The Pan-Pacific Entomologist*, il est l'auteur d'un ouvrage de vulgarisation, ainsi que d'ouvrages techniques et de nombreux articles spécialisés consacrés aux Buprestidae et aux Coléoptères. Il a voyagé en Amérique du Nord et du Sud, en Afrique, en Australie, en Asie et en Europe pour collecter des Coléoptères ou les étudier dans les musées.

Charles L. Bellamy

is co-curator of the California State Collection of Arthropods, Sacramento and Research Associate of the US National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, Washington DC and of the Natural History Museum of Los Angeles County. Former President of the The Coleopterists Society, he is editor of *The Pan-Pacific Entomologist*. Publications : one popular book, two technical volumes and 158 scientific papers on Buprestidae and beetles. He has travelled to collect beetles or study museum collections in North and South America, Africa, Australia, Asia and Europe.

Coleoptera
Buprestidae
Madagascar
Aldabra
Comores
Mascareignes
Catalogue
Biodiversité
Systématique
Bibliographie
Distribution géographique
Zoogéographie

Coleoptera
Buprestidae
Madagascar
Aldabra
Comoro
Mascareine islands
Catalogue
Biodiversity
Systematics
Bibliography
Geographical distribution
Zoogeography

45 € t.t.c.

ISBN
IRD 2-7099-1596-0
CIRAD 2-87614-625-8
MNHN 2-85653-595-X

ISSN 0428-0709

